

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Ubichinon compositum oplossing voor injectie

Acetylsalicylicum acidum D10, Adenosinum triphosphoricum acidum D10, Anthraquinone D10, Ascorbicum acidum D6, Coenzyme A D10, Coenzyme Q D10, Colchicum autumnale D4, Conium maculatum D4, Galium aparine D6, Histaminum D10, Hydrastis canadensis D4, Hydroquinone D8, Magnesium gluconicum D10, Manganum phosphoricum D8, Naphthoquinone D10, Natrium diethyloxalaceticum D8, Natrium riboflavinum phosphoricum D6, Nicotinamide adenine dinucleotide D10, Nicotinamidum D6, Para-benzoquinonum D10, Podophyllum peltatum D4, Pyridoxinum hydrochloricum D6, Sarcosinicum acidum D6, Sulphur D8, Thiaminum hydrochloridum D6, Thioceticum acidum D8, Trichinoyl D10, Vaccinium myrtillus D4

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Ubichinon compositum oplossing voor injectie en waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?
2. Wanneer mag u Ubichinon compositum oplossing voor injectie niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Ubichinon compositum oplossing voor injectie ?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Ubichinon compositum oplossing voor injectie?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Ubichinon compositum oplossing voor injectie en waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?

Ubichinon compositum is een homeopathisch geneesmiddel met bestanddelen traditioneel gebruikt voor de ondersteuning van het celmetabolisme.

Dit homeopathische geneesmiddel wordt gebruikt volgens de principes van de bioregulerende geneeskunde.

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. Wanneer mag u Ubichinon compositum oplossing voor injectie niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Ubichinon compositum niet gebruiken?

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Ubichinon compositum?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Kinderen en jongeren tot 12 jaar

Dit geneesmiddel mag niet gebruikt worden bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Ubichinon compositum nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Er zijn geen interacties gemeld. Evenmin worden er verwacht vanwege de homeopathische verdunningen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Er zijn geen wisselwerkingen gemeld. Voor zover bekend kan dit geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank worden gebruikt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Homeopathische verdunningen van de bestanddelen van dit geneesmiddel zijn tot dusver niet toxisch gebleken tijdens de zwangerschap en bij borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen gemeld. Evenmin wordt het verwacht vanwege de homeopathische verdunningen.

Ubichinon compositum bevat natrium

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, dat wil zeggen dat het in wezen 'natriumvrij' is.

3. Hoe gebruikt u dit Ubichinon compositum oplossing voor injectie?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ubichinon compositum is een oplossing voor injectie en wordt toegediend door een arts.

De oplossing wordt intramusculair (in een spier), subcutaan (onderhuids) of intradermaal (in de huid) ingespoten.

Dosering voor volwassenen:

Bij acute klachten dagelijks, anders 1 tot 3 maal per week 1 ampul.

Dosering voor kinderen:

Adolescenten van 12 tot 18 jaar:

Bij acute klachten dagelijks, anders 1 tot 3 maal per week 1 ampul.

Instructies voor het openen van de ampul:



Houd de ampul rechtop met de gekleurde stip naar voren. Eventuele vloeistof in het bovenste gedeelte van de ampul naar beneden tikken. Met uw duim drukt u op de gekleurde stip en duwt u het bovenste deel van de ampul van u weg, totdat de hals van de ampul breekt.

Eventuele restanten in de ampul mogen niet meer gebruikt worden.

Heeft u te veel van Ubichinon compositum gebruikt?

Volgens de homeopathie is het effect gerelateerd aan de verdunningsgraad en niet zozeer aan de dosering.

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Ubichinon compositum zou gebruiken, zal het effect daardoor niet sterker zijn.

Wanneer u teveel van Ubichinon compositum heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245)

Bent u vergeten Ubichinon compositum te gebruiken?

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Ubichinon compositum

Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Afdeling Vigilantie

Postbus 97

1000 BRUSSEL Madou

Website: www.eenbijwerkingmelden.be

e-mail: adr@fagg.be

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Ubichinon compositum oplossing voor injectie?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de verpakking na EXP. De eerste twee cijfers duiden de maand aan, de volgende vier het jaartal. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u geneesmiddelen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**Welke stoffen zitten er in Ubichinon compositum?**

- De werkzame stoffen in een ampul van 2,2 ml zijn: Acetylsalicylicum acidum D10, Adenosinum triphosphoricum acidum D10, Anthraquinone D10, Ascorbicum acidum D6, Coenzyme A D10, Coenzyme Q D10, Colchicum autumnale D4, Conium maculatum D4, Galium aparine D6, Histaminum D10, Hydrastis canadensis D4, Hydroquinone D8, Magnesium gluconicum D10, Manganum phosphoricum D8, Naphthoquinone D10, Natrium diethyloxalaceticum D8, Natrium riboflavinum phosphoricum D6, Nicotinamide adenine dinucleotide D10, Nicotinamidum D6, Parabenzoquinonum D10, Podophyllum peltatum D4, Pyridoxinum hydrochloricum D6, Sarcolacticum

acidum D6, Sulphur D8, Thiaminum hydrochloridum D6, Thiocticum acidum D8, Trichinoyl D10, Vaccinium myrtillus D4 à 22 mg.

- De andere stoffen (hulpstoffen) in dit geneesmiddel zijn: natriumchloride en water voor injectie.

Hoe ziet Ubichinon compositum eruit en wat zit er in een verpakking?

Oplossing voor injectie.

Voor intramusculaire, subcutane of intradermale toediening.

Verpakking met 10 ampullen van 2,2 ml.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Heel Belgium NV

Booiebos 25

B-9031 Drongen (Gent)

Tel.: 09/265 95 65

E-mail: info@heel.be

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

HO-BE661646

Afleveringswijze

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 07/2023.