

Das Arzneimittel, das sich in dieser Packung befindet, hat eine Parallelimportzulassung bekommen.

Parallelimport ist das Inverkehrbringen in Belgien eines Arzneimittels, für das in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums, eine Genehmigung für das Inverkehrbringen [oder die Registrierung] erteilt wurde und das identisch oder nahezu identisch ist mit dem Referenzarzneimittel, das in Belgien zugelassen ist oder zugelassen war. Eine Parallelimportzulassung wird erteilt, wenn bestimmte gesetzliche Anforderungen erfüllt sind.

**Importiert durch:**

Abacus Medicine A/S  
Kalvebod Brygge 35  
1560 Kopenhagen V  
Dänemark

**Importiert aus Bulgarien**

**Name des Arzneimittels im Herkunftsland:**

Фемостон конти 1 mg/5 mg фмлммрани таблетки  
Femoston Conti 1 mg / 5 mg Filmtabletten

**Zulassungsinhaber des importierten Arzneimittels:**

Theramex Ireland Limited  
3rd Floor, Kilmore House  
Park Lane, Spencer Dock  
Dublin 1, D01 YE64  
Irland

**Name des belgischen Referenzarzneimittels:**

Femoston Conti 1 mg/5 mg Filmtabletten

---

**Gebrauchsinformation: Information für Patienten**  
**Femoston Conti 1 mg/5 mg Filmtabletten**

*Estradiol und Dydrogesteron*

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

**Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Femoston Conti 1 mg/5 mg Filmtabletten und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Femoston Conti 1 mg/5 mg Filmtabletten beachten?
3. Wie ist Femoston Conti 1 mg/5 mg Filmtabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Femoston Conti 1 mg/5 mg Filmtabletten aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. **Was ist Femoston Conti 1 mg/5 mg Filmtabletten und wofür wird es angewendet?**

Femoston Conti ist eine "kombinierte" Hormonersatzbehandlung (englisch: Hormone Replacement Therapy, HRT). Femoston Conti enthält zwei Hormone, ein Östrogen, das Estradiol genannt wird und ein Gestagen, das Dydrogesteron genannt wird. Femoston Conti ist für postmenopausale Frauen geeignet, die seit mindestens 12 Monaten ihre Regel nicht mehr haben.

### **Wofür wird Femoston Conti angewendet?**

- **Zur Behandlung der Symptome Ihrer Menopause.** Während der Menopause produziert der Körper einer Frau weniger Östrogene. Dies kann zu Symptomen wie heißes Gesicht, Hals und Brust ("Hitzewallungen") führen. Femoston Conti lindert diese Symptome nach der Menopause. Sie werden nur Femoston Conti verschrieben werden, wenn die Symptome stark behindern Ihr tägliches Leben.
- **Zur Vorbeugung von Knochenschwund.** Nach der Menopause einige Frauen entwickeln brüchige Knochen (Osteoporose). Besprechen Sie alle verfügbaren Optionen mit Ihrem Arzt.  
Wenn Sie bei einem erhöhten Risiko von Knochenbrüchen aufgrund von Osteoporose sind, und andere Medikamente sind nicht für Sie geeignet, Femoston Conti können zur Behandlung von Osteoporose nach der Menopause angewendet werden.

## **2. Was müssen sie vor der Einnahme von Femoston Conti 1 mg/5 mg Filmtabletten beachten?**

### **Medizinische Vorgeschichte und regelmäßige Kontrollen**

Die Anwendung von HRT birgt Risiken, die berücksichtigt werden müssen, wenn entschieden wird, ob damit begonnen wird oder ob es weiter eingenommen wird.

Die Erfahrung mit der Behandlung von Frauen mit einer verfrühten Menopause (auf Grund von Eierstockinsuffizienz oder Eierstockchirurgie) ist beschränkt. Wenn Sie eine verfrühte Menopause haben, können die Risiken bei der Anwendung von HRT unterschiedlich sein. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt.

Bevor Sie mit HRT beginnen oder HRT wieder aufnehmen, wird Ihnen Ihr Arzt einige Fragen über Ihre eigene und Ihre familiäre medizinische Vorgeschichte stellen. Ihr Arzt kann entscheiden, eine körperliche Untersuchung durchzuführen. Diese kann eine Untersuchung Ihrer Brüste und/oder interne Untersuchungen umfassen, falls erforderlich.

Wenn Sie mit Femoston Conti begonnen haben, müssen Sie zu Ihrem Arzt wegen regelmäßiger Kontrollen (mindestens einmal im Jahr). Bei diesen Kontrolluntersuchungen sprechen Sie mit Ihrem Arzt über die Vorteile und Risiken bei Fortsetzung der Behandlung mit Femoston. Gehen Sie zum regelmäßigen Brustscreening, wie von Ihrem Arzt empfohlen.

**Nehmen Sie Femoston Conti nicht ein**, wenn eine der folgenden Erkrankungen auf Sie zutrifft. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Femoston Conti einnehmen.

### **Femoston Conti darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie **Brustkrebs** haben, hatten oder wenn Ihr Arzt glaubt, dass Sie Brustkrebs haben könnten.
- wenn Sie einen **Tumor** haben, **der mit dem Estrogenspiegel in Zusammenhang steht** oder wenn Ihr Arzt glaubt, dass Sie einen Östrogen-abhängigen Tumor haben könnten. Ein Beispiel ist Gebärmutter Schleimhautkrebs (*endometrialer Krebs*).
- wenn Sie **Blutungen aus der Scheide** haben, deren Ursache nicht bekannt ist.
- wenn Sie eine **dickere Gebärmutter Schleimhaut als normal** haben (*endometriale Hyperplasie*), die nicht behandelt wird.
- wenn Sie **Blutgerinnsel in einer Vene** (*venöser Thromboembolismus*), der Beine (*tiefe venöse Thrombose*) oder in der Lunge (*pulmonaler Embolismus*) haben oder gehabt haben.

- wenn Sie **Blutgerinnungsstörungen** (*thrombophile Störung, wie Protein-C-, Protein-S- oder Antithrombin-Mangel*) haben.
- wenn Sie eine Krankheit haben oder vor kurzem gehabt haben, die durch Blutgerinnsel in den Arterien hervorgerufen wird. Beispiele umfassen **Angina pectoris** (anfallsartige Brustschmerzen mit Brustenge), **Schlaganfall** oder einen **Herzinfarkt** (Myokardinfarkt).
- wenn Sie eine **Leberkrankheit** haben oder gehabt haben, die nicht völlig abgeheilt wurde.
- wenn Sie eine seltene (*erbliche*) Blutkrankheit haben, die "Porphyrie" genannt wird.
- wenn Sie allergisch gegen Estradiol, Dydrogesteron oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- wenn Sie ein Meningeom haben oder jemals bei Ihnen ein Meningeom festgestellt wurde (ein im Allgemeinen gutartiger Tumor der Gewebeschicht, die sich zwischen Gehirn und Schädel befindet).

Wenn eine der oben genannten Bedingungen zum ersten Mal erscheinen während der Einnahme von Femoston Conti, unterbrechen Sie die Einnahme sofort und konsultieren Sie sofort Ihren Arzt.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Femoston Conti einnehmen wenn Sie an einer der unten genannten Krankheiten leiden oder gelitten haben. Bitte beachten Sie sich das diese Krankheiten während Behandlung mit Femoston Conti verschlimmern oder wieder auftreten können. Wenn ja, sollten Sie Ihren Arzt öfter sehen für Häufigere Kontrollen.

- Wachstum der Schleimhaut in der Gebärmutter (uterines Fibromen)
- Wachstum der Gebärmutter Schleimhaut außerhalb der Gebärmutter (*Endometriose*) oder in der Vergangenheit aufgetretenes übermäßiges Wachstum der Gebärmutter Schleimhaut (*Endometriumhyperplasie*)
- Erhöhtes Risiko auf Entwicklung von Blutklumpen (siehe "Blutklumpen in einer Vene (Thrombose)")
- Erhöhtes Risiko auf einen Östrogen-empfindlichen Krebs (wie ein nahes Familienmitglied (Mutter, Schwester oder Großmutter), das Brustkrebs gehabt hat)
- Bluthochdruck
- Eine Lebererkrankung wie einer gutartigen Lebertumor
- Diabetes
- Gallensteine
- Migräne oder starke Kopfschmerzen
- eine Krankheit des Immunsystems, das mehrere Körperorgane beeinträchtigt (*SLE; Systemischer Lupus erythematodes*)
- abnormale Stimulation der Gebärmutter Schleimhaut (*endometriale Hyperplasie*) in der Vorgeschichte
- Krampfanfälle (*Epilepsie*)
- Asthma
- eine Krankheit, die das Trommelfell und das Hörvermögen beeinträchtigt (*Otosklerose*)
- Ein sehr hohes Maß an Fett im Blut (*Triglyceride*)
- Wassereinlagerungen aufgrund von Herz-oder Nierenproblemen
- angeborenes oder erworbenes Angioödem

### **Meningeom**

Die Anwendung von Estradiol/ Dydrogesteron wurde mit der Entstehung eines im Allgemeinen gutartigen Tumors der Gewebeschicht, die sich zwischen Gehirn und Schädel befindet, in Verbindung gebracht (Meningeom). Wenn bei Ihnen ein Meningeom festgestellt wird, wird Ihr Arzt Ihre Behandlung mit Femoston Conti abbrechen (siehe Abschnitt '...darf nicht eingenommen werden'). Wenn Sie folgenden Symptome bemerken, müssen Sie sofort Ihren Arzt informieren: Sehstörungen (z. B. Doppelsehen oder Verschwommensehen), Hörverlust oder ein Klingeln in den Ohren, Verlust des Geruchssinns, stetig schlimmer werdende

Kopfschmerzen, Gedächtnisverlust, Krampfanfälle oder Schwächegefühl in Ihren Armen oder Beinen.

**Brechen Sie die Einnahme von Femoston Conti ab und konsultieren Sie sofort einen Arzt**, wenn Sie eines der folgenden Symptome während der Hormonersatzbehandlung feststellen:

- Eine der Krankheiten, die im Abschnitt "Femoston Conti darf nicht eingenommen werden" aufgelistet sind
- Gelbfärbung Ihrer Haut oder Ihres Augenweißes (Gelbsucht). Diese können Anzeichen einer Leberkrankheit sein
- Symptome eines Angioödems wie Schwellungen des Gesichts, der Zunge und/oder des Rachens und/oder Schwierigkeiten beim Schlucken oder Nesselsucht verbunden mit Atemproblemen
- Ein starker Anstieg Ihres Blutdruckes (Symptome können Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwindel sein)
- Migräne-ähnliche Kopfschmerzen, die zum ersten Mal auftreten
- wenn Sie schwanger werden
- wenn Sie bemerken, Anzeichen eines Blutgerinnsels, wie zB:
  - schmerzhafte Schwellung und Rötung der Beine
  - plötzliche Schmerzen in der Brust
  - Schwierigkeiten beim Atmen

Für weitere Information, siehe "Blutgerinnsel in einer Vene (*Thrombosen*)"

**Hinweis:** Femoston Conti ist kein Verhütungsmittel. Wenn Ihre letzte Menstruation vor weniger als vor 12 Monaten stattfand oder wenn Sie unter 50 Jahren sind, müssen Sie zusätzliche Verhütungsmittel anwenden, um eine Schwangerschaft zu verhindern. Fragen Sie Ihren Arzt um Rat.

### **Hormonersatzbehandlung und Krebs Übermäßige Verdickung der Gebärmutterschleimhaut (*Endometriumhyperplasie*) und Krebs der Gebärmutterschleimhaut (*Endometriumkarzinom*)**

Eine nur Östrogen-haltige HRT erhöht das Risiko einer übermäßigen Verdickung der Gebärmutterschleimhaut (*endometriale Hyperplasie*) und Gebärmutterschleimhautkrebs (*endometrialer Krebs*). Das Gestagen in Femoston Conti schützt Sie vor diesem zusätzlichen Risiko.

### **Durchbruchblutung oder Schmierblutung**

Unregelmäßige Blutungen oder Schmierblutungen (Spotting) können in den ersten 3-6 Monaten der Einnahme von Femoston Conti auftreten. Wenn eine unregelmäßige Blutung jedoch

- länger als in den ersten 6 Monaten auftritt,
- beginnt, nachdem Sie Femoston Conti seit mehr als 6 Monaten einnehmen,
- anhält, nachdem Sie die Einnahme von Femoston Conti abgebrochen haben,

**konsultieren Sie sofort Ihren Arzt.**

### **Brustkrebs**

Die vorhandenen Daten zeigen, dass die Anwendung einer Hormonersatzbehandlung (HRT) mit einer Kombination aus Östrogen und Gestagen oder die alleinige Anwendung von Östrogen zur HRT das Risiko für Brustkrebs erhöhen. Das zusätzliche Risiko hängt von der Dauer der HRT ab und zeigt sich innerhalb einer 3-jährigen Anwendung.

Nach Absetzen der HRT nimmt das zusätzliche Risiko im Laufe der Zeit ab, das Risiko kann jedoch 10 Jahre oder länger andauern, wenn Sie die HRT länger als 5 Jahre angewendet haben.

### *Zum Vergleich*

Bei Frauen im Alter zwischen 50 und 54 Jahren, die keine HRT anwenden, werden über einen 5-Jahres-Zeitraum im Durchschnitt etwa 13 bis 17 Fälle von Brustkrebs pro 1.000 Frauen

diagnostiziert.

Bei Frauen im Alter von 50 Jahren, die mit der Einnahme einer HRT nur mit Östrogen über einen Zeitraum von 5 Jahren beginnen, treten 16 bis 17 Fälle bei 1.000 Anwenderinnen auf (d. h. 0 bis 3 zusätzliche Fälle).

Bei Frauen im Alter von 50 Jahren, die mit der Einnahme einer HRT mit Östrogen und Gestagen über einen Zeitraum von 5 Jahren beginnen, treten 21 Fälle bei 1.000 Anwenderinnen auf (d.h. zusätzliche 4 bis 8 Fälle).

Bei Frauen im Alter zwischen 50 und 59 Jahren, die keine HRT anwenden, werden über einen 10-Jahres-Zeitraum im Durchschnitt etwa 27 Fälle von Brustkrebs pro 1.000 Frauen diagnostiziert.

Bei Frauen im Alter von 50 Jahren, die mit der Einnahme einer HRT nur mit Östrogen über einen Zeitraum von 10 Jahren beginnen, treten 34 Fälle bei 1.000 Anwenderinnen auf (d. h. zusätzliche 7 Fälle).

Bei Frauen im Alter von 50 Jahren, die mit der Einnahme einer HRT mit Östrogen und Gestagen über einen Zeitraum von 10 Jahren beginnen, treten 48 Fälle bei 1.000 Anwenderinnen auf (d. h. 21 zusätzliche Fälle).

Vergewissern Sie sich, dass **Sie Ihre Brüste regelmäßig untersuchen und informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie Veränderungen feststellen wie.**

- Hautdellen
- Veränderungen der Brustwarzen
- Knoten, die Sie fühlen oder sehen können

Falls Sie die Möglichkeit haben, am Programm zur Früherkennung von Brustkrebs (Mammographie-Screening-Programm) teilzunehmen, sollten Sie dieses Angebot nutzen. Informieren Sie die Fachkraft, die die Mammographie durchführt, dass Sie ein Arzneimittel zur Hormonersatzbehandlung einnehmen. Arzneimittel, die zur Hormonersatzbehandlung eingenommen werden, können das Brustgewebe dichter machen und dadurch das Ergebnis der Mammographie beeinflussen. Wenn die Dichte des Brustgewebes erhöht ist, können möglicherweise nicht alle Veränderungen erkannt werden.

### **Eierstockkrebs**

Eierstockkrebs ist selten - viel seltener als Brustkrebs. Die Anwendung von Estrogen-Monoarzneimitteln oder kombinierten Estrogen-Gestagen-Arzneimitteln zur Hormonersatzbehandlung ist mit einem leicht erhöhten Risiko, Eierstockkrebs zu entwickeln, verbunden.

#### *Zum Vergleich*

Das Risiko, Eierstockkrebs zu entwickeln, ändert sich mit dem Alter. Zum Beispiel werden bei Frauen im Alter von 50-54 Jahren, die keine HRT einnehmen, bei 2 von 2.000 Frauen Eierstockkrebs über einen 5-Jahres-Zeitraum diagnostiziert. Bei Frauen, die eine HRT 5 Jahre lang anwenden, treten etwa 3 Fälle pro 2.000 Anwenderinnen auf (d.h. etwa 1 zusätzlicher Fall).

### **Wirkungen von HRT auf das Herz und den Kreislauf**

#### **Blutgerinnsel in einer Vene (Thrombosen)**

HRT erhöht das Risiko auf **Blutgerinnsel in den Venen** um das 1,3- bis 3-fache, insbesondere während des ersten Jahres der Einnahme.

Blutgerinnsel können schwerwiegend sein, und wenn sie in die Lunge gelangen, können sie Schmerzen in der Brust, Atemnot und Ohnmacht verursachen oder sogar zum Tod führen. Sie werden im Allgemeinen eher ein Blutgerinnsel in Ihren Venen haben, wenn eine oder mehrere der folgenden Bedingungen auf Sie zutreffen:

- Sie sind nicht in der Lage für einen längeren Zeitraum auf Grund eines größeren chirurgischen Eingriffs, einer Verletzung oder Krankheit (*verlängerte Immobilisation*) zu gehen oder zu stehen (Siehe auch Abschnitt 3, „Wenn ein chirurgischer Eingriff geplant ist“).

- Sie leiden an starkem Übergewicht (BMI >30 kg/m<sup>2</sup>).
- Sie haben Blutklumpenprobleme, die eine Langzeitbehandlung mit einem Arzneimittel zur Vorbeugung von Blutklumpen erfordern.
- Sie oder ein Familienmitglied haben/hat jemals ein Blutgerinnsel in dem Bein, in der Lunge oder in einem anderen Organ gehabt.
- Sie leiden an systemischem Lupus erythematodes (SLE).
- Sie haben Krebs.

Für Anzeichen eines Blutklumpens siehe "Brechen Sie die Einnahme von Femoston Conti ab und konsultieren Sie sofort einen Arzt".

#### *Zum Vergleich*

Bei Frauen im Alter zwischen 50 und 59 Jahren, die keine HRT einnehmen, wird über einen Zeitraum von 5 Jahren im Durchschnitt bei 4-7 von 1.000 Frauen ein Blutgerinnsel in einer Vene erwartet. Bei Frauen im Alter zwischen 50 und 59 Jahren, die eine Estrogen-Gestagen-HRT über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren einnehmen, wird es 9-12 Fälle pro 1.000 Anwenderinnen (d.h. etwa 5 Extrafälle).

#### **Herzkrankheit (Herzinfarkt)**

Es gibt keinen Hinweis, dass die HRT einen Herzinfarkt zu verhindern.

Frauen über 60 Jahre alt, die eine Östrogen-Gestagen-HRT einnehmen, neigen etwas mehr dazu, eine Herzkrankheit zu entwickeln als diejenigen, die keine HRT einnehmen.

#### **Schlaganfall**

HRT erhöht das Risiko auf einen Schlaganfall um das 1,5-fache.

Die Anzahl Extra Fälle aufgrund von HRT bei Frauen die eine HRT anwenden, steigt mit dem Alter.

#### *Zum Vergleich*

Bei Frauen im Alter zwischen 50 und 59 Jahren, die eine HRT nicht einnehmen, wird im Durchschnitt bei 8 von 1.000 Frauen ein Schlaganfall über einen Zeitraum von 5 Jahren erwartet. Bei Frauen im Alter zwischen 50 und 59 Jahren, die eine HRT einnehmen, wird es 11 Fälle pro 1.000 Anwenderinnen über einen Zeitraum von 5 Jahren geben (d.h. etwa 3 Extrafälle).

#### **Andere Krankheiten**

HRT wird Gedächtnisverlust nicht verhindern. Frauen, die mit der Anwendung von der HRT nach 65 Jahren beginnen, können ein etwas höheres Risiko auf einen allmählichen Verlust der mentalen Fähigkeiten haben (*Demenz*). Fragen Sie Ihren Arzt um Rat.

Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie eine der folgenden Krankheiten haben oder gehabt haben, da er Sie dann besonders engmaschig beobachten muss:

- Herzkrankheit**
- Nierenbeeinträchtigung**
- Spiegel von bestimmten Blutfetten höher als normal (Hypertriglyzeridämie)**

#### **Kinder:**

Femoston Conti ist nicht zur Anwendung bei Kindern vorgesehen

#### **Einnahme von Femoston Conti zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden. Ihr Arzt wird Sie gerne beraten.

Einige Arzneimittel können die Wirkung von Femoston Conti stören. Dies könnte zu unregelmäßigen Blutungen führen. Dies gilt für die folgenden Arzneimittel:

- Arzneimittel gegen Anfälle (**Epilepsie**) (wie Phenobarbital, Carbamazepin, Phenytoin),
- Arzneimittel gegen **Tuberkulose** (wie Rifampicin, Rifabutin),
- Arzneimittel gegen **HIV-Infektion [AIDS]** (wie Ritonavir, Nelfinavir, Neviparin, Efavirenz),
- Arzneimittel auf pflanzlicher Basis, die **Johanniskraut** (*Hypericum perforatum*) enthalten.

Die HRT kann die Wirkungsweise einiger anderer Arzneimittel beeinflussen:

- Eines Arzneimittels gegen Epilepsie (Lamotrigin), da dies die Häufigkeit von Anfällen erhöhen könnte
- Die Kombinationsbehandlung Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir und Dasabuvir mit oder ohne Ribavirin und auch die Behandlung Glecaprevir/Pibrentasvir oder Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir gegen das Hepatitis-C-Virus (HCV) können bei Frauen, die KHK anwenden, welche Ethinylestradiol enthalten, erhöhte Leberwerte in Bluttests (Anstieg des Leberenzym ALT) verursachen. Femoston Conti enthält Estradiol anstelle von Ethinylestradiol. Es ist nicht bekannt, ob bei Anwendung von Femoston Conti zusammen mit dieser Kombinationsbehandlung gegen HCV ein Anstieg des Leberenzym ALT auftreten kann.

### **Labortests**

Informieren Sie Ihren Arzt, dass Sie unter HRT sind, wenn Sie sich einem Bluttest unterziehen müssen. HRT kann die Spiegel von bestimmten Proteinen und Hormonen in Ihrem Blut verändern.

### **Einnahme von Femoston Conti zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Femoston Conti kann mit oder ohne Nahrungsmittel eingenommen werden.

### **Schwangerschaft, Stillzeit und Zeugungs-/Gebärfähigkeit**

Femoston Conti ist nur für die Anwendung von postmenopausalen Frauen bestimmt. Nehmen Sie es nicht ein, wenn Sie schwanger sind oder stillen.

Wenn Sie schwanger werden oder wenn Sie glauben, dass Sie schwanger sein könnten, **brechen Sie die Einnahme von Femoston Conti ab und informieren Sie Ihren Arzt.**

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Femoston Conti hat keinen oder einen zu vernachlässigenden Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

**Femoston Conti enthält Laktose.** Bitte nehmen Sie Femoston Conti erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

## **3. Wie ist Femoston Conti 1 mg/5 mg Filmtabletten einzunehmen?**

**Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.**

### **Beginn der Einnahme von Femoston Conti**

Beginnen Sie die Einnahme von Femoston Conti nur dann, wenn Ihre letzte natürliche Periodenblutung mindestens 12 Monate zurückliegt.

Sie können mit der Einnahme von Femoston Conti an jedem beliebigen Tag beginnen, wenn

- Sie zurzeit kein HRT-Produkt einnehmen.
- Sie von einem "dauerhaft kombinierten" HRT-Produkt umsteigen. Dies ist der Fall, wenn Sie jeden Tag eine Tablette einnehmen oder ein Pflaster anwenden, die/das ein Östrogen und ein Gestagen enthalten.

Sie beginnen mit der Einnahme von Femoston Conti am Tage, nach dem Sie den 28-Tage-Zyklus beendet haben, wenn

- Sie von einem "zyklischen" oder "sequentiellen" HRT-Produkt umsteigen. Das ist der Fall,

wenn Sie im ersten Teil Ihres Zyklus eine Östrogen-Tablette einnehmen oder ein Pflaster anwenden, das Östrogen enthält. Danach nehmen Sie bis zu 14 Tagen eine Tablette ein oder wenden ein Pflaster an, die/das ein Östrogen und ein Gestagen enthält.

#### **Einnahme dieses Arzneimittels**

- Schlucken Sie die Tablette mit Wasser.
- Sie können Ihre Tablette mit oder ohne Nahrungsmittel einnehmen.
- Versuchen Sie, Ihre Tablette jeden Tag zum gleichen Zeitpunkt einzunehmen. Dies gewährleistet, dass eine konstante Menge dieses Produktes in Ihrem Körper vorhanden ist. Dies wird ebenso dazu beitragen, dass Sie sich daran erinnern, Ihre Tabletten einzunehmen.
- Nehmen Sie eine Tablette jeden Tag ein, und zwar ohne Unterbrechung zwischen den Packungen. Die Blister sind mit den Wochentagen versehen. Dies macht es Ihnen leichter, sich daran zu erinnern, wann Sie Ihre Tabletten einnehmen müssen.

#### **Welche Menge ist einzunehmen?**

- Ihr Arzt wird versuchen, Ihnen die niedrigste Dosis, die zur Behandlung Ihrer Beschwerden erforderlich ist, für die kürzest notwendige Zeit zu verordnen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie denken, dass diese Dosis zu stark oder nicht stark genug ist.
- Wenn Sie Femoston Conti zur Vorbeugung von Osteoporose einnehmen, wird der Arzt Ihre Dosis anpassen. Sie wird von Ihrer Knochenmasse abhängen.
- Nehmen Sie eine lachsfarbene Tablette jeden Tag während eines 28-tägigen Zyklus ein.

#### **Wenn Sie sich einem chirurgischen Eingriff unterziehen müssen**

Wenn Sie sich einem chirurgischen Eingriff unterziehen müssen, informieren Sie den Chirurgen, dass Sie Femoston Conti einnehmen. Möglicherweise müssen Sie die Einnahme von Femoston Conti ungefähr 4 bis 6 Wochen vor der Operation abbrechen, um das Risiko auf einen Blutklumpen zu reduzieren (siehe Abschnitt 2, Blutgerinnsel in einer Vene). Fragen Sie Ihren Arzt, wann Sie die Einnahme von Femoston Conti wieder aufnehmen dürfen.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Femoston Conti eingenommen haben, als Sie sollten**

Wenn Sie eine größere Menge von Femoston Conti haben angewendet, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (070/245.245).

Wenn Sie (oder jemand anders) zu viel von Femoston Conti eingenommen haben (hat), können folgende Nebenwirkungen auftreten: Übelkeit, Schläfrigkeit oder Schwindel oder Erbrechen. Eine Behandlung ist nicht erforderlich. Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Arzt auf, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

#### **Wenn Sie die Einnahme von Femoston Conti vergessen haben**

Nehmen Sie die vergessene Tablette ein, sobald Sie sich daran erinnern. Wenn mehr als 12 Stunden vergangen sind, nachdem Sie Ihre Tablette hätte einnehmen müssen, nehmen Sie die nächste Dosis zum üblichen Zeitpunkt ein. Nehmen Sie die vergessene Tablette nicht ein. Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Eine Blutung oder Schmierblutung kann auftreten, wenn Sie eine Tablette vergessen haben.

#### **Wenn Sie die Einnahme von Femoston Conti abbrechen**

Brechen Sie die Einnahme von Femoston Conti nicht ab ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem Arzt.

**Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.**

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Über folgende Krankheiten wurde bei Frauen häufiger berichtet, die Hormonersatzbehandlung anwenden, verglichen mit Frauen, die keine Hormonersatzbehandlung anwenden:

- Brustkrebs
- abnormales Wachstum oder Krebs der Gebärmutter Schleimhaut (Endometriumhyperplasie oder Endometriumkrebs)
- Eierstockkrebs
- Blutgerinnsel in einer Vene der Beine oder der Lunge (*venöse Thromboembolie*)
- Herzkrankheit
- Schlaganfall
- Wahrscheinlicher Gedächtnisverlust, wenn mit Hormonersatzbehandlung nach 65 begonnen wird

Für weitere Informationen über diese Nebenwirkungen siehe Abschnitt 2

Folgende Nebenwirkungen können mit diesem Arzneimittel auftreten:

**Sehr häufig (betrifft mehr als 1 von 10 Behandelten):**

- Kopfschmerzen
- Bauchschmerzen
- Rückenschmerzen
- Schmerzen/Empfindlichkeit der Brüste

**Häufig (betrifft 1 von 10 Behandelten):**

- Pilzinfektion der Scheide (Vaginalinfektion durch einen Pilz namens *Candida albicans*)
- Depression, Nervosität
- Migräne. Wenn Sie erstmalig migräneartige Kopfschmerzen haben, beenden Sie die Einnahme von Femoston Conti und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Schwindel
- Krankheitsgefühl (Übelkeit), Erbrechen, Blähungen (Schwellung des Bauches) einschließlich Winde (Flatulenz)
- Allergische Hautreaktionen (wie z.B. Ausschlag, starker Juckreiz (*Pruritus*) oder Nesselsucht (*Urtikaria*))
- Veränderte Blutungsmuster wie z.B. irreguläre Blutungen, Schmierblutungen, schmerzhafte Blutungen (Dysmenorrhoe), verstärkte oder abgeschwächte Blutung
- Unterleibsschmerzen
- Veränderungen im Bereich der zervikalen Sekretion (Ausfluss aus dem Muttermund)
- Gefühl der Schwäche, Müdigkeit oder Unwohlsein
- Schwellung im Bereich der Fußknöchel, Füße oder Finger (*periphere Ödeme*)
- Gewichtszunahme

**Gelegentlich (betrifft 1 von 100 Behandelten):**

- Beschwerden ähnlich einer Blasenentzündung
- Größenzunahme von Geschwulsten der Gebärmutter (Leiomyome)
- Überempfindlichkeitsreaktionen wie z.B. Atemnot (allergisches Asthma)
- Veränderung des Geschlechtstriebes
- Blutgerinnsel z.B. in den Bein- oder Lungenvenen (*venöse Thromboembolien oder Lungenembolie*)
- Hoher Blutdruck (Hypertension)
- Probleme mit der Durchblutung (periphere Gefäßerkrankungen)
- Vergrößerte Venen (Krampfadern)
- Verstopfung
- Leberfunktionsstörungen, die manchmal mit einer Gelbfärbung der Haut (*Gelbsucht*), Schwächegefühl (*Asthenie*) oder allgemeinem Unwohlsein (*Malaise*) und Bauchschmerzen einhergehen können. Wenn Sie eine Gelbfärbung der Haut oder des Augenweißes

bemerken, beenden Sie die Einnahme von Femoston Conti und suchen Sie umgehend einen Arzt auf

- Gallenblasenerkrankungen
- Vergrößerung der Brüste
- prämenstruelles Syndrom (*PMS*)
- Gewichtsabnahme

**Selten (betrifft 1 von 1000 Behandelten):**

(\*Nebenwirkungen, die seit Markteinführung, aber nicht in den klinischen Studien beobachtet wurden, sind mit der Häufigkeit „selten“ angegeben.)

- Erkrankungen, durch Zerstörung der roten Blutkörperchen (*Hämolytische Anaemie*)\*
- Meningiom (Gehirntumor)\*
- Veränderung der Augenoberfläche (Steilstellung der kornealen Krümmung)\*, Kontaktlinsenunverträglichkeit\*
- Herzinfarkt (*Myokardinfarkt*)
- Schlaganfall\*
- Hautschwellung v. a. im Gesichts- und Halsbereich: Dies kann zu Schwierigkeiten beim Atmen führen (*Angioödem*)
- violette Flecken oder Punkte auf der Haut (*vaskuläre Purpura*)
- schmerzhafte Knötchenbildung (*Erythema nodosum*)\*, Verfärbungen der Haut, besonders an Gesicht und Hals, auch bekannt als „Schwangerschaftsflecken“ (*Chloasma* oder *Melasma*)\*
- Beinkrämpfe\*

Die folgenden Nebenwirkungen wurden während der Anwendung anderer Präparate zur Hormonersatzbehandlung berichtet:

- gutartige oder bösartige Tumore, die durch den Östrogenspiegel im Blut beeinflusst werden können, wie z.B. Krebs der Gebärmutterwand, Krebs der Eierstöcke (für weitere Informationen siehe „Abschnitt 2“)
- Vergrößerung von Tumoren, die durch den Gestagenspiegel im Blut beeinflusst werden können (wie z.B. *Meningiom*)
- eine Krankheit, bei der das körpereigene Immunsystem nicht richtig funktioniert und eigene Organe und Gewebe angreift (*Systemischer Lupus erythematoses*)
- wahrscheinliche Demenz
- Verschlechterung von Krampfanfällen (Epilepsie)
- Unwillkürliches Muskelzucken (*Chorea*)
- Blutgerinnsel in den Arterien (*arterielle Thromboembolien*)
- Entzündung der Bauchspeicheldrüse (*Pankreatitis*) bei Frauen mit vorbestehenden erhöhten Blutspiegeln bestimmter Blutfette (*Hypertriglyzeridämie*)
- schmerzhafte rote Flecken auf der Haut (*Erythema multiforme*)
- Harninkontinenz
- Schmerzhafte/knotige Brüste (*fibrozystische Brustveränderungen*)
- Veränderung im Bereich des Muttermundes (*Veränderung der Portioerosion*)
- Verschlechterung einer seltenen Bluterkrankung (*Porphyrie*)
- Erhöhung der Blutspiegel bestimmter Blutfette (*Hypertriglyzeridämie*)
- Anstieg der Gesamtschilddrüsenhormone

**Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über

**Belgien:**

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte  
www.afmps.be

Abteilung Vigilanz  
Website: [www.notifieruneffetindesirable.be](http://www.notifieruneffetindesirable.be)  
E-mail: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be)

### **Luxemburg:**

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy  
Oder Abteilung Pharmazie und Medikamente (Division de la pharmacie et des médicaments)  
der Gesundheitsbehörde in Luxemburg  
Website : [www.guichet.lu/pharmakovigilanz](http://www.guichet.lu/pharmakovigilanz)

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **5. Wie ist Femoston Conti 1 mg/5 mg Filmtabletten aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.  
Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.  
Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.  
Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

### **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

#### **Was Femoston Conti enthält**

- Die Wirkstoffe sind: Estradiol als Estradiolhämihydrat und Dydrogesteron.
  - Eine Tablette enthält 1 mg Estradiol und 5 mg Dydrogesteron.
- Die sonstigen Bestandteile im Tablettenkern sind: Lactose-Monohydrat, Hypromellose, Maisstärke, hochdisperses Siliciumdioxid und Magnesiumstearat.
- Die sonstigen Bestandteile im Filmüberzug sind:
  - Titandioxid (E 171), Eisenoxid gelb (E 172), Eisenoxid rot (E 172), Hypromellose, Macrogol.

#### **Wie Femoston Conti aussieht und Inhalt der Packung**

- Dieses Arzneimittel ist eine Filmtablette. Die Filmtablette ist rund, bikonvex und hat auf einer Seite die Prägung 379 (7 mm).
- Jeder Blister enthält 28 Tabletten.
- Die Tabletten sind lachsfarben.
- Die Tabletten befinden sich in PVC-Aluminiumblister.
- Die Verpackung enthält 84 (3x28) Filmtabletten.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

#### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

##### **Hersteller des importierten Arzneimittels:**

Abbott Biologicals B.V.  
C.J. van Houtenlaan 36  
1381 CP Weesp  
Niederlande

##### **Zulassungsinhaber des Referenzarzneimittels:**

Theramex Ireland Limited  
3rd Floor, Kilmore House  
Park Lane, Spencer Dock  
Dublin 1, D01 YE64

Irland

**Zulassungsnummer:**

2443 PI 030 F3

**Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:**

AT	Femoston conti 1 mg/5 mg – Filmtabletten
BE	Femoston Conti 1 mg/5 mg Filmtabletten
DE	Femoston conti 1 mg/5 mg Filmtabletten
DK	Femoston Conti
ES	Femoston 1 mg/5 mg comprimidos recubiertos con película
FI	Femoston conti 1/5 tabletti, kalvopäällysteinen
IE	Femoston-conti 1 mg/5 mg film-coated tablets
IT	Femoston 1/5 conti compresse rivestite con film
LU	Femoston Conti 1 mg/5 mg comprimés pelliculés
NL	Femoston continu 1/5, filmomhulde tabletten 1mg, 5mg
NO	Femostonconti
PT	Femoston 1/5, 5 mg + 1 mg, comprimido revestido
SE	Femostonconti
SI	Femphascon conti 1 mg/5 mg filmsko obložene tablete

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 08/2025.**