

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Coenzyme compositum oplossing voor injectie

Coenzyme A D8, Aconiticum acidum D8, Adenosinum triphosphoricum acidum D10, Ascorbicum acidum D6, Baryta oxalsuccinata D10, Beta vulgaris D4, Cerium oxalicum D8, Citricum acidum D8, Cysteinum D6, Fumaricum acidum D8, Hepar sulphur D10, Ketoglutaricum acidum D8, Magnesium oroticum D6, Malicum acidum D8, Manganum phosphoricum D6, Natrium diethyloxalaceticum D6, Natrium pyruvicum D8, Natrium riboflavinum phosphoricum D6, Nicotinamide adenine dinucleotide D8, Nicotinamidum D6, Pulsatilla pratensis D6, Pyridoxinum hydrochloricum D6, Succinicum acidum D8, Sulphur D10, Thiaminum hydrochloridum D6, Thioccticum acidum D6

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Coenzyme compositum oplossing voor injectie en waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?
2. Wanneer mag u Coenzyme compositum oplossing voor injectie niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Coenzyme compositum oplossing voor injectie?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Coenzyme compositum oplossing voor injectie?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Coenzyme compositum oplossing voor injectie en waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?

Coenzyme compositum is een homeopathisch geneesmiddel met bestanddelen traditioneel gebruikt voor de ondersteuning van de celademhaling.

Dit homeopathische geneesmiddel wordt gebruikt volgens de principes van de bioregulerende geneeskunde.

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. Wanneer mag u Coenzyme compositum oplossing voor injectie niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Coenzyme compositum niet gebruiken?

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Coenzyme compositum?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Kinderen en jongeren tot 12 jaar

Dit geneesmiddel mag niet gebruikt worden bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Coenzyme compositum nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Tot op heden zijn er geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Er zijn geen wisselwerkingen gemeld. Voor zover bekend kan dit geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank worden gebruikt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er zijn van Coenzyme compositum geen gegevens over het effect op de vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding. Er wordt geen invloed op de vruchtbaarheid, zwangerschap of borstvoeding verwacht, gezien de homeopathische verdunningen van de bestanddelen van dit geneesmiddel tot dusver niet toxisch zijn gebleken.

Voor zover bekend kan Coenzyme compositum gedurende de zwangerschap en de periode van borstvoeding in de aanbevolen dosering worden gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend die er op wijzen dat Coenzyme compositum invloed heeft op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

Coenzyme compositum bevat natrium

Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, dat wil zeggen dat het in wezen 'natriumvrij' is.

3. Hoe gebruikt u Coenzyme compositum oplossing voor injectie?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Coenzyme compositum is een oplossing voor injectie en wordt toegediend door een arts of een verpleegkundige.

De oplossing wordt intramusculair (in een spier), subcutaan (onderhuids) of intradermaal (in de huid) ingespoten.

Dosering voor volwassenen:

Bij acute klachten dagelijks, anders 1 tot 3 maal per week 1 ampul.



Dosering voor kinderen:

Adolescenten van 12 tot 18 jaar:

Bij acute klachten dagelijks, anders 1 tot 3 maal per week 1 ampul.

Instructies voor het openen van de ampul:

Ga voorzichtig te werk. Volg de openingsinstructies zorgvuldig op. Het opensnijden van de glazen ampul is niet nodig.



Houd de ampul rechtop met de gekleurde stip naar voren. Eventuele vloeistof in het bovenste gedeelte van de ampul naar beneden tikken.

Met uw duim drukt u op de gekleurde stip en duwt u het bovenste deel van de ampul van u weg, totdat de hals van de ampul breekt.

Eventuele restanten in de ampul mogen niet meer gebruikt worden.

Heeft u te veel van Coenzyme compositum gebruikt?

Volgens de homeopathie is het effect gerelateerd aan de verdunningsgraad en niet zozeer aan de dosering. Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Coenzyme compositum zou gebruiken, zal het effect daardoor niet sterker zijn.

Wanneer u teveel van Coenzyme compositum heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten Coenzyme compositum te gebruiken?

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Coenzyme compositum

Er zijn geen effecten te verwachten na het einde van de behandeling of als de behandeling voortijdig wordt beëindigd.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Er zijn geen effecten te verwachten na het einde van de behandeling of als de behandeling voortijdig wordt beëindigd.

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

In geïsoleerde gevallen werden huidallergieën van voorbijgaande aard gerapporteerd.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
Postbus 97
B-1000 BRUSSEL Madou
Website: www.eenbijwerkingmelden.be
e-mail: adr@fagg.be

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Coenzyme compositum oplossing voor injectie?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de verpakking na EXP. De eerste twee cijfers duiden de maand aan, de volgende vier het jaartal. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u geneesmiddelen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in Coenzyme compositum?

- De werkzame stoffen in een ampul van 2,2 ml zijn: Coenzyme A D8, Aconiticum acidum D8, Adenosinum triphosphoricum acidum D10, Ascorbicum acidum D6, Baryta oxalsuccinata D10, Beta vulgaris D4, Cerium oxalicum D8, Citricum acidum D8, Cysteinum D6, Fumaricum acidum D8, Hepar sulphur D10, Ketoglutaricum acidum D8, Magnesium oroticum D6, Malicum acidum D8, Manganum phosphoricum D6, Natrium diethyloxalaceticum D6, Natrium pyruvicum D8, Natrium riboflavinum phosphoricum D6, Nicotinamide adenine dinucleotide D8, Nicotinamidum D6, Pulsatilla pratensis D6, Pyridoxinum hydrochloricum D6, Succinicum acidum D8, Sulphur D10, Thiaminum hydrochloridum D6, Thiocticum acidum D6 à 22 mg.
- De andere stoffen (hulpstoffen) in dit geneesmiddel zijn: natriumchloride en water voor injectie.

Hoe ziet Coenzyme compositum eruit en wat zit er in een verpakking?

Oplossing voor injectie.

Voor intramusculaire, subcutane of intradermale toediening.

Verpakking met 10 ampullen van 2,2 ml.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Heel Belgium NV

Booiebos 25

B-9031 Drongen (Gent)

Tel.: 09/265 95 65

E-mail: info@heel.be

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

HO-BE661963

Afleveringswijze

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 11/2023.