

Gebrauchsinformation: Information für Anwender
Gaviscon Antisäure-Antireflux Waldfrüchte Kautabletten

Natriumalginat 250 mg, Natriumhydrogencarbonat 106,5 mg und Calciumcarbonat 187,5 mg.
Natriumalginat / Natriumhydrogencarbonat / Calciumcarbonat

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist Gaviscon Antisäure-Antireflux Waldfrüchte Kautabletten und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Gaviscon Antisäure-Antireflux Waldfrüchte Kautabletten beachten?
3. Wie ist Gaviscon Antisäure-Antireflux Waldfrüchte Kautabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Gaviscon Antisäure-Antireflux Waldfrüchte Kautabletten aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Gaviscon Antisäure-Antireflux Waldfrüchte Kautabletten und wofür wird es angewendet?

Gaviscon Antisäure-Antireflux Waldfrüchte Kautabletten ist eine Kombination von zwei Antazida, (Calciumcarbonat und Natriumhydrogencarbonat) mit einem Alginat und wirkt zweifach:

1. es neutralisiert übermäßige Magensäure und lindert Schmerzen und Beschwerden.
2. es bildet eine Schutzbarriere um den Mageninhalt, die bis zu 4 Stunden anhalten kann, um die brennenden Schmerzen in Ihrer Brust zu lindern.

Dieses Arzneimittel wird angewendet zur Behandlung von Säure-bedingten Symptomen von gastroösophagealem Reflux, wie saures Aufstoßen, Sodbrennen und Verdauungsstörung, die beispielsweise nach Mahlzeiten oder während der Schwangerschaft auftreten können.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Gaviscon Antisäure-Antireflux Waldfrüchte Kautabletten beachten?

Gaviscon Antisäure-Antireflux Waldfrüchte Kautabletten darf nicht eingenommen werden, wenn Sie allergisch gegen einen in der Abschnitt 6. Genannten sonstigen Bestandteile von dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt ,oder Apotheker bevor Sie Gaviscon Antisäure-Antireflux Waldfrüchte Kautabletten einnehmen:

- wenn Sie an einer **Nieren- oder Herzerkrankung** leiden oder dies in der Vergangenheit der Fall war, da bestimmte Salze diese Erkrankungen beeinflussen könnten.
- - Ihr Arzt sagt Ihnen, dass Sie bestimmte **Zuckerarten** nicht vertragen.
- Wenn Sie eine schwere Nierenprobleme haben.
- Wenn Sie Elektrolytstörung haben, die in einen niedriges Phosphatspiegel im Blut resultiert (Hypophosphatämie).

- wenn Sie wissen, dass Sie geringere Mengen von Magensäure in Ihrem Magen haben, da dieses Produkt dann eine schwächere Wirkung haben kann.

Wie bei anderen Antazida kann die Einnahme von Gaviscon Antisäure-Antireflux Waldfrüchte Kautabletten die Symptome anderer, schwererer Basiserkrankungen maskieren.

Bleiben die Symptome nach 7 Tagen bestehen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Kinder

Geben Sie dieses Arzneimittel nicht an Kinder unter 12 Jahren, es sei denn auf ärztlichen Rat. Bei Kindern mit Nierenproblemen oder entzündeten Magen oder Darm (Gastroenteritis), besteht die Gefahr eines erhöhten Natriumspiegel im Blut (Hypernatriämie).

Einnahme von Gaviscon Antisäure-Antireflux Waldfrüchte Kautabletten zusammen mit anderen Arzneimitteln

Nach der Einnahme anderer Arzneimittel sollten Sie mindestens zwei Stunden warten, bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen. Dies liegt daran, dass dieses Arzneimittel die Wirkung einiger anderer Arzneimittel beeinflussen kann. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie Antihistaminika, Antibiotika (Tetracycline und Chinolone wie Norfloxacin), Eisenpräparate, Schilddrüsenhormone, Antimykotika wie Ketoconazol, Digoxin und Betablocker (bei Herzerkrankungen), Neuroleptika (bei psychischen Störungen), Thyroxin, Chloroquin (bei Malaria), Bisphosphonate (bei Osteoporose) und Estramustin (bei Prostatakrebs) einnehmen.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Sie dürfen dieses Präparat einnehmen, wenn Sie schwanger sind, stillen oder ist geplant schwanger zu sein. Wie bei allen Arzneimitteln muss die Dauer der Behandlung so kurz wie möglich gehalten werden.

Wichtige Informationen über einige der Inhaltsstoffe dieses Arzneimittels:

Dieses Arzneimittel enthält 5,86 mg Aspartam (E951) in jeder Kautablette. Aspartam ist eine Quelle von Phenylalanin. Es kann schädlich sein, wenn Sie an Phenylketonurie (PKU) leiden, einer seltenen genetischen Störung, bei der sich Phenylalanin anreichert, weil der Körper es nicht richtig abbauen kann.

Diese Kautabletten enthalten Carmoisin (E122), der eine allergische Reaktion hervorrufen kann.

Sie enthalten außerdem 223,7 mg (9,728 mmol) Natrium pro vier Kautabletten. Die empfohlene Tageshöchstosis dieses Arzneimittels enthält 895 mg Natrium (enthalten in Kochsalz). Dies entspricht 44,75 % der für Erwachsene empfohlenen maximalen Tagesdosis an Natrium. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie dieses Arzneimittel über einen längeren Zeitraum hinweg täglich einnehmen müssen, insbesondere wenn Ihnen eine salzarme Ernährung empfohlen wurde.

Sie enthalten außerdem 300 mg (7,5 mmol) Calcium pro vier Kautabletten. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen, wenn Sie Nierensteine oder hohe Kalziumwerte im Blut haben.

Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen Ihr Arzt mitgeteilt hat, dass Sie eine Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern haben.

3. Wie ist Gaviscon Antisäure-Antireflux Waldfrüchte Kautabletten einzunehmen?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Zum Einnehmen, Verabreichung vor dem Schlucken gut kauen.

Erwachsene, einschließlich älterer Patienten, und Kinder ab 12 Jahren: wenn Symptome auftreten, nehmen Sie bis zu viermal täglich zwei bis vier Tabletten nach den Mahlzeiten und beim Schlafengehen ein. Kinder unter 12 Jahren: Die Behandlung von Kindern unter 12 Jahren wird nicht empfohlen.

Wenn Sie eine größere Menge von Gaviscon Antisäure-Antireflux Waldfrüchte Kautabletten eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie zu viel von diese Arzneimittel eingenommen haben, ist eine schädliche Wirkung unwahrscheinlich. Sie fühlen sich aber möglicherweise aufgebläht. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn diese Wirkung anhält.

Wenn Sie eine größere Menge von Gaviscon Antisäure-Antireflux Waldfrüchte haben angewendet, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigifzentrum (070/245.245).

Wenn Sie die Einnahme von Gaviscon vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Setzen Sie einfach Ihr normales Einnahmeschema fort.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Wenn Sie diese Nebenwirkungen feststellen, brechen Sie die Einnahme des Präparates ab und wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt. In sehr seltenen Fällen (weniger als 1 von 10.000) besteht die Wahrscheinlichkeit einer allergischen Reaktion auf die Bestandteile. Die Symptome davon können Bauchschmerzen, Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Hautausschlag, Juckreiz, Atembeschwerden, Schwindel oder Anschwellen von Gesicht, Lippen, Zunge, Rachen und Atembeschwerden umfassen.

Die Einnahme großer Mengen von Calciumcarbonat, einem Bestandteil dieses Produkts, kann zu einem Anstieg des pH-Werts im Blut (Alkalose), zu viel Calcium im Blut (Hyperkalzämie), erhöhter Magensäuresekretion und Verstopfung führen. Diese Erscheinungen treten in der Regel nach einer höheren als der empfohlenen Dosierung auf.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das aufgeführte nationale Meldesystem anzeigen.

Belgien : Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte Afdeling Vigilantie, Postbus 97, B-1000 Brüssel Madou, Website: www.notifierunefetindesirable.be, e-mail: adr@fagg-afmps.be. **Luxemburg:** Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy ou Division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la santé
Site internet : www.guichet.lu/pharmacovigilance

5. Wie ist Gaviscon Antisäure-Antireflux Waldfrüchte Kautabletten aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem Blister und Umkarton nach „EXP:“ angeben Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nicht über 30 °C lagern. In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Gaviscon Antisäure-Antireflux Waldfrüchte Kautabletten enthält

Die Wirkstoffe in jeder Kautablette sind 250 mg Natriumalginat, 106,5 mg Natriumhydrogencarbonat und 187,5 mg Calciumcarbonat. Die sonstigen Bestandteile sind Xylit, Carmellose-Natrium, Magnesiumstearat, Macrogol, Mannitol (E421), Copovidon, Acesulfam-K, Aspartam (E951), Preiselbeeraroma, Himbeeraroma, Fruchtaroma und Carmoisinsee (E122). Die Aromen enthalten Propylenglykol (E1520) und Saccharose.

Wie Gaviscon Antisäure-Antireflux Waldfrüchte Kautabletten aussieht und Inhalt der Packung

Flache, runde, zweischichtige Kautabletten mit dem Geruch und Geschmack von gemischten Beeren. Eine Schicht der Kautablette ist rosa mit einem leicht gesprenkelten Aussehen mit GBD-Oberflächenmarkierungen, während die andere Schicht weiß mit Schwert- und Kreis-Oberflächenmarkierungen ist.

Dieses Arzneimittel ist in Packungen mit 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 60, 64, 80 und 112 Kautabletten erhältlich.

Es dürfen nicht alle Packungsgrößen vermarktet werden.

Art der Abgabe: Apothekenpflichtig.

Zulassungsnummer:

BE662036

LU: XXXXXXXXXXXX

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer:

Reckitt Benckiser Healthcare (Belgium) NV/SA
Researchdreef 20
1070 Brussel

Hersteller:

RB NL Brands B.V.
WTC Schiphol Airport,
Schiphol Boulevard 207,
1118 BH Schiphol, Niederlande

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

Österreich- Gaviscon Dual Waldfrucht

Belgien- Gaviscon Antisäure-Antireflux Waldfrüchte Kautabletten

Bulgarien- Gaviscon Double Action mixed berries chewable tablets -

Гавискон двойно действие горски плодове 250 mg/ 106.5 mg/ 187.5 mg таблетки за дъвчене

Dänemark- Galieve Extra

Finnland- Galieve Dual

Deutschland- Gaviscon Dual Waldfrucht

Ungarn- Gaviscon Forte erdei gyümölcs ízű rágótabletta

Island- Galieve Forte tuggutöflur Skógarber

Irland- Gaviscon Extra Mixed Berries Flavour Chewable Tablets Sodium alginate 250 mg Sodium hydrogen carbonate 106.5 mg Calcium carbonate 187.5 mg

Luxemburg- Gaviscon Antiacide-Antireflux Fruits des bois comprimés à croquer

Norwegen- Galieve Forte

Niederlande- Gaviscon Duo Bosvruchten, kauwtabletten

Polen- Gaviscon duo tab o smaku owoców leśnych

Portugal- Gaviscon Duefet Frutos Vermelhos

Rumänien- Gaviscon Forte cu aroma de fructe de padure comprimate masticabile

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 11/2023.