

**Bijsluiter: informatie voor de gebruiker**  
**Hibiwash 40 mg/ml oplossing voor cutaan gebruik**  
chloorhexidinedigluconaat

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

**Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Hibiwash en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

**1. Wat is Hibiwash en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?**

Hibiwash bevat de werkzame stof chloorhexidinedigluconaat. Het hoort bij een groep medicijnen die antiseptica heten (middelen die gebruikt worden om te ontsmetten). Dit medicijn wordt gebruikt voor het ontsmetten van de handen en huid van bacteriën, virussen en schimmels bij volwassenen en kinderen vóór of na een operatie. Daardoor helpt dit medicijn infecties tegen te houden.

**2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

**Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

- U bent allergisch (overgevoelig) voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- Gebruik dit medicijn niet in uw ogen of uw middenoor. Krijgt u dit medicijn per ongeluk toch in uw ogen of oren? Spoel deze dan direct en goed uit met veel water.
- Gebruik dit medicijn niet op zenuwweefsel zoals de hersenen en de vliezen rond uw hersenen en het ruggenmerg (meninges).

**Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?**

Neem contact op met uw verpleegkundige, apotheker of arts voordat u dit medicijn gebruikt.

- Als u een hoofdwond, schade aan uw ruggenmerg of een trommelvlies met een gaatje of een scheur erin heeft (een trommelvliesperforatie). Voordat u geopereerd wordt beslist uw verpleegkundige, apotheker of arts of u dit medicijn veilig kunt gebruiken.
- Hibiwash mag niet met het oog in aanraking komen vanwege het risico op schade met betrekking tot het zicht. Als Hibiwash contact komt met de ogen, moet u uw ogen onmiddellijk en grondig met water uitspoelen. Vraag onmiddellijk om medisch advies in geval van irritatie, roodheid of pijn in het oog, of een stoornis in het zien. Er zijn ernstige gevallen bij patiënten onder algehele anesthesie (diepe pijnloze slaap) gemeld met vergelijkbare producten van aanhoudend hoornvliesletsel (letsel aan het oogoppervlak), die tijdens chirurgische ingrepen per ongeluk in aanraking zijn gekomen met het oog, waarvoor in sommige gevallen een hoornvliestransplantatie nodig was.
- Gebruik dit medicijn niet op diepe en grote wonden.

- Gebruik niet te veel van dit medicijn. Zorg dat het zich niet ophoopt in huidplooiën of onder de patiënt. Zorg er ook voor dat het medicijn niet op materialen druipt die direct contact hebben met de patiënt.
- Spuit dit medicijn niet in.
- In bleek van ziekenhuismiddelen en huishoudmiddelen zitten chemische stoffen die hypochlorieten heten. Deze kunnen bruine vlekken veroorzaken op stoffen die in contact zijn geweest met dit medicijn.
- Gebruik dit medicijn niet samen met andere soorten zeep. Dit kan ervoor zorgen dat het medicijn minder goed werkt.
- Dit medicijn is brandbaar (het kan in brand vliegen). Gebruik dit medicijn niet samen met iets dat brand kan veroorzaken tot uw huid droog is.
- Gebruik dit medicijn nooit voor het ontsmetten van materialen die gebruikt worden bij operaties.

### **Kinderen**

Wees voorzichtig met het gebruik bij pasgeboren baby's en vooral bij te vroeg geboren baby's. Dit medicijn kan dan chemische brandwonden veroorzaken.

### **Zwangerschap en borstvoeding**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

U kunt dit medicijn gebruiken wanneer u zwanger bent. Er zijn geen risico's bekend bij het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of het geven van borstvoeding. Geeft u borstvoeding? Gebruik dit medicijn dan niet op uw borsten.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines.**

Dit medicijn is niet van invloed op hoe goed u kunt autorijden of machines kunt gebruiken.

### **3. Hoe gebruikt u dit medicijn?**

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter staat of zoals uw verpleegkundige, apotheker of arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw verpleegkundige, apotheker of arts.

Gebruik dit medicijn alleen op uw huid.

Verdun dit medicijn niet voor gebruik.

### **Vóór een operatie: chirurgische ontsmetten van de handen**

Spoel uw handen en onderarmen met water. Gebruik 5 milliliter van dit medicijn en was uw handen en onderarmen ongeveer 1 minuut. Maak uw vingernagels schoon met een borstel of nagelschraper. Spoel goed af. Was uw handen en onderarmen opnieuw ongeveer twee minuten. Spoel daarna uw handen en onderarmen opnieuw goed af en droog ze af.

### **Ontsmetten van de huid en handen**

Maak uw huid en handen nat met water. Gebruik 5 milliliter van dit medicijn en was 1 minuut. Spoel goed af en droog af.

### **Vóór uw operatie – uw lichaam wassen**

Was uw hele lichaam minimaal twee keer in bad of onder de douche. Dit gebeurt meestal de dag vóór de operatie en op de dag van uw operatie.

*Hoe wast u zich op de dag vóór en op de dag van uw operatie:*

- Was uw hele lichaam met 25 milliliter van dit medicijn. Gebruik het zoals een zeep. Begin met uw gezicht en werk omlaag langs uw lichaam. Let vooral op de huid rond uw neus, uw oksels, rond uw navel, tussen uw benen, uw kruis en uw zitvlak.
- Spoel daarna uw hele lichaam met water.
- Was opnieuw uw hele lichaam met 25 milliliter van dit medicijn. Was deze keer ook uw haar. Gebruik het medicijn als een shampoo maar zorg ervoor dat het medicijn niet in uw ogen komt)
- Spoel daarna uw hele lichaam af met water en droog uzelf af met een schone handdoek.

### **Na uw operatie – uw lichaam wassen**

Was uw hele lichaam in bad of onder de douche. Doe dit op dezelfde manier als de uitleg hierboven. Was alleen de operatieplek niet. Dit gebeurt meestal pas op de derde dag na uw operatie.

### **Ontsmetten van het operatiegebied vóór de operatie**

Als het nodig is kunt u haar weghalen van het operatiegebied. Maak de huid maximaal 2 minuten lang schoon met dit medicijn. Neem daarna de plek af met een watje of wattenstaafje met steriel water (water zonder ziekmakers zoals bacteriën, virussen en schimmels). Verwijder alle schuim en maak de plek droog.

### **Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?**

Heeft u teveel van dit medicijn gebruikt of ingenomen? Neem dan direct contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Slikt u of uw kind dit medicijn per ongeluk in? Ga dan direct naar de spoedeisende hulp in de buurt of neem contact op met uw arts. Neem deze bijsluiter en al het andere verpakkingsmateriaal mee. De artsen weten dan wat u heeft ingeslikt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw verpleegkundige, apotheker of arts.

## **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen daarmee te maken.

De volgende ernstige bijwerkingen kunnen optreden. Hoe vaak is niet bekend. Dit kan met de beschikbare gegevens ook niet worden bepaald. Stop bij de eerste tekenen van deze reacties direct met het gebruik van dit medicijn. Roep zo snel mogelijk medische hulp in en ga naar een ziekenhuis in de buurt.

- Ernstige allergische reacties (overgevoeligheid, zoals anafylactische shock). Dit kan zwelling van uw lippen, tong en gezicht, huiduitslag en problemen met ademen veroorzaken. Ook kunt u zich zwak voelen en kunt u flauwvallen.
- **Andere bijwerkingen**

Niet bekend: hoe vaak kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald:

- Brandwonden door chemische stoffen bij pasgeboren baby's (neonaten).
- Allergische reacties van de huid. Deze kunnen direct ontstaan of 2 tot 3 dagen of langer na het gebruik van dit medicijn. Deze reacties kunnen zwelling en een rode huid veroorzaken. Ook kunnen ze een jeukende huiduitslag (contactdermatitis) of jeuk, blaren en eczeem veroorzaken.
- Hoornvliesletsel (letsel aan het oppervlak van het oog) en blijvend oogletsel, waaronder blijvende beperking van het zicht (na onverwachte blootstelling van het oog tijdens chirurgische ingrepen aan het hoofd, het gezicht en de hals) bij patiënten onder algehele anesthesie (diepe pijnloze slaap).

## Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het:

**België:** Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

[www.fagg.be](http://www.fagg.be)

Afdeling Vigilantie:

Website: [www.eenbijwerkingmelden.be](http://www.eenbijwerkingmelden.be)

e-mail: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be)

## Luxembourg:

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy ou Division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la santé

Site internet : [www.guichet.lu/pharmacovigilance](http://www.guichet.lu/pharmacovigilance)

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

## 5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de fles na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25 °C.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

## 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

### Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

De werkzame stof in dit medicijn is chloorhexidinedigluconaat. 1 ml bevat 40 mg chloorhexidinedigluconaat. De andere stoffen in dit medicijn zijn poloxamer, isopropylalcohol, cocamidopropylamineoxide, glycerol (E422), macrogol-7-glycerolcocoaat, D-gluconolacton, natriumhydroxide (voor pH-aanpassing) (E524) en gezuiverd water.

### Hoe ziet Chloorhexidine-oplossing eruit en en wat zit er in een verpakking?

Hibiwash is een heldere, kleurloze, iets stroperige oplossing die wordt geleverd in witte plastic flessen en doppen, die 125 ml, 250 ml, 500 ml of 5 liter vloeistof bevatten.

Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

### Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder:

Mölnlycke Health Care AB,  
Entreprenörstråket 21  
SE-431 53 Mölnådal Zweden

**Fabrikant:**

Societe De Production Pharmaceutique Et D'hygiene  
7 Impasse Des Boussenots,  
21800 Quetigny,  
France

Purna Pharmaceuticals NV/SA  
Rijksweg 17  
B 2870 Puurs-Sint-Amands,  
België

**Nummer(s) van de vergunning voor het in de handel brengen**

BE662055, BE662056

LU0952118, LU0951212, LU0952135, LU0952149

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 08/2025.**