

Naam van de patiënt:

<Voorschrijvend/behandelend> arts:

- Naam:

.....

- Contactgegevens (telefoon):

.....

Ziekenhuis/praktijk:

- Naam:

.....

- Contactpersoon voor noodgevallen (telefoon):

.....

XENPOZYME (olipudase alfa)

PATIËNTENKAART

RMA-versie 09/2023
VV-REG-1457426

Deze patiëntenkaart bevat belangrijke informatie waarvan u op de hoogte moet zijn bij behandeling met olipudase alfa. Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het geneesmiddel olipudase alfa gebruikt. De volledige en geactualiseerde tekst van deze bijsluiter is beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek "Zoek informatie over een vergund geneesmiddel".



Algemene richtlijnen

Toon deze kaart aan elke arts of verpleegkundige van wie u medische zorg krijgt.

Scan de QR-code voor meer informatie.

XENPOZYME
(olipudase alfa)

Belangrijke ongewenste reacties

XENPOZYME wordt toegediend als een intraveneuze infusie. In zeldzame gevallen kunnen patiënten tijdens of na het infuus een ernstige allergische reactie ervaren, die onmiddellijk moet worden behandeld.

Roep dringend medische hulp in als een van de volgende tekenen en symptomen optreden of verergeren tijdens of na het infuus:

- Kortademigheid/
Verstikking
- Koorts
- Hoofdpijn
- Duizeligheid, zwakheid
of flauwvallen
- Zwakke en snelle hartslag
- Misselijkheid, braken of diarree
- Blozende en bleke huid,
netelroos, jeukende huid

Meld alle voorvallen aan uw <voorschrijvend/behandelend> arts.

Voor vruchtbare vrouwen, waaronder adolescenten

Bespreek met uw <voorschrijvend/behandelend arts> de noodzaak van contraceptie tijdens de behandeling en tot 14 dagen na de laatste dosis als Xenpozyme wordt gestopt.

Neem contact op met uw <voorschrijvend/behandelend arts> als u vermoedt dat u zwanger bent of als u van plan bent om zwanger te worden.