

## **Bijsluiter: informatie voor de patiënt**

### **Dabigatran Etxilate Viatris 150 mg harde capsules**

*dabigatran etexilaat*

#### **Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit medicijn niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Dabigatran Etxilate Viatris en waarvoor wordt dit medicijn ingenomen?
2. Wanneer mag u Dabigatran Etxilate Viatris niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Dabigatran Etxilate Viatris in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Dabigatran Etxilate Viatris?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

#### **1. Wat is Dabigatran Etxilate Viatris en waarvoor wordt dit medicijn ingenomen?**

De werkzame stof in Dabigatran Etxilate Viatris is dabigatran etexilaat. Dit is een bloedverdunner. Met dit medicijn heeft u minder kans op stolsels in uw bloed. Een stolsel is een propje in uw bloed.

Gebruik van Dabigatran Etxilate Viatris bij volwassenen is bedoeld om:

- bloedstolsels in de hersenen (beroerte) en andere bloedvaten in het lichaam te voorkomen als u een vorm van onregelmatige hartslag genaamd non-valvulair atriumfibrilleren en ten minste één additionele risicofactor heeft.
- bloedpropjes te behandelen in de bloedvaten van uw benen en longen. Maar ook om te voorkomen dat u opnieuw bloedpropjes krijgt in de bloedvaten van uw benen en longen.

Gebruik van Dabigatran Etxilate Viatris bij kinderen is bedoeld om:

- propjes in het bloed te behandelen en om te voorkomen dat propjes opnieuw ontstaan in het bloed.

#### **2. Wanneer mag u Dabigatran Etxilate Viatris niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

##### **Wanneer mag u Dabigatran Etxilate Viatris niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor dabigatran etexilaat of voor een van de andere stoffen in Dabigatran Etxilate Viatris. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- U heeft een sterk verminderde nierfunctie.
- U heeft op dit moment een bloeding.

- U heeft meer kans op het krijgen van erge bloedingen doordat u een ziekte heeft in een orgaan (bijvoorbeeld een maagzweer, een beschadiging of bloeding in uw hersenen, recente operatie aan uw hersenen of ogen).
- U krijgt makkelijk een bloeding. Het is niet altijd bekend waardoor u dit makkelijk krijgt. Dit kan bijvoorbeeld aangeboren zijn. Ook kan het komen door andere medicijnen die u gebruikt.
- U gebruikt een andere bloedverdunner (bijvoorbeeld warfarine, rivaroxaban, apixaban of heparine), behalve wanneer u verandert van behandeling met bloedverdunders, terwijl u een veneuze of arteriële lijn heeft en u heparine krijgt door deze lijn om deze open te houden of wanneer uw hartslag wordt hersteld naar het normale ritme door middel van een ingreep genaamd katheterablatie bij atriumfibrilleren.
- Uw leverfunctie is ernstig verminderd of u heeft een ziekte aan uw lever waaraan u misschien dood kunt gaan.
- U slikt medicijnen tegen schimmelinfecties (ketoconazol of itraconazol).
- U slikt een medicijn dat u krijgt na een transplantatie. Het voorkomt dat het orgaan door uw lichaam wordt afgestoten. U slikt dan ciclosporine.
- U slikt een medicijn tegen hartritmestoornissen (dronedaron).
- U slikt een antiviraal combinatiemedicijn tegen hepatitis C (glecaprevir en pibrentasvir).
- U heeft een kunsthartklep en u moet daarom altijd bloedverdunders gebruiken.

### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?**

Neem contact op met uw arts voordat u Dabigatran Etxilate Viatrijs inneemt. Praat ook met uw arts als u dit medicijn al gebruikt en u klachten krijgt. Of als u geopereerd moet worden.

**Vertel het uw arts** als u nu een ziekte heeft of vroeger ziektes heeft gehad. Zeker als u:

- een grotere kans op bloedingen heeft, omdat:
  - u kortgeleden een bloeding heeft gehad.
  - er in de afgelopen maand een klein stukje weefsel bij u is weggehaald (biopt).
  - u ernstig gewond bent geweest. Bijvoorbeeld een botbreuk, een hoofdwond of een verwonding waaraan u geopereerd moest worden.
  - uw slokdarm of uw maag ontstoken is.
  - uw maagzuur in de slokdarm komt.
  - u medicijnen krijgt die de kans op bloedingen groter maken. Zie hieronder 'Gebruikt u nog andere medicijnen?'.
  - u medicijnen gebruikt bij ontstekingen. Voorbeelden hiervan zijn diclofenac, ibuprofen, piroxicam.
  - u een ontsteking van uw hart heeft (bacteriële endocarditis).
  - uw nieren minder werken. Of u heeft last van uitdroging. (U kunt last hebben van: dorst en kleine beetjes donkere (geconcentreerde)/schuimende plas.)
  - u ouder bent dan 75 jaar.
  - u een volwassen patiënt bent en 50 kg weegt of minder.
  - alleen als het gebruikt wordt door kinderen: als het kind een infectie rond of in de hersenen heeft.
- een hartaanval heeft gehad. Of u heeft een ziekte waardoor u een grotere kans op een hartaanval heeft.
- een ziekte aan uw lever heeft. Door deze ziekte zijn er veranderingen in de uitslag van bloedonderzoeken. Het gebruik van dit medicijn wordt dan niet geadviseerd.

### **Wees extra voorzichtig met Dabigatran Etxilate Viatrijs**

- Als u geopereerd moet worden:  
In dat geval stopt u tijdelijk met het innemen van Dabigatran Etexilate Viatris, omdat u tijdens en kort na de operatie een grotere kans heeft op bloedingen. Het is heel belangrijk dat u Dabigatran Etexilate Viatris vóór en na de operatie precies op de tijdstippen inneemt die uw arts u heeft verteld.
- Als u bij een operatie een ruggenprik krijgt, tegen de pijn of als verdoving:
  - Het is heel belangrijk dat u Dabigatran Etexilate Viatris vóór en na de operatie precies op de tijdstippen inneemt die uw arts u heeft verteld.
  - Vertel het direct aan uw arts als de verdoving is uitgewerkt en u een doof gevoel of krachtverlies in uw benen of problemen met uw darmen of blaas heeft. U heeft dan dringend medische hulp nodig.
- Zoek direct medische hulp als u valt of u zich verwondt tijdens de behandeling. Vooral als u uw hoofd stoot. Het kan zijn dat u onderzocht moet worden door een arts, omdat u mogelijk een grotere kans heeft op bloedingen.
- Als u weet dat u lijdt aan antifosfolipidensyndroom (een aandoening van het immuunsysteem dat een verhoogd risico van bloedstolsels veroorzaakt). Vertel dit aan uw behandelend arts, die zal besluiten of de behandeling wellicht moet worden aangepast.

### **Gebruikt u nog andere medicijnen?**

Gebruikt u naast Dabigatran Etexilate Viatris nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. **Vertel het zeker aan uw arts als u een van de onderstaande medicijnen gebruikt, vóór u Dabigatran Etexilate Viatris gaat gebruiken:**

- Medicijnen tegen de vorming van bloedpropjes (bijvoorbeeld warfarine, fenprocoumon, acenocoumarol, heparine, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, rivaroxaban, acetylsalicylzuur).
- Medicijnen tegen schimmelinfecties (bijvoorbeeld ketoconazol, itraconazol), behalve als u ze op uw huid smeert.
- Medicijnen tegen hartritmestoornissen (bijvoorbeeld amiodaron, dronedaron, kinidine, verapamil). U heeft mogelijk minder nodig van Dabigatran Etexilate Viatris als u medicijnen met verapamil gebruikt. Dit is afhankelijk van de ziekte waarvoor u het krijgt voorgeschreven. Zie ook rubriek 3.
- Medicijnen om orgaanafstoting te voorkomen na een transplantatie (bijvoorbeeld tacrolimus, ciclosporine).
- Een antiviraal combinatiemedicijn tegen hepatitis C (glecaprevir en pibrentasvir).
- Medicijnen bij ontstekingen en pijn. Bijvoorbeeld acetylsalicylzuur, ibuprofen en diclofenac.
- Een kruidenmiddel tegen depressie (sint-janskruid).
- Medicijnen tegen depressie genaamd selectieve serotonineheropnameremmers of serotonine-noradrenalineheropnameremmers.
- De antibiotica rifampicine en claritromycine.
- Antivirale medicijnen tegen aids (bijvoorbeeld ritonavir).
- Sommige medicijnen tegen epilepsie (bijvoorbeeld carbamazepine, fenytoïne).

### **Zwangerschap en borstvoeding**

De gevolgen van Dabigatran Etexilate Viatris op een zwangerschap en het ongeboren kind zijn onbekend. Alléén als uw arts het adviseert mag u dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Bent u een vrouw die zwanger kan worden? Dan kunt u er beter voor zorgen dat u niet zwanger wordt zolang u Dabigatran Etexilate Viatris gebruikt.

Geef geen borstvoeding als u Dabigatran Etxilate Viatris gebruikt.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Dabigatran Etxilate Viatris heeft geen bekende effecten op de rijvaardigheid of het bedienen van machines.

### **3. Hoe neemt u Dabigatran Etxilate Viatris in?**

Dabigatran Etxilate Viatris capsules kunnen worden gebruikt door volwassenen en kinderen van 8 jaar of ouder die de capsules heel kunnen doorslikken. Dit middel is ook beschikbaar in andere dosismvormen die geschikt zijn voor de behandeling van kinderen jonger dan 8 jaar.

Neem dit medicijn altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts.

### **Gebruik Dabigatran Etxilate Viatris zoals aangegeven staat voor de volgende aandoeningen:**

Voorkomen dat u bloedpropjes krijgt die vast komen te zitten in uw hersenvaten (beroerte) of andere bloedvaten. Dit kan komen omdat u last heeft van een haritmestoornis.

Of u krijgt dit medicijn als u bloedpropjes heeft in de bloedvaten van uw benen en longen. Maar ook om te voorkomen dat u bloedpropjes krijgt in de bloedvaten van uw benen en longen.

De aanbevolen dosis is 300 mg, ingenomen als **twee keer per dag 1 capsule van 150 mg**.

Als u **80 jaar of ouder** bent, is de aanbevolen dosis 220 mg, ingenomen als **twee keer per dag 1 capsule van 110 mg**.

Als u **medicijnen met verapamil** gebruikt, moet u worden behandeld met een verlaagde dosis Dabigatran Etxilate Viatris van 220 mg, ingenomen als **twee keer per dag 1 capsule van 110 mg**, omdat uw risico op bloedingen verhoogd kan zijn.

Als u een **mogelijk hoger risico op bloedingen** heeft, kan uw arts besluiten om een dosis van 220 mg voor te schrijven, die moet worden ingenomen als **twee keer per dag 1 capsule van 110 mg**.

U kunt dit medicijn blijven gebruiken als u een behandeling krijgt om uw hartritme weer normaal te maken. Bij zo'n behandeling krijgt u een elektrische schok (cardioversie) of u krijgt een zogenaamde procedure katheterablatie bij atriumfibrilleren. Neem Dabigatran Etxilate Viatris in zoals uw arts u dat heeft verteld.

Als er een medisch hulpmiddel (stent) in een bloedvat is geplaatst om het open te houden tijdens een ingreep genaamd percutane coronaire interventie met stentimplantatie, kunt u worden behandeld met Dabigatran Etxilate Viatris wanneer uw arts heeft besloten dat een normale bloedstollingswaarde is behaald. Gebruik Dabigatran Etxilate Viatris zoals uw arts u heeft verteld.

Behandelen van propjes in het bloed en voorkomen dat propjes opnieuw ontstaan in het bloed bij kinderen

Neem twee keer per dag Dabigatran Etxilate Viatris in. Eén dosis in de ochtend en één dosis in de avond, elke dag op ongeveer dezelfde tijd. De tijd tussen de innames moet zo dicht mogelijk bij 12 uren liggen.

Hoeveel u moet innemen, wordt bepaald door gewicht en leeftijd. Uw arts zegt hoeveel er wordt ingenomen. Uw arts kan deze hoeveelheid aanpassen tijdens de behandeling. Blijf alle andere medicijnen gebruiken, tenzij uw arts u vertelt dat u ermee moet stoppen.

Hieronder ziet u tabel 1. In de tabel is aangegeven hoeveel Dabigatran Etxilate Viatris in milligram (mg) per keer wordt ingenomen. Daarnaast staat hoeveel Dabigatran Etxilate Viatris in totaal per dag moet worden ingenomen. De hoeveelheid wordt bepaald door het gewicht in kilogram (kg) en de leeftijd in jaren van de patiënt.

Tabel 1: Doseringstabel voor Dabigatran Etxilate Viatris-capsules

Gewichts-/leeftijdscombinatie		Enkelvoudige dosis in mg	Totale dagelijkse dosis in mg
Gewicht in kg	Leeftijd in jaren		
11 tot minder dan 13 kg	8 tot jonger dan 9 jaar	75	150
13 tot minder dan 16 kg	8 tot jonger dan 11 jaar	110	220
16 tot minder dan 21 kg	8 tot jonger dan 14 jaar	110	220
21 tot minder dan 26 kg	8 tot jonger dan 16 jaar	150	300
26 tot minder dan 31 kg	8 tot jonger dan 18 jaar	150	300
31 tot minder dan 41 kg	8 tot jonger dan 18 jaar	185	370
41 tot minder dan 51 kg	8 tot jonger dan 18 jaar	220	440
51 tot minder dan 61 kg	8 tot jonger dan 18 jaar	260	520
61 tot minder dan 71 kg	8 tot jonger dan 18 jaar	300	600
71 tot minder dan 81 kg	8 tot jonger dan 18 jaar	300	600
81 kg of meer	10 tot jonger dan 18 jaar	300	600

Enkelvoudige doses waarvoor meer dan één capsule nodig is:

- 300 mg: twee capsules van 150 mg of vier capsules van 75 mg
- 260 mg: één capsule van 110 mg plus één capsule van 150 mg of één capsule van 110 mg plus twee capsules van 75 mg
- 220 mg: twee capsules van 110 mg
- 185 mg: één capsule van 75 mg plus één capsule van 110 mg
- 150 mg: één capsule van 150 mg of twee capsules van 75 mg

### Hoe neemt u Dabigatran Etxilate Viatris in?

Dabigatran Etxilate Viatris kan bij het eten worden ingenomen, maar dat hoeft niet. Slik de capsule heel door met een glas water, om ervoor te zorgen dat de capsule in de maag terechtkomt. Maak de capsule niet open en kauw er niet op. U mag de bolletjes niet uit de capsule halen. Hierdoor wordt de kans op bloedingen namelijk groter.

### Instructies voor de fles

- Druk de dop in en draai daarna de dop om de fles open te maken.
- Draai de dop direct weer stevig op de fles nadat u een capsule heeft gepakt.

### Veranderen van het gebruik van de bloedverdunner

U mag niet zelf uw gebruik van de bloedverdunner veranderen zonder specifiek advies van uw arts.

### **Heeft u te veel van Dabigatran Etexilate Viatris ingenomen?**

*Wanneer u te veel van Dabigatran Etexilate Viatris heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).*

Neem direct contact op met uw arts als u te veel capsules van dit medicijn heeft ingenomen. U heeft dan een grotere kans op bloedingen. Uw arts weet hoe u dan behandeld moet worden.

### **Bent u vergeten Dabigatran Etexilate Viatris in te nemen?**

Duurt het nog langer dan 6 uur voordat u uw volgende capsule moet innemen? Neem dan direct de vergeten capsule in.

Duurt het korter dan 6 uur voordat u uw medicijn weer moet innemen? Sla dan de vergeten capsule over. Neem een capsule in op het volgende vaste tijdstip.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

### **Als u stopt met het innemen van dit medicijn**

Neem Dabigatran Etexilate Viatris altijd in zoals uw arts u dat heeft verteld. Stop niet zomaar met het innemen van dit medicijn. Wilt u stoppen met dit medicijn? Vraag dat dan eerst aan uw arts. Als u te vroeg stopt met dit medicijn kan er een bloedprop ontstaan. Vertel het uw arts als u last krijgt van spijsverteringsklachten nadat u Dabigatran Etexilate Viatris heeft ingenomen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Dabigatran Etexilate Viatris heeft invloed op de bloedstolling, want het is een bloedverdunner. De meeste bijwerkingen hebben daarom te maken met klachten als blauwe plekken of bloedingen. Er kunnen zware of ernstige bloedingen optreden. Dat zijn de meest ernstige bijwerkingen. Door deze bijwerkingen kunt u invalide worden. Ze kunnen ook levensbedreigend zijn of zelfs een dodelijke afloop hebben. Deze bloedingen zijn soms niet duidelijk te zien.

Neem direct contact op met uw arts als u een bloeding heeft die niet vanzelf stopt, of als u klachten heeft van een ernstige bloeding (zoals: uitzonderlijke zwakte, moe voelen, minder kleur in uw gezicht, duizelig zijn, hoofdpijn of onverklaarde zwelling). Uw arts kan besluiten om u vaker te controleren of om uw behandeling te wijzigen.

Neem direct contact op met uw arts als u een ernstige allergische reactie heeft, waardoor u moeite met ademen krijgt of duizelig wordt.

Mogelijke bijwerkingen worden hieronder genoemd. Ze staan op volgorde van hoe vaak ze voorkomen.

Voorkomen dat u bloedpropjes krijgt die vast komen te zitten in uw hersenvaten (beroerte) of andere bloedvaten. Dit kan komen omdat u last heeft van een hartritmestoornis.

Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij maximaal 1 op de 10 gebruikers):

- een bloeding uit de neus, in de maag of darm, uit de penis/vagina of de urinewegen (dit kan ook bloed in uw plas zijn, waardoor de plas roze of rood van kleur is), of onder de huid
- minder rode bloedcellen in het bloed
- pijn in de maag of buik
- spijsverteringsklachten
- vaak dunne of vloeibare ontlasting
- misselijkheid

Soms voorkomende bijwerkingen (komen voor bij maximaal 1 op de 100 gebruikers):

- bloeding
- een bloeding uit aambeien, uit de endeldarm (dit is het laatste stuk van de dikke darm), of in de hersenen
- blauwe plekken (hematomen)
- ophoesten van bloed of bloederig opgehoest slijm
- minder bloedplaatjes in het bloed
- minder hemoglobine (onderdeel van rode bloedcellen) in het bloed
- allergische reactie
- opeens een verandering van de kleur en het uiterlijk van de huid
- jeuk
- zweer in de maag of darm (inclusief zweer in de slokdarm)
- ontsteking van de slokdarm en de maag
- het omhoog komen van maagzuur in de slokdarm
- overgeven
- problemen met slikken
- ongewone uitkomsten van laboratoriumonderzoeken naar de werking van de lever

Zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij maximaal 1 op de 1000 gebruikers):

- een bloeding in een gewricht, uit een operatiewond, uit een verwonding, op de plek waar u een injectie heeft gehad of op de plek waar een slangetje (katheter) een bloedvat ingaat
- ernstige allergische reactie, waardoor u moeite heeft met ademen of duizelig bent
- ernstige allergische reactie, waardoor uw gezicht of keel dik wordt
- huiduitslag met donkerrode, verheven, jeukende bultjes door een allergische reactie
- minder bloedcellen
- verhoogde leverenzymwaarden
- gelige verkleuring van uw huid of oogwit, als gevolg van leverproblemen of bloedproblemen

Niet bekend (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

- moeite met ademen of piepende ademhaling
- te weinig of zelfs geen witte bloedcellen (die helpen infecties te bestrijden)
- haarverlies

In een klinisch onderzoek werd met dabigatran etexilaat een hoger aantal hartaanvallen waargenomen dan met warfarine. Het totale aantal was laag.

Behandelen van bloedpropjes in de bloedvaten van uw benen en longen. Maar ook om te voorkomen dat u bloedpropjes krijgt in uw benen en/of longen.

Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij maximaal 1 op de 10 gebruikers):

- een bloeding uit de neus, in de maag of darm, uit de endeldarm (dit is het laatste stuk van de dikke darm), uit de penis/vagina of de urinewegen (dit kan ook bloed in uw plas zijn, waardoor de plas roze of rood van kleur is), of onder de huid
- spijsverteringsklachten

Soms voorkomende bijwerkingen (komen voor bij maximaal 1 op de 100 gebruikers):

- bloeding
- bloeding in een gewricht of door een verwonding
- bloeding uit aambeien
- minder rode bloedcellen in het bloed
- blauwe plekken (hematomen)
- ophoesten van bloed of bloederig opgehoest slijm
- allergische reactie
- opeens een verandering van de kleur en het uiterlijk van de huid
- jeuk
- zweer in de maag of darm (inclusief zweer in de slokdarm)
- ontsteking van de slokdarm en de maag
- het omhoog komen van maagzuur in de slokdarm
- misselijkheid
- overgeven
- pijn in de maag of buik
- vaak dunne of vloeibare ontlasting
- ongewone uitkomsten van laboratoriumonderzoeken naar de werking van de lever
- verhoogde leverenzymwaarden

Zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij maximaal 1 op de 1000 gebruikers):

- een bloeding uit een operatiewond, op de plek waar u een injectie heeft gehad, op de plek waar een slangetje (katheter) een bloedvat ingaat of in de hersenen
- minder bloedplaatjes in het bloed
- ernstige allergische reactie waardoor u moeite heeft met ademen of duizelig wordt
- ernstige allergische reactie waardoor uw gezicht of keel dik wordt
- huiduitslag met donkerrode, verheven, jeukende bultjes door een allergische reactie
- problemen met slikken.

Niet bekend (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

- moeite met ademhalen of piepende ademhaling
- minder hemoglobine (onderdeel van rode bloedcellen) in het bloed
- minder bloedcellen
- te weinig of zelfs geen witte bloedcellen (die helpen infecties te bestrijden)
- gelige verkleuring van uw huid of oogwit, als gevolg van leverproblemen of bloedproblemen
- haarverlies.

In het onderzoeksprogramma werd met dabigatran etexilaat een hoger aantal hartaanvallen waargenomen dan met warfarine. Het totale aantal was laag. Er was geen verschil in het aantal hartaanvallen bij patiënten behandeld met dabigatran tegenover patiënten die behandeld werden met placebo.

Behandelen van propjes in het bloed en voorkomen dat propjes opnieuw ontstaan in het bloed bij kinderen



Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij maximaal 1 op de 10 gebruikers):

- minder rode bloedcellen in het bloed
- minder bloedplaatjes in het bloed
- huiduitslag met donkerrode, verheven, jeukende bultjes door een allergische reactie
- opeens een verandering van de kleur en het uiterlijk van de huid
- blauwe plekken (hematomen)
- bloedneus
- het omhoog komen van maagzuur in de slokdarm
- overgeven
- misselijkheid
- vaak dunne of vloeibare ontlasting
- spijsverteringsklachten
- haarverlies
- verhoogde leverenzymwaarden

Soms voorkomende bijwerkingen (komen voor bij maximaal 1 op de 100 gebruikers):

- minder witte bloedcellen (die helpen infecties te bestrijden)
- een bloeding die zich kan voordoen in de maag of darm, in de hersenen, uit de endeldarm (dit is het laatste stuk van de dikke darm), uit de penis/vagina of de urinewegen (dit kan ook bloed in de plas zijn, waardoor de plas roze of rood van kleur is), of onder de huid
- minder hemoglobine (onderdeel van rode bloedcellen) in het bloed
- minder bloedcellen
- jeuk
- ophoesten van bloed of bloederig opgehoest slijm
- pijn in de maag of buik
- ontsteking van de slokdarm en de maag
- allergische reactie
- problemen met slikken
- gelige verkleuring van uw huid of oogwit, als gevolg van leverproblemen of bloedproblemen.

Niet bekend (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

- te weinig of zelfs geen witte bloedcellen (die helpen infecties te bestrijden)
- ernstige allergische reactie waardoor u moeite heeft met ademen of duizelig wordt
- ernstige allergische reactie waardoor uw gezicht of keel dik wordt
- moeite met ademhalen of piepende ademhaling
- bloeding
- een bloeding die zich kan voordoen in een gewricht, na een verwonding, uit een operatiewond, op de plek waar u een injectie heeft gehad of op de plek waar een slangetje (katheter) een bloedvat ingaat
- een bloeding die zich kan voordoen uit aambeien
- zweer in de maag of darm (inclusief zweer in de slokdarm)
- ongewone uitkomsten van laboratoriumonderzoeken naar de werking van de lever

### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via:

België:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

[www.fagg.be](http://www.fagg.be)

Afdeling Vigilantie:

Website: [www.eenbijwerkingmelden.be](http://www.eenbijwerkingmelden.be)

e-mail: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be)

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit medicijn.

## 5. Hoe bewaart u Dabigatran Etexilate Viatris?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos, de blisterverpakking of de fles na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert, worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

## 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

### Welke stoffen zitten er in Dabigatran Etexilate Viatris?

- De werkzame stof in dit medicijn is dabigatran etexilaat. Elke harde capsule bevat dabigatran etexilaatmesilaat overeenkomend met 150 mg dabigatran etexilaat.
- De andere stoffen in dit medicijn zijn tartaarzuur (E334), hydroxypropylcellulose (E463), talk (E553b) en hypromellose (E464).
- De stoffen in de capsulewand zijn briljantblauw FCF (E133), titaandioxide (E171) en hypromellose (E464).
- De stoffen in de drukinkt zijn schellak (E904), propyleenglycol (E1520), sterke ammoniakoplossing (E527), zwart ijzeroxide (E172) en kaliumhydroxide (E525).

### Hoe ziet Dabigatran Etexilate Viatris eruit en wat zit er in een verpakking?

Dabigatran Etexilate Viatris 150 mg zijn harde capsules, ongeveer 21 mm lang met een ondoorzichtige, lichtblauw gekleurde bovenste capsulehelft en een ondoorzichtige, wit gekleurde onderste capsulehelft, gevuld met lichtgele tot gelige korrels, bedrukt met 'VTRS' over 'DC150' op zowel de bovenste als de onderste helft met zwarte inkt.

Dabigatran Etexilate Viatris is verkrijgbaar in verpakkingen van 30, 60 of 180 capsules in blisterverpakkingen van aluminium-OPA/aluminium/PVC.

Dabigatran Etexilate Viatris is verkrijgbaar in verpakkingen van 10x1, 30x1, 60x1, 100x1 of 180x1 capsules in geperforeerde eenheidsblisterverpakkingen van aluminium-OPA/aluminium/PVC.

Dabigatran Etexilate Viatris is ook verkrijgbaar in verpakkingen met 100 of 180 capsules in HDPE flessen met een kindveilige schroefdop. De fles bevat ook een droogmiddel (silicagel).

Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

**Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

*Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:*

Viatrix GX  
Terhulpesteenweg 6A  
B-1560 Hoeilaart

*Fabrikant:*

Mylan Hungary Kft, Mylan Ut 1., Komarom, 2900, Hongarije  
Mylan Germany GmbH, Benzstrasse 1, Bad Homburg, 61352, Duitsland

**Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen**

Dabigatran Etxilate Viatrix 150 mg harde capsules: BE662515 (Blisterverpakking)  
Dabigatran Etxilate Viatrix 150 mg harde capsules: BE662516 (Fles)

**Dit medicijn is geregistreerd in lidstaten van de Europese Economische Ruimte onder de volgende namen:**

SE Dabigatran Etxilate Viatrix  
AT Dabigatranetexilat Viatrix 150 mg Hartkapsel  
BE Dabigatran Etxilate Viatrix 150 mg harde capsules  
BG Дабигатран етексилат Виатрис 150 мг твърди капсули  
CY Dabigatran Etxilate Viatrix  
CZ Dabigatran Etxilate Viatrix  
DE Dabigatranetexilat Viatrix 150 mg Hartkapseln  
DK Dabigatran Etxilate Viatrix  
EE Dabigatran Etxilate Viatrix  
GR Dabigatran Etxilate/Viatrix  
ES Dabigatrán Etxilato Viatrix 150 mg cápsulas duras EFG  
FI Dabigatran Etxilate Viatrix  
FR DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS SANTE 150 mg, gélule  
HR Dabigatraneteksilat Viatrix 150 mg tvrde kapsule  
HU Dabigatran Etxilate Viatrix 150 mg kemény kapszula  
IS Dabigatran Etxilate Viatrix  
IT Dabigatran etexilato Viatrix 150 mg capsule rigide  
LT Dabigatran etexilate Viatrix 150 mg kietosios kapsulės  
LU Dabigatran Etxilate Viatrix 150 mg gélules  
LV Dabigatran Etxilate Viatrix 150 mg cietās kapsulas  
MT Dabigatran Etxilate Viatrix 150 mg hard capsules  
NL Dabigatran etexilaat Viatrix 150 mg harde capsules  
NO Dabigatran Etxilate Viatrix  
PL Dabigatran Etxilate Viatrix  
PT Dabigatrano etexilato Mylan 150 mg Cápsulas  
RO Dabigatran Etxilat Viatrix 150 mg capsule  
SI Dabigatraneteksilat Viatrix 150 mg trde kapsule  
SK Dabigatran Etxilate Viatrix 150 mg tvrdé kapsuly

**Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 04/2024.**

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 07/2024.**