

GEBRAUCHSINFORMATION : INFORMATION FÜR ANWENDER

Gaviscon Antisäure - Antireflux Waldfrüchte Suspension zum Einnehmen

Natriumalginat, Natriumhydrogencarbonat und Calciumcarbonat.

500 mg, 213 mg, 325 mg

Suspension zum Einnehmen im Beutel.

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist Gaviscon Antisäure - Antireflux Unidose und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Gaviscon Antisäure - Antireflux Unidose beachten?
3. Wie ist Gaviscon Antisäure – Antireflux Unidose einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Gaviscon Antisäure - Antireflux Unidose aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST GAVISCON ANTISÄURE - ANTIREFLUX UNIDOSE UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Gaviscon Antisäure - Antireflux Unidose ist eine Kombination von zwei Antazida (Calciumcarbonat und Natriumhydrogencarbonat) mit einem Alginat und wirkt zweifach:

1. es neutralisiert übermäßige Magensäure und lindert Schmerzen und Beschwerden.
2. es bildet eine Schutzbarriere um den Mageninhalt, die bis zu 4 Stunden anhalten kann, um die brennenden Schmerzen in Ihrer Brust zu lindern.

Dieses Arzneimittel wird angewendet zur Behandlung von Säure-bedingten Symptomen von gastroösophagealem Reflux, wie saures Aufstoßen, Sodbrennen und Verdauungsstörung, die beispielsweise nach Mahlzeiten oder während der Schwangerschaft sowie bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren auftreten können.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON GAVISCON ANTISÄURE – ANTIREFLUX UNIDOSE BEACHTEN?

Gaviscon darf nicht eingenommen werden,

wenn Sie allergisch gegen einen der in Abschnitt 6. genannten Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Gaviscon Antisäure – Antireflux Unidose anwenden

- Wenn Sie eine schwere Nierenprobleme haben.
- Wenn Sie Elektrolytstörung haben, die in einen niedrigen Phosphatspiegel im Blut resultiert (Hypophosphatämie).
- Wenn Sie an einer Nieren- oder Herzerkrankung leiden oder dies in der Vergangenheit der Fall war, da bestimmte Salze diese Erkrankungen beeinflussen könnten.
- Wenn Sie wissen, dass Sie geringere Mengen von Magensäure in Ihrem Magen haben, da dieses Produkt dann eine schwächere Wirkung haben kann.

Wie bei anderen Antazida kann die Einnahme von Gaviscon Antisäure - Antireflux Unidose die Symptome anderer, schwererer Basiserkrankungen maskieren.
Bleiben die Symptome nach 7 Tagen bestehen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Kinder

Die Behandlung von Kindern unter 12 Jahren wird nicht empfohlen. Bei Kindern mit Nierenproblemen oder entzündeten Magen oder Darm (Gastroenteritis), besteht die Gefahr eines erhöhten Natriumspiegel im Blut (Hypernatriämie).

Einnahme von Gaviscon zusammen mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Nach der Einnahme anderer Arzneimittel sollten Sie mindestens zwei Stunden warten, bevor Sie Gaviscon Antacid-Antireflux einnehmen. Dies liegt daran, dass Gaviscon Antacid-Antireflux die Wirkung einiger anderer Arzneimittel beeinflussen kann. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie Arzneimittel gegen Allergien (Antihistaminika), Arzneimittel gegen Entzündungen, die durch Bakterien verursacht werden (Antibiotika Tetracycline und Chinolone wie Norfloxacin), eisenhaltige Arzneimittel, Schilddrüsenhormone, Antimykotika wie Ketoconazol, Digoxin und Betablocker (gegen Herzkrankheiten), Antipsychotika (Neuroleptika), Thyroxin, Chloroquin (gegen Malaria), Bisphosphonate (gegen Osteoporose) und Estramustin (gegen Prostatakrebs).

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Sind Sie schwanger, denken Sie, dass Sie schwanger sein könnten, planen Sie, schwanger zu werden oder stillen Sie? Wenn ja, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie dieses Arzneimittel anwenden.

Sie dürfen dieses Arzneimittel anwenden, wenn Sie schwanger sind oder stillen oder wenn Sie eine Schwangerschaft planen. Wie bei allen Arzneimitteln sollte die Behandlung mit diesem Arzneimittel nicht länger als nötig dauern.

Wichtige Informationen über einige der in diesem Arzneimittel enthaltenen Stoffe:

Dieses Arzneimittel enthält 40 mg Methyl- (E 218) und 6 mg Propylhydroxyparabene (E 216) pro 10 ml. Kann (möglicherweise verzögert) allergische Reaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

Dieses Arzneimittel enthält 32 Milligramm Propylenglykol (E1520) pro 10-Milliliter-Dosis.

Dieses Arzneimittel enthält 128 mg Natrium (5,6 mmol) pro 10 ml/1 Beutel Dosis. Die empfohlene Tageshöchstdosis dieses Arzneimittels enthält 1023 mg Natrium (in Kochsalz). Dies entspricht 51 % der empfohlenen Tageshöchstdosis für Natrium bei Erwachsenen. Sprechen Sie mit Ihrem Apotheker oder Arzt, wenn Sie Gaviscon Antisäure – Antireflux Unidose täglich über einen längeren Zeitraum benötigen, insbesondere wenn Ihnen eine salzarme Ernährung empfohlen wurde.

Dieses Arzneimittel enthält 130 mg Calcium (3,25 mmol) pro dosis. Wenden Sie an Ihrem Arzt vor der Anwendung dieses Arzneimittels, wenn Sie Nierensteine haben oder haben ein hohes Maß an Calcium im Blut.

3. WIE IST GAVISCON ANTISÄURE – ANTIREFLUX UNIDOSE EINZUNEHMEN?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Zum Einnehmen. Vor Gebrauch gut schütteln.

Erwachsene, einschließlich älterer Patienten, und Kinder ab 12 Jahren

Beim Auftreten von Beschwerden nehmen Sie 10 bis 20 Milliliter nach den Mahlzeiten und vor dem Schlafengehen ein. Nehmen Sie bis zu viermal täglich ein.

Kinder unter 12 Jahren: Die Behandlung von Kindern unter 12 Jahren wird nicht empfohlen.

Wenn Sie eine größere Menge von Gaviscon eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie zu viel von diesem Arzneimittel eingenommen haben, ist eine schädliche Wirkung unwahrscheinlich. Sie fühlen sich aber möglicherweise aufgebläht. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn diese Wirkung anhält.

Wenn Sie zu viel Gaviscon Antisäure – Antireflux eingenommen haben, nehmen Sie unverzüglich Kontakt mit Ihrem behandelnden Arzt, Ihrem Apotheker oder der Giftnotrufzentrale auf (070/245.245).

Wenn Sie die Einnahme von Gaviscon vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Setzen Sie einfach Ihr normales Einnahmeschema fort.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

- In sehr seltenen Fällen (Nebenwirkungen treten bei weniger als 1 von 10.000 Anwendern auf) kann eine allergische Reaktion auf einen der Inhaltsstoffe dieses Arzneimittels auftreten.

Mögliche Symptome, die dann auftreten können, sind Schwellungen des Gesichts, der Lippen, der Zunge oder des Rachens und Atembeschwerden (anaphylaktische Reaktion, anaphylaktoide Reaktion) oder ein juckender Hautausschlag (Urtikaria).

- Weitere Symptome sind Bauchschmerzen, Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Juckreiz oder Hautausschlag und Keuchen (Bronchospasmus).

Die Aufnahme großer Mengen Calciumcarbonat, ein Bestandteil dieses Präparats, kann zu einem Anstieg des pH-Werts des Blutes (Alkalose), zu hohen Calciumwerten im Blut (Hyperkalzämie), verstärkter Absonderung von Magensäure und Verstopfung führen. Diese Wirkungen treten normalerweise nach höheren als den empfohlenen Dosierungen auf.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das aufgeführte nationale Meldesystem anzeigen.

Belgien: Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte
www.afmps.be, Abteilung Vigilanz: Website: www.notifieruneffetindesirable.be
e-mail: adr@fagg-afmps.be

Luxemburg: Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy oder Abteilung Pharmazie und Medikamente (Division de la pharmacie et des médicaments) der Gesundheitsbehörde in Luxemburg
Website : www.guichet.lu/pharmakovigilanz

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST GAVISCON ANTISÄURE - ANTIREFLUX UNIDOSE AUFZUBEWAHREN?

- Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.
- Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Beutel und auf dem Umkarton nach „EXP:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.
- Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Gaviscon Antisäure - Antireflux Unidose enthält

- Die Wirkstoffe Natriumalginat, Natriumhydrogencarbonat und Calciumcarbonat. Jeder 10ml Beutel enthält 500 mg Natriumalginat, 213 mg Natriumhydrogencarbonat und 325 mg Calciumcarbonat.
- Die sonstigen Bestandteile sind Carbomer, Methyl- (E 218) und Propylparabene (E 216), Natriumsaccharin, Himbeergeschmack, Preiselbeergeschmack, Fruchtaroma (enthält Propylenglykol (E1520)), Natriumhydroxid und gereinigtes Wasser.

Wie Gaviscon Antisäure - Antireflux Unidose aussieht und Inhalt der Packung

Gaviscon Antisäure - Antireflux ist eine gebrochen weiße bis cremefarbene Suspension mit Waldfrüchte und -aroma.

Dieses Medikament ist in Flaschen mit 150, 200, 250, 300, 500 und 600 Millilitern erhältlich. Kann in einem Umkarton geliefert werden. Kann mit einem Messbecher (natürliches Polypropylen) mit einer Skaleneinteilung von 5 Millilitern, 10 Millilitern, 15 Millilitern und 20 Millilitern geliefert werden. Es dürfen nicht alle aufgeführten Packungsgrößen in den Verkehr gebracht werden. Die Schachtel und das Messgerät sind möglicherweise nicht in allen Packungsgrößen enthalten.

Art der Abgabe: Arzneimittel, das nicht der Verschreibungspflicht unterliegt.

Zulassungsnummer:

BE: BE662887

LU: 2025050110

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer:

Reckitt Benckiser Healthcare (Belgium) SA/NV

Industrielaan 13B

1070 Brussel

Hersteller:

RB NL Brands B.V.

Schiphol Boulevard 207,

1118 BH Schiphol,

Niederlande

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

Belgien	Gaviscon Antizuur-Antireflux Bosvruchten suspensie voor oraal gebruik Gaviscon Antiacide-Antireflux Fruits des bois suspension buvable Gaviscon Antisäure - Antireflux Waldfrüchte Suspension zum Einnehmen
Bulgarien	Gaviscon Double Action Liquid mixed berries 500 mg/213 mg/325 mg oral suspension - Гавискон Двойно Действие Ликвид горски плодове 500 mg/213 mg/325 mg перорална суспензия
Dänemark	Galieve Forte Mixed Berries
Deutschland	GAVISCON DUAL Waldfrucht
Finnland	Galieve Dual
Ungarn	GAVISCON FORTE erdei gyümölcs ízű felsőleges szuszpenzió
Irland	Gaviscon Extra Mixed Berries Oral Suspension

	Sodium alginate 500mg/ 10 ml Sodium hydrogen carbonate 213mg/ 10 ml
	Calcium carbonate 325mg/ 10 ml
Italien	Gaviscon Bruciore e Indigestione
Luxemburg	Gaviscon Antiacide-Antireflux saveur de fruits des bois
Niederlande	Gaviscon Duo bosvruchtensmaak 500 mg/ 213 mg/ 325 mg, suspensie voor oraal gebruik
Norwegen	Galieve Forte
Österreich	GAVISCON DUAL Waldfrucht
Polen	Gaviscon duo o smaku owoców leśnych
Romenia	Gaviscon Forte cu aromă de fructe de pădure suspensie orală.
Schweden	Galieve Dual

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 12/2025