

1.3.1.3. Package leaflet

Notice : information de l'utilisateur

DROSETUX sirop

Arnica montana 4 CH, Belladonna 4 CH, Cina 4 CH, Coccus cacti 5 CH,
Corallium rubrum 4 CH, Cuprum metallicum 5 CH, Drosera 4 CH,
Ferrum phosphoricum 5 CH, Ipeca 4 CH, Solidago virga aurea 3 DH

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3 jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DROSETUX sirop et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DROSETUX sirop ?
3. Comment prendre DROSETUX sirop ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DROSETUX sirop ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que DROSETUX sirop et dans quel cas est-il utilisé ?

Médicament homéopathique associant des composants traditionnellement utilisés dans le traitement des toux sèches ou non productives et dans les toux d'irritation.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DROSETUX sirop ?

Ne prenez jamais DROSETUX

Si vous êtes allergique aux substances actives, à une plante de la famille des Asteracées (Composées) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre DROSETUX.

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de toux productives (toux grasses) qui doivent être respectées car il est nécessaire d'évacuer les sécrétions bronchiques.

Enfants

Ce médicament est aussi indiqué chez les enfants.

Autres médicaments et DROSETUX

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Il n'existe pas de données sur l'utilisation de DROSETUX chez la femme enceinte ou allaitante. Aucun effet indésirable lié aux substances actives n'est attendu durant la grossesse ou l'allaitement en raison de leur degré de dilution.

Dans l'état actuel des connaissances, DROSETUX peut être pris durant la grossesse et l'allaitement suivant la posologie indiquée.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

DROSETUX n'a aucun effet ou qu'un effet négligeable sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

DROSETUX contient du saccharose, de l'éthanol, du benzoate de sodium et du sodium

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament :

- 100 g contiennent 64,14 g de saccharose.
- 1 dose de 2,5 ml = 2,1 g de saccharose.
- 1 dose de 5 ml = 4,2 g de saccharose.
- 1 dose de 15 ml = 12,6 g de saccharose.

Ceci doit être pris en compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou en cas de diabète sucré.

Ce médicament contient 0,001 ml d'alcool (éthanol) par dose de 15 ml, ce qui correspond à une teneur de 0,00471%V/V d'alcool. La quantité dans 15 ml de ce médicament équivaut à 0,014 ml de bière ou 0,0057ml de vin.

La faible quantité d'alcool contenu dans ce médicament n'est pas susceptible d'entraîner d'effet notable

Ce médicament contient 6,55 mg/ 13,1 mg/ 39,3 mg de benzoate de sodium pour chaque prise de 2,5ml / 5ml / 15ml. Le sel de benzoate peut accroître le risque d'ictère (jaunissement de la peau et des yeux) chez les nouveau-nés (jusqu'à 4 semaines).

Ce médicament contient moins d'1mmol sodium (23 mg) par 15ml de prise, il est donc essentiellement « sans sodium »

3. Comment prendre DROSETUX sirop ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie :

- Adultes : 1 dose de 15 ml à l'aide du godet-doseur, 2 à 3 fois par jour.

- Enfants à partir de 5 ans : 1 dose de 5 ml à l'aide du godet-doseur, 3 à 5 fois par jour.
- Enfants de moins de 5 ans : 1 dose de 2,5 ml à l'aide du godet-doseur, 3 à 4 fois par jour.

Mode d'administration :

Voie orale. Les prises doivent être réparties au cours de la journée, de préférence en dehors des repas, et au coucher. Utiliser le godet-doseur fourni dans l'emballage pour administrer le sirop. La quantité en ml est indiquée sur le godet-doseur.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 3 jours, un médecin doit être consulté.

Si vous avez pris plus de DROSETUX que vous n'auriez dû

Compte tenu de la composition de ce médicament, il n'y a pas de risque de surdosage lié aux substances actives. En cas de prise d'une dose double, les effets ne seront pas plus prononcés. Si vous avez pris trop de DROSETUX, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

Si vous oubliez de prendre DROSETUX

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre DROSETUX

Aucun effet n'est attendu lors de l'arrêt du traitement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration :

Belgique :

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

www.afmps.be

Division Vigilance

Site internet : **www.notifieruneffetindesirable.be**

E-mail : **adr@fagg-afmps.be**

Luxembourg :

Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments

Tél. : (+352) 2478 5592

E-mail : **pharmacovigilance@ms.etat.lu**

Lien pour le formulaire :
<https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver DROSETUX sirop ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte après EXP. Les deux premiers chiffres indiquent le mois, les quatre suivants l'année. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Conservez 1 an après ouverture du flacon.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient DROSETUX

- Les substances actives sont :

Arnica montana	4 CH	0,1 g
Belladonna	4 CH	0,1 g
Cina	4 CH	0,1 g
Coccus cacti	5 CH	0,1 g
Corallium rubrum	4 CH	0,1 g
Cuprum metallicum	5 CH	0,1 g
Drosera	4 CH	0,1 g
Ferrum phosphoricum	5 CH	0,1 g
Ipeca	4 CH	0,1 g
Solidago virga aurea	3 DH	0,1 g

Pour 100 g de sirop.

- Les autres composants sont : Benzoate de sodium, Acide citrique monohydraté, Eau purifiée, Solution de saccharose.

Aspect de DROSETUX et contenu de l'emballage extérieur ?

DROSETUX se présente sous forme de sirop conditionné dans une boîte contenant un flacon de 150 ml avec un godet-doseur.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais

BOIRON
Drosetux, syrup

69510 Messimy
France

Numéro de l'autorisation de mise sur le marché

Belgique :
HO-BE663159

Luxembourg :
XXXXXXXXXX

Mode de délivrance

Délivrance libre

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 08/2024.