

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Hydrocortison Hualan 2,5 mg tabletten
Hydrocortison Hualan 5 mg tabletten
Hydrocortison Hualan 10 mg tabletten
Hydrocortison Hualan 15 mg tabletten
Hydrocortison Hualan 20 mg tabletten
hydrocortison

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit medicijn niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat zijn Hydrocortison Hualan en waarvoor wordt dit medicijn ingenomen?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit medicijn in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat zijn Hydrocortison Hualan en waarvoor wordt dit medicijn ingenomen?

In Hydrocortison Hualan zit een medicijn dat hydrocortison heet. Het hoort bij een groep medicijnen met de naam steroïden. De hele naam is corticosteroïden. Het zijn medicijnen die ontstekingen en allergische reacties minder erg maken. Corticosteroïden komen van nature in het lichaam voor. Deze medicijnen helpen uw lichaam om gezond te blijven en u goed te blijven voelen.

Dit medicijn wordt gebruikt wanneer het lichaam niet genoeg cortisol aanmaakt, omdat een deel van de bijnier niet werkt (bijnierinsufficiëntie).

Hydrocortison Hualan is voor gebruik bij volwassenen, kinderen en jongeren (vanaf de geboorte tot <18 jaar).

U moet dit medicijn regelmatig innemen dan werkt het op zijn best.

Uw bijnier werkt niet goed (bijnierinsufficiëntie)

De bijnierschors is een onderdeel van de bijnieren en zit in de buurt van de nieren. De bijnierschors maakt hormonen die corticosteroïden heten. Uw bijnierschors maakt er niet genoeg van om ervoor te zorgen dat uw lichaam goed blijft werken. Het medicijn in uw tabletten (hydrocortison) vervangt de natuurlijke hormonen die er bij u niet zijn en helpt u gezond te blijven.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

Als u twijfelt, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn inneemt als:

- u een bijniercrisis heeft. Als u moet overgeven of als u zich echt slecht voelt, is het mogelijk dat u een injectie met hydrocortison nodig heeft.
- u een kortdurende of tijdelijke ziekte heeft zoals infecties, koorts, of zich in situaties bevindt die heel veel lichamelijke stress veroorzaken, zoals een operatie: de dosis hydrocortison moet tijdelijk worden verhoogd. Vraag uw arts onmiddellijk om informatie over hoe u met deze situaties moet omgaan.
- u moet worden ingeënt. Gewoonlijk verhindert de inname van Hydrocortison tabletten niet om te worden ingeënt.
- u binnenkort een operatie moet ondergaan, vertel de chirurg of anesthesist dan vóór uw operatie dat u Hydrocortison tabletten krijgt.
- u wazig ziet of andere stoornissen van uw gezichtsvermogen heeft.
- u last heeft van nierproblemen of leverproblemen, een hoge bloeddruk, suikerziekte (diabetes), hartproblemen, osteoporose (dunner worden van het bot) of met een te traag werkende schildklier.
- u glaucoom (een soort staar) heeft. Bij glaucoom raakt de oogzenuw beschadigd. De oogboldruk is meestal te hoog. Er ontstaan na jaren blijvende vlekken aan de buitenkant van uw gezichtsveld; regelmatige controle door een oogarts (oogonderzoek) wordt aangeraden;
- u feochromocytoom (een zeldzame tumor van de bijnieren) heeft.
- u een te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie) heeft.

Als u een infectie heeft voordat u dit medicijn begint in te nemen, moet u contact opnemen met uw arts. Er moet worden onderzocht welk micro-organisme (bijvoorbeeld een bacterie of virus) verantwoordelijk is voor de infectie. En dan moet eerst de infectie worden behandeld voordat u dit medicijn krijgt. Als u nieuwe infecties krijgt terwijl u deze tabletten inneemt, neem dan contact op met uw arts. Hij/zij zal beslissen hoe u uw behandeling moet voortzetten.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u last heeft van zwakke spieren (spierzwakte), spierpijn, -krampen en -stijfheid tijdens het gebruik van hydrocortison. Dit kunnen symptomen van een aandoening die thyrotoxische periodieke verlamming wordt genoemd. Deze kan optreden bij patiënten met een te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie) die worden behandeld met hydrocortison. U heeft mogelijk een aanvullende behandeling nodig om deze aandoening te verlichten.

Psychische problemen bij het innemen van dit medicijn

Tijdens het innemen van dit medicijn kunt u erge psychische gezondheidsproblemen krijgen, die vaak beginnen binnen een paar dagen of weken na het starten met het medicijn.

- Dit is meer waarschijnlijk bij hogere doses (dus als u veel van dit medicijn inneemt)
- Deze verdwijnen gewoonlijk als u minder van het medicijn krijgt of u met de behandeling moet stoppen.

Als er toch psychische gezondheidsproblemen optreden, moeten ze mogelijk worden behandeld. Neem contact op met een arts als u (of iemand die dit medicijn inneemt) psychische klachten krijgt. Dit is vooral belangrijk als u zich depressief voelt of u misschien zelfmoordgedachten heeft en wanneer u minder van het medicijn krijgt of ermee stopt.

Operaties

Als u een ongeluk krijgt, ziek wordt, een operatie nodig heeft (waaronder bij de tandarts), tijdens of na een behandeling met hydrocortison, **MOET** u de arts of tandarts die u behandelt vertellen dat u dit medicijn inneemt of heeft ingenomen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Dit medicijn kan worden gebruikt bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. Maar het is belangrijk dat de arts tijdens de behandeling de groei en ontwikkeling regelmatig controleert. Als dit medicijn wordt gegeven aan een te vroeg geboren baby, kan het nodig zijn om de werking en de opbouw van het hart regelmatig te controleren.

Ouderen

Het geven van dit medicijn aan oudere patiënten, vooral voor langere tijd, moet worden gepland. Omdat de gevolgen van de vaak voorkomende bijwerkingen van dit medicijn voor ouderen erger zijn. Vooral osteoporose (dunner worden van het bot), suikerziekte (diabetes), hogere bloeddruk (hypertensie), gevoelig zijn voor infecties en dunner worden van de huid.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Hydrocortison Hualan tabletten nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor medicijnen die u zonder recept kunt krijgen en voor kruidenmedicijnen. Dit is omdat het invloed kan hebben op de manier waarop sommige medicijnen werken. Sommige andere medicijnen kunnen ook invloed hebben op de manier waarop dit medicijn werkt.

Als u een van de volgende medicijnen inneemt, moet u contact opnemen met uw arts voordat u Hydrocortison Hualan gaat innemen, omdat het nodig kan zijn de hoeveelheid van Hydrocortison Hualan tabletten aan te passen:

- Medicijnen die worden gebruikt om epilepsie te behandelen: fenytoïne, carbamazepine en oxcarbazepine.
- Medicijnen die barbituraten worden genoemd, die kunnen worden gebruikt om verkrampen van uw spieren en schokken door uw hele lichaam (convulsies) te behandelen (waaronder fenobarbital en primidon).
- Sint-janskruid (kruidenmedicijn dat wordt gebruikt om angst te behandelen).
- Medicijnen die worden gebruikt om humaan immunodeficiëntievirus (hiv)-infectie en aids te behandelen: efavirenz en nevirapine, ritonavir.
- Medicijnen die worden gebruikt om infecties te behandelen (antibiotica): rifampicine en rifabutine.
- Medicijnen die worden gebruikt om schimmelziekten te behandelen: itraconazol, posaconazol en voriconazol.
- Medicijnen die worden gebruikt om schimmelinfecties te behandelen: ketoconazol, posaconazol, itraconazol en voriconazol.
- Medicijnen die worden gebruikt om infecties te behandelen: erytromycine, telitromycine, claritromycine.

U moet het uw arts ook vertellen als u het volgende inneemt:

- Medicijnen die worden gebruikt om het bloed te verdunnen, zoals warfarine.
- Plastabletten (diuretica).
- Medicijnen die worden gebruikt voor pijn en ontsteking die NSAID's worden genoemd, zoals ibuprofen, diclofenac of naproxen.
- Acetylsalicylzuur (aspirine).
- Medicijnen die worden gebruikt om suikerziekte (diabetes) te behandelen.

Als u medicijnen inneemt die uw kaliumgehalte kunnen verlagen (zoals diuretica), is uw risico op hypokaliëmie (laag kaliumgehalte) hoger dan wanneer u alleen Hydrocortison Hualan inneemt. Uw arts zal uw kaliumgehalte controleren en de doses van deze medicijnen dienovereenkomstig

aanpassen, of kan kaliumsupplementen of kaliumsparende diuretica (zoals spironolacton) voorschrijven.

Als Hydrocortison Hualan samen met mifepriston wordt gebruikt, een behandeling om een zwangerschap te beëindigen, kan het effect van Hydrocortison Hualan verminderd zijn.

Twijfelt u of iets van hierboven voor u geldt? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn inneemt.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Hydrocortison kan worden ingenomen met of zonder voedsel. Sommige voedingsmiddelen en dranken kunnen invloed hebben op hoe Hydrocortison Hualan werkt, en hierdoor moet uw arts mogelijk uw dosis aanpassen:

- Grapefruitsap
- Zoethout

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Zwangerschap

Het is belangrijk dat u de behandeling met Hydrocortison Hualan tijdens de zwangerschap blijft voortzetten. Het is onwaarschijnlijk dat behandeling bij zwangere vrouwen met bijnierinsufficiëntie schadelijke effecten op de moeder en/of de baby heeft. Vertel het uw arts als u zwanger wordt, aangezien de dosis Hydrocortison Hualan mogelijk moet worden aangepast.

Neem contact op met uw arts als u zwanger bent en een van de volgende symptomen heeft, omdat uw arts uw behandeling met hydrocortison moet controleren:

- vasthouden van vocht of
- hoge bloeddruk en eiwit in de urine (pre-eclampsie).

Borstvoeding

Kleine beetjes van dit medicijn kunnen in de moedermelk komen. Vraag uw arts om advies voordat u dit medicijn inneemt als u borstvoeding geeft of van plan bent om borstvoeding te gaan geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit medicijn heeft geringe invloed op hoe u rijdt, hoe u taken uitvoert waarvoor bepaalde vaardigheden nodig zijn (bijv. fietsen) of hoe u machines gebruikt. Heeft u last van zwakke spieren, problemen met het zien en stemmingswisselingen? U voelt zich dan bijvoorbeeld veel te vrolijk (euforie, dit hoort vaak bij een ziekte) of depressief. Rijd dan geen auto en gebruik geen machines.

Hydrocortison Hualan bevat lactose en natrium

Lactose: indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt.

Natrium: dit medicijn bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, dat wil zeggen dat het in wezen 'natriumvrij' is.

3. Hoe neemt u dit medicijn in?

Neem dit medicijn altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Innemen van dit medicijn

U moet dit medicijn via de mond innemen met een glas water, bij voorkeur in een rechtopzittende of staande houding en op een lege maag. Hoeveel u elke dag inneemt, hangt af van uw ziekte. Het aantal tabletten dat u moet innemen, staat op het etiket van uw medicijn. De dagelijkse dosis moet worden verdeeld over twee of drie doses. De eerste dosis in de ochtend moet hoger zijn dan de laatste dosis, om het normale dagelijkse ritme van cortisolafscheiding na te bootsen.

Twijfelt u over het aantal tabletten dat u moet innemen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De geadviseerde dosering (hoeveel u moet innemen) is:

Volwassenen

- 15 tot 30 mg per dag, verdeeld over 2-3 momenten van inname.
- Het is mogelijk dat uw arts meer wil voorschrijven. Hoeveel u precies moet innemen, hangt af van uw ziekte.

Gebruik bij kinderen

- 8-10 mg/m²/dag, verdeeld over 2 of 3 momenten van inname.
- Kinderen krijgen de laagst mogelijke dosis voorgeschreven.
- De arts zal hun groei en ontwikkeling in de gaten houden.

Hydrocortison Hualan 5 mg tabletten hebben een breukstreep aan één kant. U kunt de tablet in gelijke doses verdelen.

Hydrocortison Hualan 10 mg tabletten hebben een kruisvormige breukstreep in het midden aan één kant. U kunt de tablet in gelijke doses verdelen.

Hydrocortison Hualan 15 mg tabletten hebben een breukstreep aan één kant. U kunt de tablet in gelijke doses verdelen.

Hydrocortison Hualan 20 mg tabletten hebben een breukstreep aan één kant. U kunt de tablet in gelijke doses verdelen.

Stopt de behandeling?

Als een behandeling na lange tijd wordt gestopt, moet u stap voor stap steeds iets minder van het medicijn innemen over meerdere weken of maanden. Dit hangt af van hoeveel u inneemt en hoe lang de behandeling duurt (zie hieronder: 'Als u stopt met het innemen van dit medicijn').

Het is gevaarlijk om in een keer veel minder van dit medicijn in te nemen (bijvoorbeeld na ziekte). Omdat dit ervoor kan zorgen dat u niet genoeg hormonen overhoudt die het lichaam niet kan missen. Het kan ook zorgen voor klachten (onttrekkingsverschijnselen) waaronder pijnlijke spieren of gewrichten, koorts en zich algemeen ziek voelen. Uw arts zal u als nodig advies geven over het stap voor stap verlagen van de hoeveelheid van dit medicijn.

Heeft u te veel van dit medicijn ingenomen?

Als u per ongeluk te veel tabletten heeft ingenomen, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw arts. Een te hoge dosis van dit medicijn gedurende meer dan een paar dagen kan schadelijk zijn voor uw gezondheid. Uw bloeddruk kan stijgen, uw gewicht kan toenemen en uw bloedsuiker kan te hoog

worden. Een verhoogde dosis is soms nodig om het lichaam in staat te stellen om om te gaan met meer stress, zoals bij koorts. Als er vaak en regelmatig extra doses nodig zijn, moet u contact opnemen met uw arts voor een herevaluatie van uw onderhoudsdosis.

Wanneer u teveel van Hydrocortison Hualan heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten dit medicijn in te nemen?

Als u een dosis bent vergeten in te nemen, neem de vergeten dosis dan in zodra u eraan denkt en neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip, zelfs als dit betekent dat u twee doses tegelijk inneemt.

Als u stopt met het innemen van dit medicijn

Stop NIET met het innemen van dit medicijn zonder dit eerst met uw arts te bespreken - het kan zijn dat u stap voor stap steeds iets minder van dit medicijn moet innemen.

Uw arts of apotheker zal u advies geven over hoe u het aantal tabletten dat u inneemt moet verlagen als u dit moet doen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken. Mensen die steroïden (zoals dit medicijn) innemen om dezelfde hormonen te vervangen die er van nature zijn, zouden minder kans moeten hebben op het krijgen van bijwerkingen dan mensen die steroïden innemen voor andere ziektes. Uw arts zal u af en toe willen zien om u te controleren op deze bijwerkingen.

Vertel het uw arts **direct** als u een van deze bijwerkingen opmerkt; het kunnen klachten van een allergische reactie zijn:

- jeuk of huiduitslag
- opzwellen van het gezicht, de lippen of de keel
- moeite met ademen of piepend ademen.

Andere bijwerkingen:

Frequentie niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

Hart

- verdikking van de hartspier (hypertrofe cardiomyopathie) bij te vroeg geboren baby's.

Psychische gezondheidsproblemen

- zich 'high' voelen, zich dus veel te blij voelen, weinig slaap nodig hebben en te veel energie hebben, dit hoort bij een ziekte (manie), of dat u last heeft van stemmingswisselingen
- problemen met slapen hebben
- dingen voelen, zien of horen die er niet zijn. Vreemde en enge gedachten hebben, zich anders gedragen of zich alleen voelen.

Ogen

- anders zien door:
 - staar (cataract)

- wazig zien
- hogere druk in het oog (glaucoom).

Maag-darmproblemen

- misselijkheid (nausea)
- maagpijn (dyspepsie) of maagontsteking (gastritis)
- verergering van bestaande zweren.

Infecties

- door het innemen van hydrocortison kan het zijn dat u makkelijker infecties krijgt die in zeer zeldzame gevallen dodelijk kunnen zijn
- tuberculose (tbc), schimmel- en virusinfecties kunnen terugkomen.

Botten, spieren en gewrichten

- osteoporose (dunnere of breekbare botten met een hoger risico op breuken, vooral bij oudere vrouwen)
- botbreuken (fracturen).

Hormonen

- niet tegen bepaalde suikers, zetmeel en vezels (koolhydraten) kunnen, hoge bloedsuikerspiegels (klachten zijn te veel dorst hebben en meer moeten plassen).

Voeding en stofwisseling

- vasthouden van zout (natrium) en vocht
- hoge bloeddruk (hypertensie)
- te weinig kalium in het lichaam (afname van het kaliumgehalte met hypokaliëmisches alkalose).

Huid- en onderhuidproblemen

- het krijgen van een vollemaansgezicht, wangen en maag worden groter, armen en benen worden dun met een rood gezicht en meer zin om te eten (klachten die ook horen bij het Syndroom van Cushing)
- langzaam genezen van snijwonden of andere wonden
- rood worden
- makkelijk blauwe plekken krijgen, rode of paarse vlekken, puistjes (acne)
- groei van lichaamshaar op het gezicht en de buik bij vrouwen.

Onderzoeken

- zwaarder worden.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiters staan. U kunt bijwerkingen ook melden via Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

www.fagg.be

Afdeling Vigilantie:

Website: www.eenbijwerkingmelden.be

e-mail: adr@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos en de blisterverpakking of de fles (*alleen 10 mg en 20 mg tabletten*) na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

Hydrocortison Hualan 2,5 mg tabletten:

De werkzame stof in dit medicijn is hydrocortison. In elke tablet zit 2,5 mg hydrocortison. De andere stoffen in dit medicijn zijn lactosemonohydraat (zie rubriek 2 'Hydrocortison Hualan bevat lactose'), magnesiumstearaat en maiszetmeel.

Hydrocortison Hualan 5 mg tabletten:

De werkzame stof in dit medicijn is hydrocortison. In elke tablet zit 5 mg hydrocortison. De andere stoffen in dit medicijn zijn lactosemonohydraat (zie rubriek 2 'Hydrocortison Hualan bevat lactose'), magnesiumstearaat en maiszetmeel.

Hydrocortison Hualan 10 mg tabletten:

De werkzame stof in dit medicijn is hydrocortison. In elke tablet zit 10 mg hydrocortison. De andere stoffen in dit medicijn zijn lactosemonohydraat (zie rubriek 2 'Hydrocortison Hualan bevat lactose'), magnesiumstearaat en maiszetmeel.

Hydrocortison Hualan 15 mg tabletten:

De werkzame stof in dit medicijn is hydrocortison. In elke tablet zit 15 mg hydrocortison. De andere stoffen in dit medicijn zijn lactosemonohydraat (zie rubriek 2 'Hydrocortison Hualan bevat lactose'), magnesiumstearaat en maiszetmeel.

Hydrocortison Hualan 20 mg tabletten:

De werkzame stof in dit medicijn is hydrocortison. In elke tablet zit 20 mg hydrocortison. De andere stoffen in dit medicijn zijn lactosemonohydraat (zie rubriek 2 'Hydrocortison Hualan bevat lactose'), magnesiumstearaat en maiszetmeel.

Hoe ziet Hydrocortison Hualan eruit en wat zit er in een verpakking?

Hydrocortison Hualan 2,5 mg tabletten:

witte, ronde, platte tabletten met schuine randen van ongeveer 5,1-5,5 mm in doorsnee, met '2,5' op één kant.

Hydrocortison Hualan 5 mg tabletten:

witte, ovale tabletten van ongeveer 9,8-10,2 mm lang en 4,2-4,6 mm breed, met op één kant 'H5' en een breukstreep in het midden van de andere kant. De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses.

Hydrocortison Hualan 10 mg tabletten:

witte, ovale tabletten van ongeveer 10,6-11,0 mm lang en 6,8-7,2 mm breed, met op één kant 'HC10' en een kruisvormige breukstreep in het midden van de andere kant. De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses.

Hydrocortison Hualan 15 mg tabletten:

witte, ovale tabletten van ongeveer 11,3-11,7 mm lang en 4,8-5,2 mm breed, met op één kant 'HC15' en een breukstreep in het midden van de andere kant. De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses.

Hydrocortison Hualan 20 mg tabletten:

witte, ovale tabletten van ongeveer 10,6-11,0 mm lang en 6,8-7,2 mm breed, met op één kant 'HC20' en een breukstreep in het midden van de andere kant. De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses..

Hydrocortison Hualan 2,5 mg, 5 mg en 15 mg tabletten zijn verkrijgbaar in PVC/aluminium blisterverpakkingen met 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100 en 112 tabletten per doos.

Hydrocortison Hualan 10 mg en 20 mg tabletten zijn verkrijgbaar in PVC/aluminium blisterverpakkingen met 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100 en 112 tabletten per doos en HDPE flessen met 30, 50, 56, 60, 84, 90 en 100 tabletten per fles.

Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Hualan Pharmaceuticals Limited
16/17 College Green
Dublin 2
Co. Dublin
D02 V078
Ierland

Fabrikant:

Elara Pharmservices Europe Limited
239 Blanchardstown Corporate Park
Ballycoolin,
Dublin
D15 KV21
Ierland

Elara Pharmservices Europe Limited
Regus Block 1
Blanchardstown Corporate Park 1
Ballycoolin Road
D15 AKK1 Dublin 15
Ierland

Nummer(s) van de vergunning voor het in de handel brengen

Hydrocortison Hualan 2,5 mg tabletten : BE663486
Hydrocortison Hualan 5 mg tabletten : BE663487
Hydrocortison Hualan 10 mg tabletten : BE663488 (blisterverpakking); BE663489 (fles)
Hydrocortison Hualan 15 mg tabletten : BE663490

Hydrocortison Hualan 20 mg tabletten : BE663491 (blisterverpakking); BE663492 (fles)

Dit medicijn is geregistreerd in lidstaten van de Europese Economische Ruimte onder de volgende namen:

- Ierland: Hydrocortisone Hualan 2.5 mg tablets
 Hydrocortisone Hualan 5 mg tablets
 Hydrocortisone Hualan 10 mg tablets
 Hydrocortisone Hualan 15 mg tablets
 Hydrocortisone Hualan 20 mg tablets
- Nederland: Hydrocortison Hualan 2,5 mg, tabletten
 Hydrocortison Hualan 5 mg, tabletten
 Hydrocortison Hualan 10 mg, tabletten
 Hydrocortison Hualan 15 mg, tabletten
 Hydrocortison Hualan 20 mg, tabletten
- Oostenrijk/Duitsland: Hydrocortison Hualan 2,5 mg Tabletten
 Hydrocortison Hualan 5 mg Tabletten
 Hydrocortison Hualan 10 mg Tabletten
 Hydrocortison Hualan 15 mg Tabletten
 Hydrocortison Hualan 20 mg Tabletten
- Denemarken: Cortiren 2,5 mg tabletter
 Cortiren 5 mg tabletter
 Cortiren 10 mg tabletter
 Cortiren 15 mg tabletter
 Cortiren 20 mg tabletter
- Zweden : Cortiren 2,5 mg tablett
 Cortiren 5 mg tablett
 Cortiren 10 mg tablett
 Cortiren 15 mg tablett
 Cortiren 20 mg tablett
- Finland: Petacort 2,5 mg tableti
 Petacort 5 mg tableti
 Petacort 10 mg tableti
 Petacort 15 mg tableti
 Petacort 20 mg tableti
- Spanje: Hydrocortisona Hualan 2,5 mg comprimidos
 Hydrocortisona Hualan 5 mg comprimidos
 Hydrocortisona Hualan 10 mg comprimidos
 Hydrocortisona Hualan 15 mg comprimidos
- België: Hydrocortison Hualan 2,5 mg tabletten
 Hydrocortison Hualan 5 mg tabletten
 Hydrocortison Hualan 10 mg tabletten
 Hydrocortison Hualan 15 mg tabletten
 Hydrocortison Hualan 20 mg tabletten

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 11/2025.