

*“Das Arzneimittel, das sich in dieser Packung befindet, hat eine Parallelimportzulassung bekommen.*

*Parallelimport ist die Einfuhr nach Belgien eines Arzneimittels, für das in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums, eine Genehmigung für das Inverkehrbringen erteilt wurde und für das in Belgien ein Referenzarzneimittel besteht. Eine Parallelimportzulassung wird erteilt, wenn bestimmte gesetzliche Anforderungen erfüllt sind (Königlicher Erlass vom 19. April 2001 über den Parallelimport von Humanarzneimitteln und über den Parallelvertrieb von Humanarzneimitteln und Tierarzneimitteln).”*

**Bezeichnung des importierten Arzneimittels auf dem belgischen Markt:**

Tadalafil Teva 20 mg Filmtabletten

**Bezeichnung des belgischen Referenzarzneimittels:**

Tadalafil Teva 20 mg Filmtabletten

**Importiert aus Deutschland.**

**Importiert von und umgepackt unter der Verantwortung von:**

PI Pharma NV, Bergensesteenweg 709, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Belgien

**Originalbezeichnung des Arzneimittels im Herkunftsland:**

Tadalafil AbZ 20 mg Filmtabletten

---

**Gebrauchsinformation: Information für Anwender**

**Tadalafil Teva 20 mg Filmtabletten**

Tadalafil

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

**Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Tadalafil Teva und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Tadalafil Teva beachten?
3. Wie ist Tadalafil Teva einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Tadalafil Teva aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

**1. Was ist Tadalafil Teva und wofür wird es angewendet?**

Tadalafil Teva ist eine Behandlung für erwachsene Männer mit erektiler Dysfunktion. Dies ist dann der Fall, wenn ein Mann für eine sexuelle Aktivität keinen harten, erigierten Penis bekommen oder aufrechterhalten kann. Tadalafil Teva hat gezeigt, dass es die Fähigkeit zur Erreichung eines harten, erigierten Penis für eine sexuelle Aktivität signifikant verbessert.

Tadalafil Teva enthält den Wirkstoff Tadalafil, der zur Arzneimittelgruppe der sogenannten Phosphodiesterase- 5-Hemmer gehört. Nach einer sexuellen Stimulierung kann Tadalafil Teva dabei helfen, die Blutgefäße im Penis zu entspannen, wodurch ein Blutstrom ermöglicht wird. Das Ergebnis ist eine verbesserte erektile Funktion. Tadalafil Teva führt nicht zu diesem Ergebnis, wenn keine erektile Dysfunktion bei Ihnen vorliegt. **Es ist wichtig zu beachten, dass Tadalafil Teva**

**ohne eine sexuelle Stimulation nicht wirkt.** Ein partnerschaftliches Vorspiel kann notwendig sein, so wie wenn kein Arzneimittel gegen erektile Dysfunktion eingenommen wurde.

## 2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Tadalafil Teva beachten?

### **Tadalafil Teva darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Tadalafil oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- wenn Sie jegliche Form von organischen Nitraten oder anderen Stickstoffmonoxid-Donoren wie Amylnitrit einnehmen. Diese Arzneimittelgruppe ("Nitrate") wird zur Behandlung von Angina pectoris ("Herzschmerzen") eingesetzt. Tadalafil Teva hat gezeigt, dass es die Wirkung dieser Arzneimittel verstärkt. Wenn Sie jegliche Form von Nitraten einnehmen oder sich nicht darüber sicher sind, sprechen Sie mit Ihrem Arzt (siehe Abschnitt "Einnahme von Tadalafil Teva zusammen mit anderen Arzneimitteln").
- wenn Sie an einer schweren Herzkrankheit leiden oder in den letzten 90 Tagen einen Herzanfall hatten.
- wenn Sie einen Schlaganfall in den letzten 6 Monaten hatten.
- wenn Sie an niedrigem Blutdruck oder unkontrolliertem Bluthochdruck leiden.
- wenn Sie an Sehverlust auf Grund einer nicht-arteritischen anterioren ischämischen Optikusneuropathie (NAION) jemals gelitten haben, eine Krankheit, die als "Augeninfarkt" bezeichnet wird.
- wenn Sie Riociguat einnehmen. Dieses Arzneimittel wird verwendet zur Behandlung von pulmonaler arterieller Hypertonie (d. h. hoher Blutdruck in der Lunge) und chronischer thromboembolischer pulmonaler Hypertonie (d. h. hoher Blutdruck in der Lunge zusätzlich zu Blutgerinnseln). PDE5-Hemmer wie Tadalafil Teva haben gezeigt, dass sie den blutdrucksenkenden Effekt dieses Arzneimittels verstärken. Wenn Sie Riociguat einnehmen oder unsicher sind, sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie Tadalafil Teva einnehmen.

Sexuelle Aktivität beinhaltet ein mögliches Risiko für Patienten mit einer Herzerkrankung, weil diese eine Belastung für Ihr Herz bedeutet. Wenn Sie an einer Herzerkrankung leiden, sollten Sie dies Ihrem Arzt mitteilen.

Falls einer dieser Gründe auf Sie zutrifft, sprechen Sie vor der Einnahme von Tadalafil Teva mit Ihrem Arzt:

- Sichelzellenanämie (eine Anomalie der roten Blutzellen).
- multiples Myelom (Knochenmarkkrebs).
- Leukämie (Krebs der Blutzellen).
- Deformation (Verformung) Ihres Penis.
- schwere Lebererkrankung.
- schwere Nierenerkrankung.

Es ist nicht bekannt, ob Tadalafil Teva bei Patienten, bei denen

- eine Operation im Bereich des Beckens
- oder eine radikale Prostatektomie in nicht nervenerhaltender Technik (radikale nicht nervenerhaltende Prostatektomie) vorgenommen wurde, wirksam ist.
- Wenn Sie eine plötzliche Abnahme oder einen Verlust der Sehkraft bemerken oder die Sicht verzerrt oder trüb ist, während Sie Tadalafil Teva einnehmen, BRECHEN Sie die Behandlung mit Tadalafil Teva AB und benachrichtigen Sie sofort einen Arzt.

Bei einigen Patienten wurde unter Tadalafil-Einnahme eine plötzliche Verschlechterung oder ein Verlust des Hörvermögens bemerkt. Auch wenn nicht bekannt ist, ob diese Ereignisse ursächlich mit Tadalafil zusammenhängen, brechen Sie bei plötzlicher Verschlechterung oder Verlust des Hörvermögens die Behandlung mit Tadalafil Teva ab und kontaktieren Sie sofort einen Arzt.

Tadalafil Teva darf nicht von Frauen angewendet werden.

## **Kinder und Jugendliche**

Tadalafil Teva darf nicht von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren angewendet werden.

## **Einnahme von Tadalafil Teva zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

Nehmen Sie Tadalafil Teva NICHT ein, wenn Sie bereits jegliche Form von Nitraten einnehmen (siehe "Tadalafil Teva darf nicht eingenommen werden").

Die Wirkung von einigen Arzneimitteln kann durch Tadalafil Teva beeinträchtigt werden oder diese Arzneimittel können wiederum die Wirkung von Tadalafil Teva beeinträchtigen. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie bereits folgende Arzneimittel einnehmen:

- einen sogenannten Alphablocker (wird zur Behandlung von Bluthochdruck oder den Symptomen des Harntrakts angewendet, die mit einer benignen Prostatahyperplasie verbunden sind).
- andere Arzneimittel zur Behandlung von Bluthochdruck.
- Riociguat.
- einen 5-alpha-Reduktase-Hemmer (wird zur Behandlung von benigner Prostatahyperplasie angewendet).
- Arzneimittel wie Ketoconazol-Tabletten (zur Behandlung von Pilzinfektionen) und Protease-Hemmer zur Behandlung von AIDS oder HIV-Infektion.
- Phenobarbital, Phenytoin und Carbamazepin (Antikonvulsiva).
- Rifampicin, Erythromycin, Clarithromycin oder Itraconazol.
- andere Behandlungen wegen erektiler Dysfunktion.

## **Einnahme von Tadalafil Teva mit Getränken und Alkohol**

Informationen über die Wirkung von Alkohol finden Sie in Abschnitt 3. Grapefruitsaft könnte beeinflussen, wie gut Tadalafil Teva wirkt und soll daher mit Vorsicht konsumiert werden. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt für weitere Informationen.

## **Fortpflanzungsfähigkeit**

Als Hunde behandelt wurden, wurde eine Reduzierung der Spermienentwicklung in den Hoden festgestellt. Eine Reduzierung der Spermien wurde bei einigen Männern beobachtet. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Wirkungen zu einem Fertilitätsmangel führen.

## **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Da in klinischen Studien bei Männern, die Tadalafil Teva einnahmen, Schwindel auftrat, sollten Sie wissen, wie Sie auf Tadalafil Teva reagieren, bevor Sie Auto fahren oder Maschinen bedienen.

## **Tadalafil Teva enthält Laktose und Natrium**

Bitte nehmen Sie Tadalafil Teva erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie an einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Filmtablette, d.h. es ist nahezu „natriumfrei“.

## **3. Wie ist Tadalafil Teva einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Tadalafil Teva Tabletten sind nur zum Einnehmen durch Männer.

### Einmal-tägliche-Dosierung

Die empfohlene Dosis ist **5 mg** (entspricht ein **Viertel einer Tablette**) täglich und sollte jeweils zur etwa gleichen Tageszeit eingenommen werden. Je nachdem wie Sie Tadalafil Teva vertragen, kann Ihr Arzt die Dosierung auf 2,5 mg anpassen. In diesem Fall kann die 2,5 mg Tablette verschrieben werden. Nehmen Sie Tadalafil Teva nicht öfter als

einmal pro Tag ein.

Die tägliche Anwendung von Tadalafil Teva kann bei Männern vorteilhaft sein, die 2-mal oder öfter pro Woche sexuell aktiv sind. Bei täglicher Einnahme ermöglicht Ihnen Tadalafil Teva zu jedem Zeitpunkt innerhalb der 24-Stunden eines Tages eine Erektion nach sexueller Stimulation.

#### Dosierung nach Bedarf

Die empfohlene Anfangsdosis beträgt **10 mg** (entspricht **einer halben Tablette**) vor sexueller Aktivität. Wenn die Wirkung dieser Dosierung zu schwach ist, kann Ihr Arzt die Dosis auf **20 mg** erhöhen (entspricht **einer Tablette**). Sie dürfen die Dosis mindestens 30 Minuten vor sexueller Aktivität einnehmen.

Tadalafil Teva kann noch bis zu 36 Stunden nach der Einnahme der Dosis wirken.

Nehmen Sie Dosierungen von 10 mg und 20 mg nicht öfter als einmal pro Tag ein. Sie sind vorgesehen zur Einnahme vor einer erwarteten sexuellen Aktivität und die tägliche Einnahme über einen längeren Zeitraum wird nicht empfohlen.

Es ist wichtig zu beachten, dass Tadalafil Teva ohne eine sexuelle Stimulation nicht wirkt. Ein partnerschaftliches Vorspiel kann notwendig sein, so wie wenn kein Arzneimittel gegen erektile Dysfunktion eingenommen wurde.

Alkoholkonsum kann Ihre Fähigkeit, eine Erektion zu bekommen, beeinflussen. Alkoholkonsum kann auch vorübergehend Ihren Blutdruck senken. Wenn Sie Tadalafil Teva eingenommen haben oder wenn Sie planen, Tadalafil Teva einzunehmen, vermeiden Sie übermäßiges Trinken (Blutalkoholspiegel von 0,08 % und mehr), weil hierdurch das Risiko auf Schwindel beim Aufstehen erhöht werden kann.



#### **Art der Anwendung**

Je nach Dosierungsschema (*einmal täglich* oder *nach Bedarf*) können die Tabletten in Viertel (*einmal täglich*) oder in Hälften (*nach Bedarf*) geteilt werden.



Tadalafil Teva ist zum Einnehmen und kann mit oder ohne Nahrung eingenommen werden.

Schlucken Sie die Tablette oder einen Teil der Tablette mit etwas Wasser.

#### Teilung der Tablette in Viertel (mit 5 mg Tadalafil zur *einmal täglichen* Einnahme)

Legen Sie die Tablette mit den Bruchrillen nach oben auf eine harte, ebene Oberfläche (z. B. Tischplatte).	
Drücken Sie mit dem Daumen (oder Zeigefinger) kurz und kräftig auf die Oberseite der Tablette, bis sie in vier gleiche Teile bricht.	

#### Teilung der Tablette in Hälfte (mit 10 mg Tadalafil zur Einnahme *nach Bedarf*)

Legen Sie die Tablette mit den Bruchrillen nach oben auf eine harte, ebene Oberfläche (z. B. Tischplatte).	
Legen Sie die Daumen (oder Zeigefinger) beider Hände gleichzeitig auf die linke und rechte Seite der kürzeren Bruchrille der Tablette.	
Drücken Sie kurz mit beiden Daumen (oder Zeigefingern) auf die linke und rechte Seite an der Außenseite der Tablette, bis sie in zwei gleiche Teile bricht.	

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Tadalafil Teva eingenommen haben, als Sie sollten**

Wenn Sie eine größere Menge von Tadalafil Teva eingenommen haben, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antgiftzentrum (070/245.245). Die in Abschnitt 4 beschriebenen Nebenwirkungen können bei Ihnen auftreten.

#### **Wenn Sie die Einnahme von Tadalafil Teva vergessen haben**

Wenn Sie einmal täglich Tadalafil Teva einnehmen, nehmen Sie Ihre Dosis ein, sobald Sie sich daran erinnern, aber

nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Sie sollten Tadalafil Teva NICHT mehr als einmal täglich einnehmen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Diese Wirkungen sind normalerweise leicht bis mäßig ausgeprägt.

**Wenn bei Ihnen eine der folgenden Nebenwirkungen auftritt, BRECHEN Sie die Einnahme dieses Arzneimittels AB und suchen Sie sofort medizinische Hilfe:**

- allergische Reaktionen, einschließlich Ausschläge (Häufigkeit gelegentlich).
- Schmerzen in der Brust – wenden Sie keine Nitrate an, sondern suchen Sie sofort medizinische Hilfe (Häufigkeit gelegentlich).
- Priapismus, eine verlängerte und möglicherweise schmerzhafte Erektion kann nach Einnahme von
- Tadalafil Teva auftreten (Häufigkeit selten). Sollten Sie eine Erektion haben, die über mehr als 4 Stunden anhält, setzen Sie sich unverzüglich mit einem Arzt in Verbindung.
- plötzlicher Verlust der Sehfähigkeit (Häufigkeit selten), verzerrtes, trübes, unscharfes zentrales Sehvermögen oder plötzliche Abnahme des Sehvermögens (Häufigkeit nicht bekannt).

Über andere Nebenwirkungen wurde berichtet:

**Häufig** (beobachtet bei 1 bis 10 von 100 Patienten)

- Kopfschmerzen
- Rückenschmerzen
- Muskelschmerzen
- Schmerzen in Armen und Beinen
- Gesichtsrötung
- Verstopfte Nase
- Verdauungsstörung.

**Gelegentlich** (beobachtet bei 1 bis 10 von 1.000 Patienten)

- Schwindel
- Magenschmerzen
- Übelkeit
- Erbrechen
- Rückfluss von Magensäure (Reflux)
- Verschwommenes Sehen
- Augenschmerzen
- Atembeschwerden
- Blut im Urin
- verlängerte Erektion
- Herzklopfen, Herzrasen (schneller Herzschlag), hoher Blutdruck, niedriger Blutdruck
- Nasenbluten und Ohrengeräusche
- Schwellung von Händen, Füßen oder Gelenken und Müdigkeit.

**Selten** (beobachtet bei 1 bis 10 von 10.000 Patienten)

- Ohnmacht
- Krampfanfälle
- Vorübergehender Gedächtnisverlust
- Schwellungen der Augenlider, rote Augen, plötzliche Schwerhörigkeit oder Taubheit und Nesselsucht (juckende, rote Erhebungen der Haut)

- Penisblutung
- Blut im Sperma
- Vermehrtes Schwitzen.

Über Herzinfarkt und Schlaganfall wurden selten bei Männern berichtet, die Tadalafil Teva eingenommen haben. Die meisten dieser Männer hatten bereits vor der Einnahme dieses Arzneimittels bekannte Herzerkrankungen.

Über teilweise, vorübergehende oder bleibende Verschlechterung oder Verlust des Sehvermögens eines oder beider Augen wurde selten berichtet.

Über **einige weitere seltene Nebenwirkungen**, die nicht in klinischen Studien beobachtet wurden, wurde bei Männern, die Tadalafil Teva eingenommen hatten, berichtet. Dazu zählen:

- Migräne
- Gesichtsschwellungen
- Schwerwiegende allergische Reaktionen, die zu Schwellungen im Gesichts- oder Halsbereich führen
- Schwerwiegende Hautausschläge
- Einige Erkrankungen, die den Blutfluss zum Auge beeinträchtigen
- Unregelmäßiger Herzschlag
- Angina Pectoris
- Plötzlicher Herztod
- Verzerrtes, trübes, unscharfes zentrales Sehvermögen oder plötzliche Abnahme des Sehvermögens (Häufigkeit nicht bekannt).

Die Nebenwirkung Schwindel wurde bei Männern über 75 Jahre, die Tadalafil Teva einnahmen, häufiger berichtet. Durchfall wurde bei Männern über 65 Jahren, die Tadalafil Teva einnahmen, häufiger berichtet.

### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über die Federalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte – [www.afmps.be](http://www.afmps.be) - Abteilung Vigilanz - Website: [www.notifieruneffetindesirable.be](http://www.notifieruneffetindesirable.be)- E-Mail: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. Wie ist Tadalafil Teva aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Blisterpackung nach „EXP“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was Tadalafil Teva enthält**

- Der Wirkstoff ist: Tadalafil.  
Eine 20-mg-Tablette enthält 20 mg Tadalafil.
- Die sonstigen Bestandteile sind Laktose-Monohydrat, Natriumlaurylsulfat, Povidon, Crospovidon und Natriumstearyl fumarat.

- Der Tablettenüberzug besteht aus Poly(vinylalkohol), Macrogol, Titandioxid (E 171), Talkum und Eisenoxid gelb (E 172).

### **Wie Tadalafil Teva aussieht und Inhalt der Packung**

Tadalafil Teva 20 mg ockergelbe bis gelbe ovale Filmtablette mit Kreuzbruchkerbe auf einer Seite. Die andere Seite der Tablette hat die Prägung „20“. Länge: 15,0 mm, Breite: 9,0 mm.  
Die Tablette kann in zwei oder vier gleiche Dosen geteilt werden.

Tadalafil Teva ist in Packungen mit 2, 4, 8, 12, 18, 24, 28, 36, 48 oder 56 Filmtabletten in Blisterpackungen (1637 PI 702 F3) oder 2x1, 4x1, 8x1, 12x1, 24x1 oder 36x1 Filmtabletten in perforierten Blisterpackungen zur Abgabe von Einzeldosen erhältlich.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

*Pharmazeutischer Unternehmer des Referenzarzneimittels*

Teva Pharma Belgium AG, Laarstraat 16, B-2610 Wilrijk

*Zulassungsinhaber des importierten Arzneimittels*

AbZ-Pharma GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Deutschland

*Hersteller des importierten Arzneimittels*

Balkanpharma-Dupnitsa AD, Samokovsko Shosse Str. 3, 2600 Dupnitsa, Bulgarien

Teva Pharma, S.L.U., C/ Anabel Segura 11, Edificio Albatros B, 1ª planta, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanje

### **Zulassungsnummern**

PVC/ACLAR/PVC – ALU- oder PVC/ACLAR/PVdC/PVC – ALU- oder PVC/PVdC – ALU-Blisterpackung: 1637 PI 702 F3

OPA/Aluminium/PVC/Aluminium-Blisterpackung: BE475617

### **Art der Abgabe**

Verschreibungspflichtig.

**Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und im Vereinigten Königreich (Nordirland) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:**

AT, FI: Tadalafil ratiopharm

BE, CZ, DK, FR, IT, NL, NO, PL, PT, SE: Tadalafil Teva

DE, LU: Tadalafil-ratiopharm

ES: Tadalafilo Teva

HR: Tadalafil Pliva

HU: Tadalafil Actavis

UK (NI): Tadalafil

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 02/2024.**