

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Candesartan EG 2 mg tabletten
Candesartan EG 4 mg tabletten
Candesartan EG 8 mg tabletten
Candesartan EG 16 mg tabletten
Candesartan EG 32 mg tabletten

candesartan cilexetil

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Candesartan EG en waarvoor wordt dit geneesmiddel ingenomen?
2. Wanneer mag u Candesartan EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Candesartan EG in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Candesartan EG?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Candesartan EG en waarvoor wordt dit geneesmiddel ingenomen?

De naam van het geneesmiddel is Candesartan EG. De werkzame stof is candesartan cilexetil die behoort tot een groep geneesmiddelen die angiotensine II-receptorantagonisten worden genoemd. Candesartan cilexetil werkt door uw bloedvaten te ontspannen en te verwijden. Dit helpt uw bloeddruk te verlagen en maakt het voor uw hart gemakkelijker bloed te pompen naar alle delen van uw lichaam.

Candesartan EG wordt gebruikt voor

- de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie) bij volwassen patiënten en bij kinderen en jongeren van 6 tot < 18 jaar.
- de behandeling van hartfalen bij volwassen patiënten met een verminderde werking van de hartspeer wanneer angiotensineconversieremmers (ACE-remmers) niet kunnen worden gebruikt of als toevoeging aan ACE-remmers wanneer symptomen ondanks behandeling aanhouden en mineralocorticoïdreceptorantagonisten (MRA's) niet mogen worden gebruikt (ACE-remmers en MRA's zijn geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van hartfalen).

2. Wanneer mag u Candesartan EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Candesartan EG niet innemen?

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- U bent meer dan 3 maanden zwanger (het is ook beter Candesartan EG te vermijden in het begin van de zwangerschap, zie rubriek zwangerschap).
- U heeft een ernstige leverziekte of een galobstructie (een probleem met de afvoer van gal uit de galblaas).
- De patiënt is een kind jonger dan 1 jaar.

- U heeft diabetes of een nierfunctiestoornis en u wordt behandeld met een bloeddrukverlagend geneesmiddel dat aliskiren bevat.

Als u niet zeker bent of een van de bovenstaande gevallen op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Candesartan EG inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Candesartan EG?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Candesartan EG inneemt,

- als u problemen met uw hart, lever of nieren heeft, of als u dialyse ondergaat.
- als u onlangs een niertransplantatie heeft gehad.
- als u moet braken, onlangs veel heeft gebraakt, of diarree heeft.
- als u een bijnieraandoening heeft die syndroom van Conn (ook primair hyperaldosteronisme) wordt genoemd.
- als u een lage bloeddruk heeft.
- als u ooit een beroerte heeft gehad.
- U moet uw arts inlichten als u denkt dat u zwanger bent (of zou kunnen worden). Candesartan EG wordt niet aanbevolen in het begin van de zwangerschap en mag niet ingenomen worden indien u langer dan 3 maanden zwanger bent, aangezien het ernstige schade kan toebrengen aan uw baby bij gebruik in deze fase (zie rubriek zwangerschap).
- als u een van de volgende geneesmiddelen inneemt voor de behandeling van hoge bloeddruk:
 - een ACE-remmer (bijvoorbeeld enalapril, lisinopril, ramipril), in het bijzonder als u diabetesgerelateerde nierproblemen heeft.
 - aliskiren.
- als u een ACE-remmer inneemt samen met een geneesmiddel dat behoort tot de groep geneesmiddelen bekend als mineralocorticoïdreceptorantagonisten (MRA's). Deze geneesmiddelen zijn voor de behandeling van hartfalen (zie "Neemt u nog andere geneesmiddelen in?").

Praat met uw arts als u na inname van Candesartan EG last krijgt van buikpijn, misselijkheid, braken of diarree. Uw arts zal beslissen over verdere behandeling. Stop niet uit uzelf met het innemen van Candesartan EG.

Uw arts zal mogelijk regelmatig uw nierfunctie, bloeddruk en het aantal elektrolyten (bijv. kalium) in uw bloed controleren.

Zie ook de informatie in de rubriek "Wanneer mag u Candesartan EG niet innemen?".

Als u een van deze aandoeningen heeft, zal uw arts u mogelijk vaker willen zien en enkele onderzoeken uitvoeren.

Als u geopereerd gaat worden, vertel uw arts of tandarts dan dat u Candesartan EG inneemt, want Candesartan EG kan in combinatie met sommige verdovingsmiddelen een buitensporige bloeddrukdaling veroorzaken.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Candesartan werd onderzocht bij kinderen. Neem contact op met uw arts voor meer informatie. Candesartan EG mag niet gegeven worden aan kinderen jonger dan 1 jaar wegens het mogelijke risico met betrekking tot de ontwikkeling van de nieren.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Neemt u naast Candesartan EG nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Candesartan EG kan de werking van sommige andere geneesmiddelen beïnvloeden en sommige geneesmiddelen kunnen een invloed hebben op Candesartan EG. Als u bepaalde geneesmiddelen gebruikt, dient uw arts mogelijk regelmatig bloedonderzoeken uit te voeren.

Informeer uw arts in het bijzonder als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt, daar uw arts mogelijk uw dosis dient aan te passen en/of andere voorzorgsmaatregelen dient te nemen:

- Andere geneesmiddelen die bloeddruk helpen verlagen, inclusief bètablokkers, diazoxide en ACE-remmers zoals enalapril, captopril, lisinopril of ramipril.
- Niet-steroidale ontstekingsremmende geneesmiddelen (NSAID's) zoals ibuprofen, naproxen, diclofenac, celecoxib of etoricoxib (geneesmiddelen om pijn en ontsteking te verminderen).
- Acetylsalicylzuur (als u meer dan 3 gram per dag inneemt) (geneesmiddel om pijn en ontsteking te verminderen).
- Kaliumsupplementen of zoutvervangers die kalium bevatten (geneesmiddelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed verhogen).
- Heparine (een geneesmiddel om uw bloed te verdunnen).
- Co-trimoxazol (een antibioticum), ook bekend als trimethoprim/sulfamethoxazol.
- Plaspillen (diuretica).
- Lithium (een geneesmiddel voor geestelijke gezondheidsproblemen).
- Als u een ACE-remmer of aliskiren inneemt (zie ook de informatie in de rubrieken “Wanneer mag u Candesartan EG niet innemen?” en “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Candesartan EG?”).
- Als u wordt behandeld voor uw hartfalen met een ACE-remmer samen met bepaalde andere geneesmiddelen die bekend zijn als mineralocorticoidreceptorantagonisten (bijvoorbeeld spironolacton, eplerenon).

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

- U kunt Candesartan EG met of zonder voedsel innemen.
- Wanneer Candesartan EG aan u is voorgeschreven, praat dan met uw arts voordat u alcohol drinkt. Alcohol kan u een gevoel van flauwte of duizeligheid geven.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Verwittig uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of zwanger zou kunnen worden). Uw arts zal u gewoonlijk aanraden te stoppen met de inname van Candesartan EG voordat u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent, en zal u aanraden een ander geneesmiddel in te nemen in plaats van Candesartan EG. Candesartan EG wordt niet aanbevolen in het begin van de zwangerschap en mag niet ingenomen worden wanneer u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige schade aan uw baby kan veroorzaken indien het gebruikt wordt na de derde maand van de zwangerschap.

Borstvoeding

Verwittig uw arts als u borstvoeding geeft of op het punt staat borstvoeding te geven. Candesartan EG wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven en uw arts kan voor u een andere behandeling kiezen indien u borstvoeding wenst te geven, vooral als uw baby pas of te vroeg geboren is.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sommige mensen kunnen zich moe en duizelig voelen wanneer zij Candesartan EG innemen. Als dit bij u het geval is, bestuur dan geen voertuig of gebruik geen gereedschap of machines.

Candesartan EG bevat lactose

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. Hoe neemt u Candesartan EG in?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Het is belangrijk dat u Candesartan

EG iedere dag blijft innemen. U kunt Candesartan EG met of zonder voedsel innemen. Slik de tablet door met water. De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses.

Probeer de tablet elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen. Dit zal helpen u eraan te herinneren de tablet in te nemen.

De tabletten van 4 mg, 8 mg, 16 mg en 32 mg kunnen in gelijke doses worden verdeeld.

Hoge bloeddruk:

- De aanbevolen dosering Candesartan EG is 8 mg eenmaal dagelijks. Uw arts kan deze dosering verhogen tot 16 mg eenmaal per dag en verder tot 32 mg eenmaal per dag afhankelijk van het effect op uw bloeddruk.
- Bij sommige patiënten, zoals patiënten met lever- of nierproblemen of die onlangs vocht hebben verloren, bijv. door braken of diarree of door het gebruik van plaspillen, schrijft de arts mogelijk een lagere startdosering voor.
- Sommige patiënten van het zwarte ras kunnen een verlaagde reactie op dit soort geneesmiddel hebben wanneer het als enige behandeling wordt gegeven. Deze patiënten kunnen dan een hogere dosering nodig hebben.

Gebruik bij kinderen en jongeren:

Kinderen en jongeren van 6 tot < 18 jaar:

De aanbevolen startdosering is 4 mg eenmaal dagelijks.

Voor patiënten die minder dan 50 kg wegen: Bij sommige patiënten van wie de bloeddruk niet voldoende onder controle is, kan de arts beslissen dat de dosis verhoogd dient te worden tot maximum 8 mg eenmaal per dag.

Voor patiënten die 50 kg of meer wegen: Bij sommige patiënten van wie de bloeddruk niet voldoende onder controle is, kan de arts beslissen dat de dosis verhoogd dient te worden tot 8 mg eenmaal per dag en tot 16 mg eenmaal per dag.

Hartfalen bij volwassenen:

- De aanbevolen startdosering van Candesartan EG is 4 mg eenmaal dagelijks. Uw arts kan uw dosering verhogen tot 32 mg eenmaal dagelijks door de dosering met intervallen van minstens 2 weken te verdubbelen.

Candesartan EG kan samen met andere geneesmiddelen voor hartfalen worden ingenomen en uw arts zal beslissen welke behandeling geschikt is voor u.

Heeft u te veel van Candesartan EG ingenomen?

Wanneer u teveel van Candesartan EG heeft gebruikt of ingenomen dan door uw arts werd voorgeschreven, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245 245).

Bent u vergeten Candesartan EG in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen. Neem gewoon de volgende dosis op het normale tijdstip.

Als u stopt met het innemen van Candesartan EG

Als u stopt met het innemen van Candesartan EG, is het mogelijk dat uw bloeddruk opnieuw stijgt. Stop daarom niet met het innemen van Candesartan EG zonder eerst met uw arts te overleggen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken. Het is belangrijk dat je je bewust bent van wat deze bijwerkingen kunnen zijn.

Stop met het innemen van Candesartan EG en zoek onmiddellijk medische hulp als u een van de volgende allergische reacties heeft:

- moeilijkheden met ademen, met of zonder zwelling van het gezicht, de lippen, tong en/of keel
- zwelling van het gezicht, de lippen, tong en/of keel waardoor u moeilijk kunt slikken
- hevige jeuk van de huid (met zwelling van de huid)

Candesartan EG kan een vermindering van het aantal witte bloedcellen veroorzaken. Uw weerstand tegen infecties kan verminderd zijn en u merkt mogelijk dat u zich moe voelt of een infectie of koorts heeft. Als dit gebeurt, raadpleeg dan uw arts. Mogelijk zal uw arts af en toe bloedonderzoeken uitvoeren om te zien of Candesartan EG invloed heeft gehad op uw bloed (agranulocytose).

Andere bijwerkingen zijn:

Vaak (kan tot 1 op 10 mensen treffen)

- Gevoel van duizeligheid/draaierigheid.
- Hoofdpijn.
- Infectie van de luchtwegen.
- Lage bloeddruk waardoor u zich flauw of duizelig kan voelen.
- Veranderingen van de bloedwaarden:
 - Een verhoogde hoeveelheid kalium in uw bloed, vooral als u al nierproblemen of hartfalen heeft. Als dit ernstig is, kunt u merken dat u zich moe of zwak voelt, een onregelmatige hartslag of een tintelend gevoel ergens op je lichaam.
- Invloed op de werking van uw nieren, voornamelijk als u al nierproblemen of hartfalen heeft. In zeer zeldzame gevallen kan nierfalen optreden.

Zeer zelden (kan tot 1 op 10.000 mensen treffen)

- Zwelling van het gezicht, de lippen, tong en/of keel.
- Een daling van uw rode of witte bloedcellen. U kunt merken dat u zich moe voelt, een infectie of koorts heeft.
- Huiduitslag, netelroos.
- Jeuk.
- Rugpijn, pijn aan gewrichten en spieren.
- Veranderingen in de werking van uw lever, waaronder ontsteking van de lever (hepatitis). U kunt merken dat u moe bent, dat uw huid of oogwit geel worden of dat u griepachtige verschijnselen heeft.
- Misselijkheid.
- Veranderingen van de bloedwaarden:
 - Een verminderde hoeveelheid natrium in uw bloed. Als dit ernstig is, kunt u merken dat u zich zwak voelt, weinig energie of spierkrampen heeft.
- Hoesten
- Intestinaal angio-oedeem: een zwelling in de darm met symptomen als buikpijn, misselijkheid, braken en diarree.

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

- Diarree

Bijkomende bijwerkingen bij kinderen

Bij kinderen behandeld voor hoge bloeddruk, lijken de bijwerkingen gelijkaardig aan deze bij volwassenen, maar ze treden vaker op. Keelpijn is een zeer vaak voorkomende bijwerking bij kinderen, maar is niet gerapporteerd bij volwassenen, en een loopneus, koorts en een versnelde hartslag komen vaak voor bij kinderen, maar zijn niet gerapporteerd bij volwassenen.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via:

België: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - www.fagg.be - Afdeling Vigilantie : Website: www.eenbijwerkingmelden.be - E-mail: adr@fagg-afmps.be.

Luxemburg: Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy of Division de la Pharmacie et des Médicaments de la Direction de la Santé – website : www.guichet.lu/pharmacovigilance.

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Candesartan EG?

- Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
- Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos of blisterverpakking na “EXP”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die die u niet meer gebruikt. Als u geneesmiddelen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in Candesartan EG?

De werkzame stof in Candesartan EG is candesartan cilexetil.

Candesartan EG 2 mg bevat 2 mg candesartan cilexetil.

Candesartan EG 4 mg bevat 4 mg candesartan cilexetil.

Candesartan EG 8 mg bevat 8 mg candesartan cilexetil.

Candesartan EG 16 mg bevat 16 mg candesartan cilexetil.

Candesartan EG 32 mg bevat 32 mg candesartan cilexetil.

De andere stoffen in Candesartan EG zijn: lactose.monohydraat, maïszetmeel, hydroxypropylcellulose, calciumcarmellose, Macrogol 8000, magnesiumstearaat. De tabletten van 8 mg, 16 mg en 32 mg bevatten ook rood ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Candesartan EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Candesartan EG 2 mg: ronde tabletten met een diameter van 7 mm, wit tot gebroken wit, met een “2” op de ene kant.

Candesartan EG 4 mg: ronde tabletten met een diameter van 7 mm, wit tot gebroken wit, met een breukstreep aan de ene kant en “4” op de andere kant.

Candesartan EG 8 mg: ronde tabletten met een diameter van 6,4 mm, roze (niet effen, met mogelijk donkerdere of witte vlekken); met een breukstreep aan de ene kant en “8” op de andere kant.

Candesartan EG 16 mg: ronde tabletten met een diameter van 7 mm, roze (niet effen, met mogelijk donkerdere of witte vlekken); met een breukstreep aan de ene kant en “16” op de andere kant.

Candesartan EG 32 mg: ronde tabletten met een diameter van 9,5 mm, roze (niet effen, met mogelijk donkerdere of witte vlekken); met een breukstreep aan de ene kant en “32” op de andere kant.

De tabletten zijn beschikbaar in:

Verpakkingen met 2 mg:

Blisterverpakkingen: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 100 tabletten

Flessen: 140 tabletten

Bijsluiter

Verpakkingen met 4 mg:

Blisterverpakkingen: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 100 tabletten
Flessen: 100 tabletten

Verpakkingen met 8 mg:

Blisterverpakkingen: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 100 tabletten
Flessen: 100 tabletten

Verpakkingen met 16 mg:

Blisterverpakkingen: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 100 tabletten
Flessen: 100 tabletten

Verpakkingen met 32 mg:

Blisterverpakkingen: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 100 tabletten
Flessen: 100 tabletten

Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

EG (Eurogenerics) NV – Heizel Esplanade b22 – 1020 Brussel

Fabrikanten

1) STADA Arzneimittel AG – Stadastraße 2-18 – 61118 Bad Vilbel – Duitsland

2) Stada Arzneimittel GmbH – Muthgasse 36 – 1190 Wenen – Oostenrijk

3) LABORATORIOS LICONSA - S.A., Avda. Miralcampo, 7 - Pol. Ind. Miralcampo, 19200, Azuqueca de Henares, Guadalajara - Spanje

4) Clonmel Healthcare Ltd. - Waterford Road Clonmel - Co. Tipperary, Ierland

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

| | |
|----|--|
| DK | Candesartan STADA |
| AT | Candesartan Aliud 4 mg Tabletten Candesartan Aliud 8mg Tabletten Candesartan Aliud 16 mg Tabletten Candesartan Aliud 32 mg Tabletten |
| BE | Candesartan EG 2 mg tabletten Candesartan EG 4 mg tabletten Candesartan EG 8 mg tabletten Candesartan EG 16 mg tabletten Candesartan EG 32 mg tabletten |
| LU | Candesartan EG 2 mg comprimés Candesartan EG 4 mg comprimés Candesartan EG 8 mg comprimés Candesartan EG 16 mg comprimés Candesartan EG 32 mg comprimés |
| FI | Candesartan STADA 4 mg tabletti Candesartan STADA 8 mg tabletti Candesartan STADA 16 mg tabletti Candesartan STADA 32 mg tabletti |
| FR | CANDESARTAN EG LABO 4 mg, comprimé sécable CANDESARTAN EG LABO 8 mg, comprimé sécable CANDESARTAN EG LABO 16 mg, comprimé sécable CANDESARTAN EG LABO 32 mg, comprimé sécable |
| DE | Candesartan STADA 2 mg Tabletten Candesartan STADA 4 mg Tabletten |

Bijsluiter

| | |
|----|--|
| | Candesartan STADA 8 mg Tabletten |
| | Candesartan STADA 16 mg Tabletten |
| | Candesartan STADA 32 mg Tabletten |
| IE | Candesartan Clonmel 4 mg tablets |
| | Candesartan Clonmel 8 mg tablets |
| | Candesartan Clonmel 16 mg tablets |
| PT | Candesartan Ciclum Farma |
| SK | Kandesartan STADA 8 mg tablety |
| | Kandesartan STADA 16 mg tablety |
| | Kandesartan STADA 32 mg tablety |
| ES | Candesartán STADAFARMA 4 mg comprimidos EFG |
| | Candesartán STADAFARMA 8 mg comprimidos EFG |
| | Candesartán STADAFARMA 16 mg comprimidos EFG |
| | Candesartán STADAFARMA 32 mg comprimidos EFG |
| SE | Candesartan STADA 4 mg tabletter |
| | Candesartan STADA 8 mg tabletter |
| | Candesartan STADA 16 mg tabletter |
| | Candesartan STADA 32 mg tabletter |
| IS | Candesartan STADA 4 mg töflur |
| | Candesartan STADA 8 mg töflur |
| | Candesartan STADA 16 mg töflur |
| | Candesartan STADA 32 mg töflur |
| NO | Candesartan STADA 4 mg tabletter |
| | Candesartan STADA 8 mg tabletter |
| | Candesartan STADA 16 mg tabletter |
| | Candesartan STADA 32 mg tabletter |
| MT | Candesartan Clonmel 4 mg tablets |
| | Candesartan Clonmel 8 mg tablets |
| | Candesartan Clonmel 16 mg tablets |

Nummer(s) van de vergunning voor het in de handel brengen:

Candesartan EG 2 mg tabletten (blisterverpakking): BE663816

Candesartan EG 2 mg tabletten (fles): BE663817

Candesartan EG 4 mg tabletten (blisterverpakking): BE663818

Candesartan EG 4 mg tabletten (fles): BE663819

Candesartan EG 8 mg tabletten (blisterverpakking): BE663820

Candesartan EG 8 mg tabletten (fles) : BE663821

Candesartan EG 16 mg tabletten (blisterverpakking): BE663822

Candesartan EG 16 mg tabletten (fles): BE663823

Candesartan EG 32 mg tabletten (blisterverpakking): BE663824

Candesartan EG 32 mg tabletten (fles) : BE663825

Afleveringswijze: op medisch voorschrift.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 08/2025.

De meest recente goedgekeurde bijsluiter over dit geneesmiddel is beschikbaar door de QR-code op de buitenverpakking te scannen met een smartphone/apparaat. Dezelfde informatie is ook beschikbaar op de volgende URL:

<https://qrcodes.pro/XGZK3B>