

## RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### 1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Taurador 10 mg/ml solution injectable pour bovins, ovins et porcins

### 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Par ml :

#### Substance active:

Doramectine 10,0 mg

#### Excipients:

| Composition qualitative en excipients et autres composants | Composition quantitative si cette information est essentielle à une bonne administration du médicament vétérinaire |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oleate d'éthyl                                             |                                                                                                                    |
| Huile de sésame, raffinée                                  |                                                                                                                    |
| Butylhydroxyanisole (E320)                                 | 0,026 mg                                                                                                           |
| Butylhydroxytoluène (E321)                                 | 0,01 mg                                                                                                            |

Solution limpide, incolore à jaune.

### 3. INFORMATIONS CLINIQUES

#### 3.1 Espèces cibles

Bovins, ovins et porcins.

#### 3.2 Indications d'utilisation pour chaque espèce cible

##### Bovins

Pour le traitement des nématodes gastro-intestinaux, des nématodes pulmonaires, des hypodermes, des poux, des acariens de la gale et des nématodes oculaires, suivants :

##### Nématodes gastro-intestinaux

*Ostertagia ostertagi* (L4, larves inhibés et adultes), *O. lyrata* (adultes), *Haemonchus placei* (L4, adultes), *Trichostrongylus axei* (L4, adultes), *T. colubriformis* (L4, adultes), *T. longispicularis* (adultes), *Cooperia oncophora* (L4, adultes), *C. pectinata* (adultes), *C. punctata* (L4, adultes), *C. surnabada* (syn. *mcmasteri*) (L4, adultes), *Nematodirus spathiger* (adultes), *Bunostomum phlebotomum* (adultes), *Strongyloides papillosus* (adultes), *Oesophagostomum radiatum* (L4, adultes), *Trichuris* spp. (adultes)

##### Nématodes pulmonaires

*Dictyocaulus viviparus* (L4, adultes)

##### Nématodes oculaires

*Thelazia* spp. (adultes)

##### Hypodermes (stades parasites)

*Hypoderma bovis*, *H. lineatum*

##### Poux piqueurs

*Haematopinus eurysternus*, *Linognathus vituli*, *Solenopotes capillatus*

Acariens de la gale*Psoroptes bovis*, *Sarcoptes scabiei*

Le médicament vétérinaire est également une aide au traitement des:

Nématodes gastro-intestinaux*Nematodirus helvetianus*Acariens de la gale*Chorioptes bovis*Poux broyeurs*Damalinia bovis*

Le médicament vétérinaire est également une aide à l'élimination des:

Tiques*Ixodes ricinus*Effet longue action

Le médicament vétérinaire protège les bovins contre les infections ou réinfections dues aux parasites ci-dessous pendant les périodes indiquées :

| <u>Espèces</u>                  | <u>Durée</u> |
|---------------------------------|--------------|
| <i>Ostertagia ostertagi</i> :   | 28 jours     |
| <i>Cooperia oncophora</i> :     | 21 jours     |
| <i>Dictyocaulus viviparus</i> : | 35 jours     |
| <i>Linognathus vituli</i> :     | 28 jours     |
| <i>Psoroptes bovis</i> :        | 42 jours     |

**Ovins:**

Pour le traitement des nématodes gastro-intestinaux, des nématodes pulmonaires, des acariens de la gale et des oestres, suivants:

Nématodes gastro-intestinaux (adultes, larves L4 et larves L3, sauf si spécifié autrement)

*Bunostomum trigonocephalum* (adultes), *Chabertia ovina*, *Cooperia curticei* (larves L4), *C. oncophora* (adultes, larves L4), *Gaigeria pachycelis*, *Haemonchus contortus*, *Nematodirus filicollis* (adultes), *N. battus* (larves L4), *N. spathiger*, *Ostertagia (Teladorsagia) circumcincta*, *Ostertagia (Teladorsagia) trifurcata* (adultes), *Oesophagostomum venulosum* (adultes), *Oesophagostomum columbianum*, *Strongyloides papillosus*, *Trichostrongylus axei* (adultes, larves L4), *Trichostrongylus colubriformis*, *Trichostrongylus vitrinus* (adultes, larves L4), *Trichuris* spp. (adultes)

Nématodes pulmonaires (adultes, larves L4 et larves L3, sauf si spécifié autrement) :

*Cystocaulus ocreatus* (adultes), *Dictyocaulus filaria*, *Muellerius capillaris* (adultes), *Neostrongylus linearis* (adultes), *Protostrongylus rufescens* (adultes)

Oestres du mouton (larves, L1, L2 en L3)*Oestrus ovis*Acariens de la gale*Psoroptes ovis***Porcins :**

Pour le traitement des nématodes gastro-intestinaux, des nématodes pulmonaires, des nématodes rénaux, des poux piqueurs et des acariens de la gale chez les porcs.

Nématodes gastro-intestinaux (adultes et larves du quatrième stade)

*Hyostrogylus rubidus*, *Ascaris suum*, *Strongyloides ransomi* (adultes uniquement),  
*Oesophagostomum dentatum*, *Oesophagostomum quadrispinulatum*

Nématodes pulmonaires

*Metastrongylus* spp. (adultes uniquement)

Nématodes rénaux

*Stephanurus dentatus* (adultes uniquement)

Poux piqueurs

*Haematopinus suis*

Acariens de la gale

*Sarcoptes scabiei* var. *suis*

Le médicament vétérinaire protège les porcins contre les infections ou réinfections dues aux *Sarcoptes scabiei* pendant 18 jours.

### 3.3 Contre-indications

Ne pas utiliser chez les chiens, car des effets secondaires sévères peuvent se produire. Comme observé avec d'autres avermectines, certaines races de chien, telles le Colley, ainsi que les tortues, sont spécifiquement sensibles à la doramectine. Toute précaution doit donc être prise pour éviter l'ingestion accidentelle de ce médicament vétérinaire.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.

### 3.4 Mises en gardes particulières

Une utilisation non justifiée d'antiparasitaires ou une utilisation non conforme aux recommandations du RCP peut augmenter la pression de sélection de résistances et conduire à une efficacité réduite. La décision d'utiliser le médicament vétérinaire doit être basée sur la confirmation de l'espèce parasitaire et de sa charge, ou du risque d'infestation en fonction de ses caractéristiques épidémiologiques, pour chaque groupe d'animaux/troupeau.

Une utilisation répétée pendant une période prolongée, en particulier lorsque la même classe de substances est utilisée, augmente le risque de développement de résistance. Au sein d'un troupeau/groupe, la préservation de population 'refuges' de parasites sensibles est essentiel pour réduire ce risque. Les traitements systémiques à intervalle déterminé et le traitement de l'ensemble du troupeau/groupe doivent être évités. Au lieu de cela, lorsque cela est possible, seuls des animaux ou des sous-groupes sélectionnés doivent être traités (traitement sélectif ciblé). Cela devrait être associé à des mesures appropriées de gestion de l'élevage et de conduite de pâture. Des conseils pour chaque troupeau/groupe spécifique doivent être demandés auprès du vétérinaire responsable.

Une résistance à la doramectine et à d'autres avermectines a été rapportée avec *Psoroptes ovis* chez les bovins et les ovins et avec les nématodes gastro-intestinaux, *T. longispicularis*, *Haemonchus* spp., *Cooperia* spp. et *Ostertagia ostertagi* chez les bovins et *Teladorsagia* spp., *Trichostrongylus* spp. et *Haemonchus* spp. chez les ovins.

Le médicament vétérinaire peut être utilisé pour le traitement de l'*Ostertagia* (*Teladorsagia*) *circumcincta* chez les ovins, y compris les stades larvaires L4 inhibés, en particulier les souches résistantes aux benzimidazoles.

Lors de l'utilisation de ce médicament vétérinaire, les informations locales sur la sensibilité des parasites cibles doivent être prises en compte, si elles sont disponibles. Il est recommandé que les cas de résistance suspectée fassent l'objet d'une enquête plus approfondie en utilisant une méthode de

diagnostic appropriée (par exemple FECRT). Les résistances confirmées doivent être signalées au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou aux autorités compétentes.

### **3.5 Précautions particulières d'emploi**

#### Précautions particulières pour une utilisation sûre chez les espèces cibles:

Pour éviter des réactions secondaires dues à la mort des larves d'*Hypoderma* au niveau de l'œsophage ou de la colonne vertébrale, il est recommandé d'administrer le médicament vétérinaire à la fin de la période d'activité de l'hypoderme et avant que les larves n'atteignent leur site de repos. Consultez votre vétérinaire pour connaître le moment correct de ce traitement.

#### Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux:

Veuillez à éviter toute auto-administration accidentelle – demandez conseil à un médecin si vous observez des signes spécifiques.

Conseils aux médecins : Des injections accidentelles chez l'homme n'ont que rarement entraîné des symptômes cliniques spécifiques. Il est conseillé de traiter tout cas qui surviendrait de façon symptomatique.

Ce médicament vétérinaire peut être irritant pour les yeux. Évitez tout contact accidentel avec les yeux, y compris le contact main-œil. En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer abondamment à l'eau.

Le médicament vétérinaire peut provoquer une embryotoxicité et des effets toxiques chez les nouveau-nés via l'allaitement. Les femmes enceintes et allaitantes doivent donc faire preuve d'une prudence particulière lors de la manipulation de ce médicament vétérinaire.

Bien se laver les mains après usage.

#### Précautions particulières concernant la protection de l'environnement:

La doramectine est très toxique pour les bousiers et les organismes aquatiques et peut s'accumuler dans les sédiments.

Le risque pour les écosystèmes aquatiques et les bousiers peut être réduit en évitant d'utiliser la doramectine de façon fréquente et répétée (ainsi que tous les autres produits appartenant à la même classe d'anthelminthique).

Le risque pour les écosystèmes aquatiques peut être encore diminué en tenant les animaux traités à l'écart de tout plan d'eau pendant 2 à 5 semaines après le traitement

### **3.6 Effets indésirables**

Aucune connue.

Il est important de notifier les effets indésirables. La notification permet un suivi continu de l'innocuité d'un médicament vétérinaire. Les notifications doivent être envoyées, de préférence par l'intermédiaire d'un vétérinaire, soit au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou à son représentant local, soit à l'autorité nationale compétente par l'intermédiaire du système national de notification. Voir la notice pour les coordonnées respectives.

### **3.7 Utilisation en cas de gestation, de lactation ou de ponte**

#### Gestation et lactation:

##### **Bovins et ovins:**

Peut être utilisé chez les vaches et les brebis gestantes.

**Porcins:**

Peut être utilisé chez les truies allaitantes.

Fertilité:**Porcins:**

Peut être utilisé chez les truies reproductrices et chez les verrats reproducteurs.

**3.8 Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions**

Aucune connue.

**3.9 Voies d'administration et posologie**

Voie sous-cutanée (bovins).

Voie intramusculaire (ovins et porcins).

Bovins :

Une dose unique de 1 ml (10 mg de doramectine) par 50 kg de poids corporel, équivalent à 200 µg/kg de poids corporel, administrée dans la région de l'encolure par injection sous-cutanée.

*Calendrier de traitement dans les régions où se produit l'hypodermose*

Les bovins atteints d'hypodermose doivent être traités à la fin de la période d'activité des hypodermoses et avant que les larves n'atteignent leur site de repos.

Ovins :

Une dose unique de 1 ml (10 mg de doramectine) par 50 kg de poids corporel, équivalent à 200 µg/kg de poids corporel, administrée par injection intramusculaire dans la région de l'encolure.

Porcins :

Une dose unique de 0,3 ml (3 mg de doramectine) pour 10 kg de poids corporel (1,0 ml pour 33,0 kg) correspondant à 300 µg/kg de poids corporel, administrée par injection intramusculaire.

Les porcelets pesant 16 kg ou moins doivent être traités selon le tableau suivant :

| <b>Poids corporel (kg)</b> | <b>Dose (ml)</b> |
|----------------------------|------------------|
| Moins que 4kg              | 0,1ml            |
| 5 - 7 kg                   | 0,2ml            |
| 8 - 10 kg                  | 0,3ml            |
| 11 - 13 kg                 | 0,4ml            |
| 14 - 16 kg                 | 0,5ml            |

Un sous-dosage pourrait entraîner une utilisation inefficace et favoriser le développement de résistance.

Afin de garantir une posologie appropriée, le poids corporel doit être déterminé aussi précisément que possible.

Si les animaux doivent être traités collectivement, des groupes raisonnablement homogènes doivent être constitués et tous les animaux d'un groupe doivent recevoir la dose correspondante à celle destinée à l'animal le plus lourd.

Lors du traitement de groupes d'animaux, utiliser un dispositif de dosage automatique approprié et un appareil de prélèvement avec évent. La précision du dispositif de dosage doit être soigneusement vérifiée.

Pour le traitement de moutons ou de porcs individuels, l'utilisation d'aiguilles de taille appropriée et de seringues jetables doit être conseillée par un vétérinaire. Pour le traitement des jeunes agneaux ou porcelets pesant 16 kg ou moins, une seringue jetable de 1 ml graduée par incréments de 0,1 ml ou moins doit être utilisée.

Utilisez un équipement sec et stérile et suivez des procédures aseptiques. Éviter l'introduction de contamination.

100 ml: Le médicament vétérinaire doit être administré à l'aide d'une aiguille de prélèvement.

250 ml et 500 ml: Les bouchons des flacons ne doivent pas être percés plus de 10 fois avec une aiguille 18G. Tamponnez le septum avant de retirer chaque dose.

Par temps froid, le médicament vétérinaire peut être réchauffé à température ambiante dans un environnement chaud, pour faciliter l'administration dans la seringue.

### **3.10 Symptômes de surdosage (et, le cas échéant, conduite d'urgence et antidotes)**

Des surdosages allant chez les bovins jusqu'à 25 fois la dose recommandée, chez les ovins jusqu'à 15 fois et chez les porcins jusqu'à 10 fois n'ont entraîné l'apparition d'aucun signe clinique particulier pouvant être attribué au traitement par la doramectine.

### **3.11 Restrictions d'utilisation spécifiques et conditions particulières d'emploi, y compris les restrictions liées à l'utilisation de médicaments vétérinaires antimicrobiens et antiparasitaires en vue de réduire le risque de développement de résistance**

Sans objet.

### **3.12 Temps d'attente**

#### Bovins :

Viande et abats: 70 jours.

Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

Ne pas utiliser chez les vaches ou génisses gestantes productrices de lait destiné à la consommation humaine au cours des 2 mois précédant la date prévue de parturition.

#### Ovins :

Viande et abats: 70 jours.

Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

Ne pas utiliser chez les brebis gestantes productrices de lait destiné à la consommation humaine au cours des 70 jours précédant la date prévue de parturition.

#### Porcins :

Viande et abats: 77 jours.

## **4. INFORMATIONS PHARMACOLOGIQUES**

### **4.1 Code ATCvet: QP54AA03**

### **4.2 Propriétés pharmacodynamiques**

La doramectine est un antiparasitaire obtenu par fermentation de souches sélectionnées dérivées de l'organisme du sol *Streptomyces avermitilis*. C'est une lactone macrocyclique et est étroitement liée à l'ivermectine. Les deux composés partagent un large spectre d'activité antiparasitaire et produisent une paralysie de même nature chez les nématodes et les arthropodes parasites. Les lactones macrocycliques activent les canaux chlorure glutamate dépendants (GluCl) présents sur les membranes musculaires du pharynx et sur les neurones particuliers des parasites invertébrés. L'entrée d'ions chlorure dans les motoneurons excitateurs des nématodes ou dans les cellules musculaires des arthropodes entraîne une hyperpolarisation et l'élimination du signal de transmission, ce qui entraîne une paralysie. La toxicité sélective des lactones macrocycliques comme antiparasitaires est attribuée à cette action sur des canaux non présents chez l'animal hôte. Il existe des preuves que les membranes des cellules musculaires de l'appareil reproducteur des femelles invertébrées pourraient être plus sensibles aux lactones macrocycliques que les récepteurs situés sur les nerfs ou d'autres muscles, ce qui pourrait expliquer la réduction spectaculaire mais temporaire de la production d'œufs chez les

parasites non tués ou éliminés par la thérapie. Plusieurs mécanismes de résistance aux lactones macrocycliques ont été proposés, par exemple des polymorphismes ou des modifications de l'expression des gènes des protéines cibles et de transport GluCl, ainsi que l'expression accrue des enzymes codantes pour le métabolisme des médicaments. De plus, une diminution de l'expression des gènes cibles du médicament peut conduire à une réduction des sites de liaison du médicament et donc à une efficacité réduite du médicament.

### **4.3 Propriétés pharmacocinétiques**

Chez les bovins, la concentration plasmatique maximale de doramectine survie 3 jours après l'administration par voie sous-cutanée. La demi-vie d'élimination est d'environ 6 jours.

Chez les ovins, la concentration plasmatique maximale de doramectine survie 2 jours après l'administration par voie intramusculaire. La demi-vie d'élimination est 4,5 jours chez les ovins.

Chez les porcins, la concentration plasmatique maximale de doramectine survie 3 jours après l'administration par voie intramusculaire. La demi-vie d'élimination est d'environ 6 jours.

### **Propriétés environnementales**

Comme les autres lactones macrocycliques, la doramectine peut potentiellement nuire aux organismes non ciblés. Après le traitement, l'excrétion de quantités de doramectine potentiellement toxiques peut avoir lieu sur une période de plusieurs semaines. Les matières fécales contenant de la doramectine excrétées dans les pâturages par les animaux traités peuvent réduire la quantité de bousiers, ce qui peut avoir un impact sur la dégradation des bouses.

La doramectine est très toxique pour les organismes aquatiques et peut s'accumuler dans les sédiments. La doramectine est très persistante dans les sols.

## **5. DONNÉES PHARMACEUTIQUES**

### **5.1 Incompatibilités majeures**

En l'absence d'études de compatibilité, ce médicament vétérinaire ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments vétérinaires.

### **5.2 Durée de conservation**

Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente: 2 ans

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire:

100 ml: À utiliser immédiatement. Éliminer tout matériel non utilisé après première ouverture du conditionnement primaire.

250 ml et 500 ml: 28 jours.

### **5.3 Précautions particulières de conservation**

À conserver dans l'emballage d'origine.

### **5.4 Nature et composition du conditionnement primaire**

Flacons multidoses en verre ambré (Type II) fermés par un bouchon en caoutchouc nitrile et scellés avec une capsule en aluminium dans un récipient protecteur en plastique.

Taille de l'emballage:

Récipient de protection en plastique avec 1 flacon de 100 ml.

Récipient de protection en plastique avec 1 flacon de 250 ml.

Réceptacle de protection en plastique avec 1 flacon de 500 ml.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

#### **5.5 Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments vétérinaires non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments**

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Le médicament vétérinaire ne doit pas être déversé dans les cours d'eau car la doramectine pourrait mettre les poissons et autres organismes aquatiques en danger.

Utiliser les dispositifs de reprise mis en place pour l'élimination de tout médicament vétérinaire non utilisé ou des déchets qui en dérivent, conformément aux exigences locales et à tout système national de collecte applicable au médicament vétérinaire concerné.

#### **6. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

#### **7. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V663863

#### **8. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION**

Date de première autorisation: 04/02/2025

#### **9. DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR DU RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

22/05/2026

#### **10. CLASSIFICATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES**

Médicament vétérinaire soumis à ordonnance.

Des informations détaillées sur ce médicament vétérinaire sont disponibles dans la base de données de l'Union sur les médicaments (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).