

## **Notice : information du patient**

### **Octeangin 2,6 mg pastilles** *dichlorhydrate d'octénidine*

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 4 jours.

#### **Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce que Octeangin 2,6 mg pastilles et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Octeangin 2,6 mg pastilles
3. Comment utiliser Octeangin 2,6 mg pastilles
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Octeangin 2,6 mg pastilles
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### **1. Qu'est-ce que Octeangin 2,6 mg pastilles et dans quel cas est-il utilisé ?**

Octeangin contient la substance active dichlorhydrate d'octénidine. Il s'agit d'un agent antiseptique qui agit contre les agents pathogènes en détruisant leur fonction cellulaire.

Octeangin est utilisé pour le traitement adjuvant de courte durée de l'inflammation de la muqueuse buccale et de la gorge, accompagnée de symptômes typiques tels que douleur, rougeur et gonflement.

Ce médicament est indiqué chez les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 4 jours.

#### **2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Octeangin 2,6 mg pastilles ?**

##### **N'utilisez jamais Octeangin**

si vous êtes allergique au dichlorhydrate d'octénidine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

##### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Octeangin.

Utilisation de courte durée uniquement.  
N'utilisez pas ce médicament pendant plus de 4 jours.

### **Enfants**

La sécurité et l'efficacité d'Octeangin chez les enfants âgés de 0 à 11 ans n'ont pas encore été établies.

### **Autres médicaments et Octeangin**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, y compris des médicaments en vente libre.

Aucune étude d'interaction n'a été réalisée.

### **Grossesse, allaitement et fertilité**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

#### Grossesse

Les femmes enceintes doivent consulter un médecin avant d'utiliser Octeangin.

#### Allaitement

On ne dispose pas d'informations suffisantes sur l'excrétion du chlorhydrate d'octénidine dans le lait maternel.

Un risque pour le nourrisson ne peut être entièrement exclu. Octeangin ne doit donc pas être utilisé pendant l'allaitement.

#### Fertilité

Aucune étude n'a été menée.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Aucune étude n'a été menée sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

### **Octeangin contient de l'isomalt (E953)**

Une pastille contient 2,57 g d'isomalt, un produit de substitution du sucre, ce qui correspond à environ 6 kcal (26 kJ). Il convient d'en tenir compte chez les patients souffrant de diabète sucré. L'isomalt peut avoir un effet laxatif léger.

Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### **3. Comment utiliser Octeangin 2,6 mg pastilles ?**

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est :

Les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus doivent prendre une pastille toutes les 2 à 3 heures. La dose quotidienne maximale est de 6 pastilles.

Mode d'administration :

Sucez la pastille activement et sans interruption. Déplacez la pastille dans la bouche jusqu'à ce qu'elle soit complètement dissoute.

Sauf recommandation d'un médecin, Octeangin ne peut pas être utilisé pendant plus de 4 jours.

Les effets indésirables peuvent être minimiser en utilisant la plus faible dose efficace pendant la durée la plus courte nécessaire pour contrôler les symptômes.

**Si vous avez utilisé plus de Octeangin que vous n'auriez dû**

Si vous avez utilisé ou pris trop d'Octeangin, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

Dans le cas peu probable d'un surdosage, les effets indésirables décrits peuvent se manifester de manière plus intense. Dans un tel cas, veuillez consulter votre médecin afin de traiter les symptômes.

**Si vous oubliez d'utiliser Octeangin**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la pastille que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations- à votre médecin ou à votre pharmacien.

**4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

**Fréquent (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10) :**

- Modification du goût (dysgueusie).

**Peu fréquent (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100) :**

- Douleurs abdominales, diarrhée, nausées, sécheresse buccale, vomissements, dyspepsie, gêne épigastrique.

**Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) :**

- Irritation de la muqueuse buccale et gastrique.
- Décoloration de la langue.
- Réactions allergiques.

**Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

[www.afmps.be](http://www.afmps.be)

Division Vigilance:

Site internet: [www.notifieruneffetindesirable.be](http://www.notifieruneffetindesirable.be)

e-mail: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. Comment conserver Octeangin 2,6 mg pastilles ?**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage extérieur et sur la plaquette thermoformée, après « Exp ». La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.

Conserver la plaquette dans l'emballage extérieur à l'abri de la lumière.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation concernant la température.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribuent à protéger l'environnement.

## **6. Contenu de l'emballage et autres informations**

### **Ce que contient Octeangin ?**

- La substance active est le dichlorhydrate d'octénidine. Une pastille contient 2,6 mg de dichlorhydrate d'octénidine.
- Les excipients sont l'isomalt (E953), l'acide tartrique, un arôme de masquage de l'amertume (contient du propylène glycol, de l'extrait de café et de l'acide 4-(2,2,3-triméthylcyclopentyl) butanoïque), l'huile d'anis étoilé, l'huile de menthe poivrée, le sucralose (E955).

### **Aspect d'Octeangin et contenu de l'emballage extérieur**

Les pastilles sont de couleur ivoire, rondes et légèrement transparentes.

Octeangin est disponible dans des boîtes en carton contenant 12, 16, 20 ou 24 pastilles, emballées sous plaquettes en PVC/PVDC et feuille d'aluminium.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

### **Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant**

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché :

Melisana SA

Avenue du Four à Briques 1

1140 Bruxelles

Fabricant :

Klosterfrau Berlin GmbH

Motzener Str. 41

12277 Berlin

Allemagne

**Ce médicament est autorisé dans les États membres de l'Espace Économique Européen sous les noms suivants :**

Allemagne, Grand-Duché de Luxembourg : Laryngomedin Octenidin Antisept

Autriche : Octeangin antisept 2,6 mg Pastillen

Belgique, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie : Octeangin

République tchèque, Estonie, Lettonie, Lituanie, Slovaquie : Octenidine Klosterfrau

Croatie : Oktenidindiklorid Klosterfrau

Slovénie : Oktenidin Klosterfrau

**Numéro de l'Autorisation de mise sur le marché :**

BE663984

**Mode de délivrance :**

Délivrance libre.

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 12/2025.**