

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Ibuprofen EG Rapidcaps 400 mg zachte capsules ibuprofen

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts:
 - na 3 dagen bij jongeren
 - na 3 dagen bij volwassenen in geval van koorts
 - na 4 dagen bij volwassenen in geval van pijn.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Ibuprofen EG Rapidcaps en waarvoor wordt dit geneesmiddel ingenomen?
2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit geneesmiddel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Ibuprofen EG Rapidcaps en waarvoor wordt het ingenomen?

Ibuprofen hoort bij een groep geneesmiddelen die ‘niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen’ (NSAID’s) heten. NSAID’s maken pijn en koorts minder door de reactie van het lichaam op pijn en koorts te veranderen.

Voor gebruik bij volwassenen en jongeren die meer wegen dan 40 kilogram (12 jaar en ouder). Dit geneesmiddel wordt gebruikt om klachten van lichte tot gemiddelde pijn voor een korte tijd minder te maken. De oorzaak van die pijn wordt niet behandeld. Het wordt gebruikt bij klachten, zoals:

- Hoofdpijn,
- Menstratiepijn,
- Kiespijn en
- Koorts en pijn bij een gewone verkoudheid.

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts:

- na 3 dagen bij jongeren
- na 3 dagen bij volwassenen in geval van koorts
- na 4 dagen bij volwassenen in geval van pijn.

2. Wanneer mag u Ibuprofen EG Rapidcaps niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet innemen?

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- U heeft in het verleden last gehad van benauwdheid, astma, loopneus, zwelling of uitslag op de huid met roze bulten en erge jeuk (netelroos), na het gebruik van aspirine (acetylsalicylzuur) of een andere pijnstiller die daarop lijkt (NSAID’s).

- U heeft een zweer of bloeding in de maag of twaalfvingerige darm (peptische ulcus). Of u heeft dit in het verleden minimaal 2 keer eerder gehad.
- U heeft in het verleden tijdens het gebruik van een ‘niet-steroïdale ontstekingsremmer’ (NSAID) een bloeding van de maag of darmen gehad.
- U heeft een ziekte waardoor uw lichaam problemen heeft met het maken van bloed. Hiervan is de oorzaak nog niet bekend.
- U heeft een erge vorm van leverfalen, nierfalen of hartfalen.
- U zit in de laatste drie maanden van uw zwangerschap (zie rubriek “Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid”).
- U heeft een erge vorm van uitdroging (door overgeven, diarree of te weinig drinken).
- U heeft een bloeding in de hersenen (cerebrovasculaire bloeding), of een andere bloeding op dit moment.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Ibuprofen EG Rapidcaps?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt, als:

- u systemische lupus erythematoses (SLE) of gemengde bindweefselziekte heeft. Dit zijn ziekten van de afweer van uw lichaam (immuunsysteem). Deze ziekten veroorzaken gewrichtspijn, huiduitslag en koorts.
- u een erfelijke ziekte heeft waarbij uw lichaam problemen heeft met het maken van bloed (bijvoorbeeld acute intermitterende porfyrie). Of als uw lichaam problemen heeft met het stollen van uw bloed (door stollen komt er een korstje op een wond).
- u een ziekte van het maagdarmkanaal heeft of heeft gehad (zoals ulceratieve colitis, ziekte van Crohn).
- uw nieren minder goed werken.
- u leverproblemen heeft.
- u kortgeleden een grote operatie heeft gehad.
- u astma of een allergische ziekte heeft of heeft gehad. U kunt bij het gebruik van dit geneesmiddel namelijk benauwd worden.
- u last heeft van hooikoorts, goedaardige zwellingen van het neusslijmvlies (neuspoliepen) of een soort longziekte (chronische obstructieve longziekte). U heeft namelijk een groter risico op allergische reacties bij het gebruik van dit geneesmiddel. De allergische reacties kunnen zijn: astma-aanvallen (dit heet analgetisch astma), een zwelling die opeens ontstaat (oedeem van Quincke) of huiduitslag.
- u andere geneesmiddelen gebruikt die het risico op het ontstaan van zweren (ulceratie) of bloedingen groter maken. Hierbij horen geneesmiddelen die ontstekingen en allergische reacties minder erg maken (corticosteroiden) die via de mond ingenomen worden. Hierbij horen ook bloedverdunners (zoals warfarine), geneesmiddelen tegen depressie (selectieve serotonineheropnameremmers) of geneesmiddelen die bloed minder snel laten stollen, zoals aspirine (acetylsalicylzuur).
- u een ontsteking (infectie) heeft – zie rubriek “Infecties” hieronder.

Infecties

Ibuprofen kan klachten van ontstekingen (infecties), zoals koorts en pijn, verbergen. Daarom kan dit geneesmiddel ervoor zorgen dat de behandeling van een infectie op een later moment begint. Hierdoor kan het risico op problemen groter worden. Dit is gebeurd bij longontstekingen en huidinfecties door bacteriën die optraden bij waterpokken. Gebruikt u dit geneesmiddel terwijl u een infectie heeft? En worden de klachten niet beter of worden ze zelfs erger? Dan moet u direct contact opnemen met een arts.

Andere waarschuwingen

Langdurig gebruik van elke soort pijnstiller voor hoofdpijn kan de hoofdpijn verergeren. Gebeurt dit of denkt u dat dit gebeurt? Stop dan met het gebruik van dit geneesmiddel en neem contact op met uw arts.

- Gebruik dit geneesmiddel niet als u waterpokken (varicella) heeft.
- Gebruikt u dit geneesmiddel voor een langere periode? Dan moet regelmatig worden gecontroleerd of uw lever en nieren nog goed werken en of u genoeg bloedcellen heeft.

- Gebruik dit geneesmiddel niet samen met andere ‘niet-steroïdale ontstekingsremmers’ (NSAID’s), zoals ‘cyclo-oxygenase-2-selectieve remmers’. Het risico op bijwerkingen kan namelijk groter zijn.
- Door regelmatig gebruik van een aantal pijnstillers kunt u erge nierproblemen krijgen die niet meer overgaan. Het risico kan groter zijn door het verlies van zout en uitdroging.
- Er bestaat een kans dat de nieren van jongeren met uitdroging minder goed werken.
- Er zijn meldingen geweest na het gebruik van ibuprofen van verschijnselen van een allergische reactie op dit geneesmiddel, waaronder ademhalingsproblemen, zwellingen in het gezicht en de nek (angio-oedeem) en pijn op de borst. Als u een van deze verschijnselen opmerkt, stop dan onmiddellijk met Ibuprofen EG Rapidcaps en neem direct contact op met uw arts of met de spoedeisende hulp.

Ernstige huidreacties

Ernstige huidreacties waaronder exfoliatieve dermatitis, erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndroom, toxische epidermale necrolyse, geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen (DRESS), acuut gegeneraliseerd pustuleus exantheem (AGEP) zijn gemeld in verband met een behandeling met ibuprofen. Stop met het gebruik van Ibuprofen EG Rapidcaps en zoek onmiddellijk medische hulp als u één of meerdere klachten krijgt met betrekking tot deze ernstige huidreacties zoals beschreven in rubriek 4.

Door ontstekingsremmers en pijnstillers, zoals ibuprofen, is het risico op het krijgen van een hartaanval of beroerte iets groter. Dit is vooral zo als deze geneesmiddelen in een hoge dosering worden gebruikt. Neem niet meer in dan geadviseerd. Gebruik het geneesmiddel ook niet langer dan geadviseerd.

Besprek uw behandeling met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt, als u:

- hartproblemen heeft, zoals hartfalen, een pijnlijk en drukkend gevoel op de borst (angina pectoris), of als u een hartaanval, bypass-operatie, of te weinig bloed in de benen of voeten heeft gehad door te smalle of verstopte slagaderen (perifeer arterieel vaatlijden), of als u een soort beroerte heeft gehad (zoals een lichte beroerte of een transiënte ischemische aanval (TIA)).
- hoge bloeddruk, suikerziekte (diabetes) of te veel cholesterol in uw bloed heeft. Of als mensen in uw familie hartziekten of beroertes hebben of hebben gehad. Of als u rookt.

Gebruik de laagst mogelijke dosis voor de kortst mogelijke tijd die nodig is om de klachten minder te maken. Dan is de kans op bijwerkingen het kleinst. Ouderen hebben een grotere kans op bijwerkingen.

Geldt een van de situaties die hierboven staan voor u? Neem dan contact op met een arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Ibuprofen EG Rapidcaps nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Andere geneesmiddelen kunnen dit geneesmiddel anders laten werken. Dit geneesmiddel kan andere geneesmiddelen ook anders laten werken. De invloed die geneesmiddelen op elkaar hebben noemen we ‘wisselwerking’. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij:

- bloedverdunders (bijvoorbeeld acetylsalicylzuur, warfarine, ticlopidine);
- geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-remmers zoals captopril, bètablokkers, zoals middelen waar atenolol in zit en angiotensine II-antagonisten, zoals losartan).

Andere geneesmiddelen kunnen ook een wisselwerking met ibuprofen hebben. Neem daarom altijd contact op met uw arts of apotheker, voordat u Ibuprofen EG Rapidcaps samen met andere geneesmiddelen gebruikt.

Doe dat vooral als u de volgende geneesmiddelen gebruikt:

Andere NSAID's (ontstekingsremmers of pijnstillers), zoals cyclo-oxygenase-2-selectieve remmers	Kunnen het risico op zweren of bloedingen van het maagdarmkanaal groter maken.
Digoxine (als uw hart minder goed werkt)	De werking van digoxine kan sterker worden.
Glucocorticosteroiden (geneesmiddelen die ontstekingen en allergische reacties minder erg maken waar cortison in zit. Of waar stoffen in zitten die op cortison lijken)	Kunnen het risico op zweren of bloedingen van het maagdarmkanaal groter maken.
Bloedverduunners (geneesmiddelen die zorgen dat er geen klonten in uw bloed komen)	Kunnen het risico op zweren of bloedingen van het maagdarmkanaal groter maken.
Fenytoïne (voor epilepsie)	De werking van fenytoïne kan sterker worden.
Selectieve serotonineheropnameremmers (geneesmiddelen voor depressie)	Kunnen de kans op bloedingen groter maken.
Lithium (een geneesmiddel tegen depressie en tegen een ziekte waarbij u heel somber bent. En soms bent u heel blij, druk, doet u dingen zonder na te denken of denkt u dat u alles kunt (manische depressiviteit)	De werking van lithium kan sterker worden.
Probenecide en sulfinpyrazon (geneesmiddelen voor een ontsteking in een gewricht, met pijn (jicht))	Het is mogelijk dat uw lichaam ibuprofen minder snel afbreekt.
Kaliumsparende diuretica (plasmiddelen. U plast meer door deze geneesmiddelen)	Kunnen zorgen voor te veel kalium in het bloed.
Methotrexaat (een geneesmiddel voor kanker of reuma)	De werking van methotrexaat kan sterker worden.
Tacrolimus en cyclosporine (geneesmiddelen die de afweer van uw lichaam (immuunsysteem) minder hard laten werken)	Dit kan schadelijk zijn voor uw nieren.
Zidovudine (een geneesmiddel voor de behandeling van hiv/aids)	Het gebruik van ibuprofen kan zorgen voor een grotere kans op een bloeding in een gewricht of een bloeding met zwelling. Dit geldt voor patiënten die besmet zijn met hiv en een ziekte hebben waarbij bloed minder goed stolt (hemofilie).
Sulfonylureumderivaten (geneesmiddelen bij suikerziekte (diabetes))	Een wisselwerking met Ibuprofen EG Rapidcaps kan optreden.
Quinolone antibiotica (geneesmiddelen tegen ontstekingen door een bacterie)	Kunnen het risico op een epileptische aanval (convulsie) groter maken.
Mifepriston (gebruikt om een zwangerschap te stoppen)	De werking van mifepriston kan minder sterk worden.
Acetylsalicylzuur (aspirine) in een lage dosering	Acetylsalicylzuur kan bloed minder goed verdunnen.
Bloedverduunners (bijvoorbeeld warfarine)	De werking van deze geneesmiddelen kan sterker worden.
Voriconazol en fluconazol (geneesmiddelen die het CYP2C9-enzym remmen) voor schimmelinfecties	De werking van Ibuprofen EG Rapidcaps kan sterker worden. Er moet worden nagedacht over het lager maken van de dosis Ibuprofen EG

	Rapidcaps. Dit moet vooral als het wordt gebruikt in hoge dosering en samen met voriconazol en fluconazol.
--	--

Waarop moet u letten met alcohol?

Drink geen alcohol terwijl u dit geneesmiddel gebruikt. Sommige bijwerkingen komen vaker voor als u alcohol samen met ibuprofen gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn bijwerkingen op het maagdarmstelsel of het zenuwstelsel.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Vertel het uw arts als u zwanger wordt tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.

Gebruik dit geneesmiddel niet in de laatste drie maanden van de zwangerschap; dit kan uw ongeboren kind schade toebrengen of problemen bij de bevalling veroorzaken. Uw ongeboren kind kan last krijgen van nier- en hartproblemen. Het middel kan van invloed zijn op de vatbaarheid van u en uw baby voor bloedingen en ertoe leiden dat de bevalling later plaatsvindt of langer duurt dan verwacht. Gebruik dit geneesmiddel niet tijdens de eerste zes maanden van de zwangerschap, tenzij dit absoluut noodzakelijk is en uw arts dit aanbeveelt. Als u in deze periode of terwijl u zwanger probeert te worden moet worden behandeld, dient de laagste dosis te worden gebruikt en moet de behandeling zo kort mogelijk worden gehouden. Vanaf week 20 van de zwangerschap kan ibuprofen – als het langer dan een paar dagen wordt gebruikt – ertoe leiden dat uw ongeboren kind nierproblemen krijgt, wat tot gevolg kan hebben dat het kind te weinig vruchtwater rond zich heeft (oligohydramnion) of vernauwing van een bloedvat in het hart van uw baby (ductus arteriosus). Als u langer dan enkele dagen moet worden behandeld, kan uw arts aanvullende controles aanbevelen.

Borstvoeding

Er komt maar een klein beetje van dit geneesmiddel in de moedermelk. Hetzelfde geldt voor de stoffen (metaboliëten) die ontstaan als dit geneesmiddel wordt afgebroken door uw lichaam. Gebruikt u dit geneesmiddel voor een korte tijd in de dosering die wordt geadviseerd? Dan kunt u dit geneesmiddel gebruiken in de periode dat u borstvoeding geeft.

Vruchtbaarheid

Ibuprofen hoort bij een groep geneesmiddelen die de vruchtbaarheid bij de vrouw minder kunnen maken. Deze bijwerking gaat over als u stopt met het gebruik van dit geneesmiddel.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Ibuprofen heeft over het algemeen geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Echter, omdat bij hogere doseringen bijwerkingen van het centrale zenuwstelsel zoals vermoeidheid en duizeligheid kunnen optreden, kan het vermogen om te rijden of machines te bedienen in individuele gevallen worden aangetast. Deze patiënten dienen het rijden en het gebruik van machines te vermijden. Dit geldt in sterkere mate in combinatie met alcohol.

Ibuprofen EG Rapidcaps bevat sorbitol

Dit geneesmiddel bevat 72 mg sorbitol per zachte capsule. Sorbitol is een bron van fructose. Als uw arts u heeft meegedeeld dat u (of uw kind) bepaalde suikers niet verdraagt of als bij u erfelijke fructose-intolerantie is vastgesteld (een zeldzame erfelijke ziekte waarbij een persoon fructose niet kan afbreken), neem dan contact op met uw arts voordat u (of uw kind) dit geneesmiddel toegediend krijgt.

3. Hoe neemt u Ibuprofen EG Rapidcaps in?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals in deze bijsluiter staat of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Gebruik de dosering zoals hieronder staat, behalve als uw arts u iets anders heeft verteld.

Dosering

Volwassenen en jongeren die meer dan 40 kilogram (kg) wegen (12 jaar en ouder)

Neem 1 capsule (400 mg ibuprofen) als begin dosis. Daarna mag u elke 6 uur 1 capsule (400 mg ibuprofen) nemen als dat nodig is. Neem niet meer dan 3 capsules (1200 mg ibuprofen) per 24 uur.

Kinderen jonger dan 12 jaar en jongeren die minder dan 40 kilogram (kg) wegen

Dit geneesmiddel is niet bedoeld voor gebruik bij jongeren die minder wegen dan 40 kg, of bij kinderen die jonger zijn dan 12 jaar.

Wijze van innemen

Voor gebruik via de mond (oraal). Slik dit geneesmiddel door met een glas water. Niet kauwen.

Voor patiënten met een gevoelige maag is het advies om dit geneesmiddel in te nemen tijdens het eten. Als dit geneesmiddel net na het eten wordt ingenomen kan het langer duren voordat het werkt. Gebeurt dit? Neem dan niet meer van Ibuprofen EG Rapidcaps dan de geadviseerde dosis, zoals in deze rubriek staat. Als u de geadviseerde dosis al heeft ingenomen moet u wachten tot het tijd is voor de volgende dosis.

Duur van gebruik

Dit geneesmiddel is alleen bedoeld om voor een korte tijd te gebruiken. Gebruik de laagst mogelijke dosis voor de kortst mogelijke tijd die nodig is om de klachten minder te maken. Heeft u een ontsteking? Neem dan direct contact op met een arts als de klachten (zoals koorts en pijn) niet minder worden of erger worden (zie rubriek 2).

Jongeren van 12 tot 18 jaar

Moet dit geneesmiddel bij jongeren langer dan 3 dagen worden gebruikt? Of worden de klachten erger? Neem dan contact op met een arts.

Volwassenen

Moet dit geneesmiddel langer dan 3 dagen voor de behandeling van koorts worden gebruikt? Of moet dit geneesmiddel langer dan 4 dagen voor de behandeling van pijn worden gebruikt? Of worden de klachten erger? Neem dan contact op met uw arts.

Neem contact op met uw arts of apotheker, als u het gevoel heeft dat de werking van dit geneesmiddel te sterk of niet sterk genoeg is.

Heeft u te veel van dit geneesmiddel ingenomen?

Heeft u meer van dit geneesmiddel ingenomen dan geadviseerd? Of hebben kinderen dit geneesmiddel per ongeluk ingenomen? Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).. Daar wordt gekeken hoe erg het is en krijgt u advies over wat u moet doen. Klachten van een overdosis kunnen zijn: misselijk zijn, overgeven (er kan bloed bij zitten), bloed in uw poep (bloed in het maagdarmkanaal), oorsuizen, hoofdpijn, maagpijn, diarree en trillende bewegingen van de ogen. Bij hoge doseringen zijn de volgende klachten gemeld: zwakte en duizelig zijn, slaperig zijn, in de war zijn, of u bent in de war, u weet niet hoe laat het is, u weet niet waar u bent en u herkent mensen niet meer goed (desoriëntatie), verlies van bewustzijn, het koud hebben, pijn op de borst, hartkloppingen, epileptische aanval (convulsie - vooral bij kinderen), bloed in uw plas (urine), lage kaliumspiegels in uw bloed en problemen met ademen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Gebruik de laagst mogelijke dosis voor de kortst mogelijke tijd die nodig is om klachten minder te maken. Zo houdt u de kans op bijwerkingen zo klein mogelijk. Het is mogelijk dat u een bijwerking krijgt die bekend is bij het gebruik van 'niet-steroïdale ontstekingsremmers' (NSAID's) (zie onder). Krijgt u last van een van deze bijwerkingen? Stop dan met het gebruik van dit geneesmiddel en neem direct contact op met uw arts. Ouderen die dit geneesmiddel gebruiken hebben een grotere kans om problemen te krijgen door bijwerkingen.

STOP MET HET GEBRUIK van dit geneesmiddel en zoek onmiddellijk medische hulp als u een of meerdere van de volgende symptomen opmerkt:

- **klachten van bloeding in de maag en/of darmen**, zoals: erge pijn in de bovenbuik, zwarte poep die op teer lijkt, overgeven van bloed of donkere stukjes die eruit zien als gemalen koffie.
- **klachten van heel zeldzame maar erge allergische reacties**, zoals het erger worden van astma, piepende ademhaling zonder dat u weet waarom of benauwd zijn, zwelling van gezicht, tong of keel, moeite met ademen, hartkloppingen, daling van de bloeddruk waardoor u in shock kunt raken (dit kan dodelijk zijn). Deze klachten kunnen al bij het eerste gebruik van dit geneesmiddel optreden.
- roodachtige, niet-verhoogde, ronde vlekken (in de vorm van een schietschijf) op de romp, vaak met centrale blaren, huidafschilfering, zweren in mond, keel, neus, geslachtsdelen en ogen. Deze ernstige vormen van huiduitslag kunnen vooraf worden gegaan door koorts en griepachtige symptomen (exfoliatieve dermatitis, erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndroom, toxische epidermale necrolyse) (zeer zelden - kan tot 1 op 10.000 mensen treffen).
- wijdverspreide huiduitslag, hoge lichaamstemperatuur, vergrote lymfeklieren en een toename van eosinofielen (een type witte bloedcellen) (DRESS-syndroom) (niet bekend - kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).
- Een rode, schilferige, wijdverspreide huiduitslag met bultjes onder de huid en blaasjes, voornamelijk gelokaliseerd op de huidplooiën, romp en bovenste ledematen, gepaard met koorts. De klachten doen zich gewoonlijk voor aan het begin van de behandeling (acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose) (niet bekend - kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).
- pijn op de borst, wat een teken kan zijn van een mogelijke serieuze allergische reactie genaamd het Kounis-syndroom (niet bekend - kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Neem contact op met uw arts als u een van de volgende bijwerkingen krijgt. Doe dit ook als de bijwerkingen erger worden of als u een bijwerking krijgt die niet in deze bijsluiter staat.

Vaak (kan tot 1 op 10 mensen treffen)

- klachten van het maag-darmkanaal, zoals maagzuurbranden, buikpijn, misselijk zijn, het verteren van eten in uw lichaam gaat niet goed (indigestie), overgeven, veel scheten laten (flatulentie), diarree, verstopping (obstipatie) en u verliest een beetje bloed in de maag en/of darmen, waardoor u in zeldzame gevallen bloedarmoede kunt krijgen.

Soms (kan tot 1 op 100 mensen treffen)

- maagzweren of darmzweren, soms met bloedingen en gaten in de wand van de maag of darmen, ontsteking van het slijmvlies van de mond met het ontstaan van zweren (ulceratieve stomatitis), ontsteking van de maag (gastritis), ontsteking van de dikke darm (colitis) die erger wordt en de ziekte van Crohn.
- problemen van het centraal zenuwstelsel zoals hoofdpijn, duizelig zijn, slecht slapen, onrustig zijn, prikkelbaar zijn of moe zijn.
- problemen met zien.
- allergische reacties, zoals huiduitslag, jeuk en aanvallen van astma. U moet direct stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel en contact opnemen met uw arts.
- verschillende vormen van huiduitslag.

Zelden (kan tot 1 op 1.000 mensen treffen)

- oorsuizen (tinnitus).
- nierschade (papillaire necrose) en te veel urinezuur in uw bloed.
- minder goed horen.
- te veel ureum in uw bloed. Ureum is een afvalstof van de lever en ontstaat bij het afbreken van eiwitten.
- te weinig hemoglobine in het bloed.

Zeer zelden (kan tot 1 op 10.000 mensen treffen)

- zwelling (oedeem), hoge bloeddruk (hypertensie) en hartfalen werden gemeld bij behandeling met 'niet-steroidale ontstekingsremmers' (NSAID's).
- ontsteking van de slokdarm of alvleesklier, de dunne darm en dikke darm worden smaller door een soort membraan (intestinale diafragma-achtige strictuurvorming).
- bij waterpokken (*Varicella*) zijn erge ontstekingen van de huid en zachte delen van het lichaam (weke delen) gezien.
- minder plassen dan normaal en zwelling (vooral als u een hoge bloeddruk heeft of als uw nieren minder goed werken): zwelling (oedeem) en plas (urine) die niet helder is (nefrotisch syndroom), ziekte of ontsteking van de nieren (interstitiële nefritis) waardoor het kan dat uw nieren opeens niet meer werken. Krijgt u een van de klachten die hierboven staan? Of voelt u zich in het algemeen niet goed? Stop dan met het gebruik van dit geneesmiddel en neem direct contact op met uw arts. Dit kunnen namelijk de eerste tekenen zijn van nierschade of nierfalen.
- uw lichaam heeft problemen met het maken van bloedcellen (eerste tekenen zijn koorts, zere keel, zweren op de mond, klachten die bij griep horen, heel moe zijn, neusbloeding of bloeding van huid. Bij deze tekenen moet u de behandeling direct stoppen en contact opnemen met een arts. U moet deze klachten niet behandelen met pijnstillers of geneesmiddelen tegen koorts.
- psychotische reacties en depressie.
- ontstekingen door een infectie (bijvoorbeeld necrotiserende fasciitis) die erger worden door sommige pijnstillers (NSAID's). Ziet u tekenen van een ontsteking of worden deze erger tijdens het gebruik van dit geneesmiddel? Ga dan direct naar een arts. De arts bepaalt of u behandeld moet worden met geneesmiddelen tegen infecties of geneesmiddelen tegen ontstekingen door een bacterie.
- hoge bloeddruk, hartkloppingen, hartfalen, hartaanval.
- uw lever werkt niet meer goed, leverschade, vooral bij een behandeling die lang duurt, leverfalen, plotselinge ontsteking van de lever (hepatitis).
- tekenen van een hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) met een stijve nek, hoofdpijn, misselijk zijn, overgeven, koorts of in de war zijn. Deze klachten zijn opgetreden bij gebruik van ibuprofen. Bij patiënten met ziekten waarbij het lichaam antistoffen tegen het eigen weefsel maakt (auto-immuunziekten, zoals systemische lupus erythematoses en gemengde bindweefselziekte) is de kans groter dat deze klachten optreden. Neem direct contact op met een arts als u hier last van krijgt.
- haaruitval (alopecia).
- erge, algemene overgevoelighedsreacties.
- erger worden van astma en bronchospasme (u bent benauwd door het samentrekken van spieren rondom uw luchtpijp).
- ontsteking van de bloedvaten (vasculitis).

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

- de huid wordt gevoelig voor licht (fotosensitiviteitsreactie).

Door het gebruik van ibuprofen, heeft u iets meer kans op een hartaanval (myocardinfarct) of beroerte.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via:

België: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - www.fagg.be - Afdeling Vigilantie : Website: www.eenbijwerkingmelden.be - E-mail: adr@fagg-afmps.be.

Luxemburg: Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy of Division de la Pharmacie et des Médicaments de la Direction de la Santé – website : www.guichet.lu/pharmacovigilance.
Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Ibuprofen EG Rapidcaps?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos of blisterverpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u geneesmiddelen op de juiste manier afvoert, worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in Ibuprofen EG Rapidcaps?

- De werkzame stof in dit geneesmiddel is ibuprofen. Elke zachte capsule bevat 400 mg ibuprofen.
- De andere stoffen in dit geneesmiddel zijn macrogol 600 (E1521), kaliumhydroxide (E525), gezuiverd water, gelatine (E441), vloeibare gedeeltelijk gedehydrateerde sorbitol (E420) (zie rubriek 2, “Ibuprofen EG Rapidcaps bevat sorbitol”).

Hoe ziet Ibuprofen EG Rapidcaps eruit en wat zit er in een verpakking?

Doorzichtige, ovale, zachte gelatine capsule (ongeveer 15,8 mm x 9,8 mm) met een heldere, kleurloze vloeistof.

Ibuprofen EG Rapidcaps is beschikbaar in doosjes van 10, 20 of 30 zachte capsules in blisterverpakking.

Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

EG (Eurogenerics) NV – Heizel Esplanade b22 – B-1020 Brussel

Fabrikant:

STADA Arzneimittel AG - Stadastrasse 2-18 - 61118 Bad Vilbel - Duitsland

Centrafarm Services B.V. - Van de Reijtstraat 31-E - 4814 NE Breda - Nederland

Clonmel Healthcare Ltd. - 3 Waterford Road, Clonmel - E91 D768 Co. Tipperary - Ierland

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de Europese Economische Ruimte onder de volgende namen:

NL	Ibuprofen Healthypharm liquid caps 400 mg, zachte capsules
BE	Ibuprofen EG Rapidcaps 400 mg zachte capsules
BG	Parabol Max
CZ	IBOVAL RAPID
DE	Ibudolor 400 mg Weichkapseln

EE	Ibuprofen STADA
ES	Ibuprofeno Stadapharm 400 mg cápsulas blandas
FR	IBUPROFENE EG LABO CONSEIL 400 mg, capsule molle
IE	Easofen Rapid Relief Max Strength 400 mg soft capsules
LU	Ibuprofen EG Rapidcaps 400 mg capsules molles
LT	Ibuprofen STADA 400 mg minkštosios kapsulės
LV	Ibuprofen STADA 400 mg mīkstās kapsulas
PL	Ibuprofen Modafen Caps
RO	Modafen Forte 400mg capsule moi
SI	Ibuprofen STADA 400 mg mehke kapsule

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE664747

Afleveringswijze: vrije aflevering

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 02/2026.