

## SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

### 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Cabazitaxel Eugia 10 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie.

### 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Eén ml concentraat voor oplossing voor infusie bevat 10 mg cabazitaxel.

Elke injectieflacon met 6 ml oplossing voor infusie bevat 60 mg cabazitaxel.

Cabazitaxel Eugia 10 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie bevat een overvulling. Deze overvulling verzekert dat er een extraheerbaar volume van 6 ml is dat 10 mg/ml cabazitaxel bevat.

#### Hulpstof met bekend effect:

Elke injectieflacon bevat 1188 mg watervrije ethanol en 1560 mg polysorbaat (E433) (zie rubriek 4.4).

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

### 3. FARMACEUTISCHE VORM

Concentraat voor oplossing voor infusie.

Heldere, kleurloze tot lichtgele oplossing.

### 4. KLINISCHE GEGEVENS

#### 4.1 Therapeutische indicaties

Cabazitaxel Eugia in combinatie met prednison of prednisolon is bestemd voor de behandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker die voorheen behandeld werden op basis van een docetaxel-behandelingsschema (zie rubriek 5.1).

#### 4.2 Dosering en wijze van toediening

Het gebruik van Cabazitaxel Eugia dient beperkt te worden tot ziekenhuisafdelingen die gespecialiseerd zijn in het toedienen van cytotoxica en het dient alleen te worden toegediend onder de supervisie van een arts die gekwalificeerd is voor de toepassing van chemotherapie bij kanker. De faciliteiten en de benodigdheden voor de behandeling van ernstige overgevoeligheidsreacties zoals hypotensie en bronchospasmen dienen beschikbaar te zijn (zie rubriek 4.4).

#### Premedicatie

Het aanbevolen premedicatieschema moet minstens 30 minuten vóór elke toediening met Cabazitaxel Eugia uitgevoerd worden met de volgende geneesmiddelen, intraveneus toegediend, om het risico op en de ernst van overgevoeligheid te verminderen:

- antihistaminicum (5 mg dexchlorfeniramine of 25 mg difenhydramine of equivalent antihistaminicum),
- corticosteroid (8 mg dexamethason of equivalent steroid), en
- H2 antagonist (zie rubriek 4.4).

Anti-emetische profylaxe wordt aanbevolen en kan indien nodig oraal of intraveneus toegediend worden.

Gedurende de gehele behandeling dient de vochtthuishouding van de patiënt nauwgezet gevolgd te worden, om complicaties zoals nierinsufficiëntie te voorkomen.

#### Dosering

De aanbevolen dosis Cabazitaxel Eugia is 25 mg/m<sup>2</sup> toegediend als een 1-uur-durende intraveneuze infusie om de 3 weken in combinatie met 10 mg oraal prednison of prednisolon per dag gedurende de gehele behandeling met Cabazitaxel Eugia.

#### Dosisaanpassingen

De dosis dient aangepast te worden als patiënten de volgende bijwerkingen vertonen (de graden verwijzen naar de CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Events) versie 4.0):

Tabel 1 - Aanbevolen dosisaanpassingen in geval van bijwerkingen bij patiënten behandeld met cabazitaxel

<b>Bijwerkingen</b>	<b>Dosisaanpassing</b>
Langdurige neutropenie ≥ graad 3 (langer dan 1 week) ondanks aangepaste medicatie waaronder G-CSF	Stel de behandeling uit tot het aantal neutrofielen >1,500 cellen/mm <sup>3</sup> bedraagt, verlaag daarna de dosis cabazitaxel van 25 mg/m <sup>2</sup> naar 20 mg/m <sup>2</sup> .
Febriele neutropenie of neutropenische infectie	Stel de behandeling uit tot verbetering of verdwijning en tot het aantal neutrofielen >1500 cellen/mm <sup>3</sup> bedraagt, verlaag daarna de dosis cabazitaxel van 25 mg/m <sup>2</sup> naar 20 mg/m <sup>2</sup> .
Diarree ≥ graad 3 of persistente diarree ondanks aangepaste medicatie, incl. vocht- en elektrolytensubstitutie	Stel de behandeling uit tot verbetering of verdwijning, verlaag daarna de dosis cabazitaxel van 25 mg/m <sup>2</sup> naar 20 mg/m <sup>2</sup> .
Perifere neuropathie ≥ graad 2	Stel de behandeling uit tot verbetering, verlaag daarna de dosis cabazitaxel van 25 mg/m <sup>2</sup> naar 20 mg/m <sup>2</sup> .

Indien patiënten deze bijwerking(en) blijven vertonen bij een dosis van 20 mg/m<sup>2</sup>, kan verdere dosisverlaging naar 15 mg/m<sup>2</sup> of het staken van de behandeling met Cabazitaxel Eugia worden overwogen. Patiëntengegevens over gebruik bij een dosis lager dan 20 mg/m<sup>2</sup> zijn beperkt.

#### Speciale patiëntengroepen

##### *Patiënten met leverfunctiestoornissen*

Cabazitaxel wordt uitgebreid gemetaboliseerd door de lever. Bij patiënten met een lichte vorm van leverfunctiestoornis (totale bilirubine >1 tot ≤ 1,5 x de bovengrens van het normale [upper limit of normal, ULN] of aspartaataminotransferase (ASAT) >1,5 x ULN) moet de dosis cabazitaxel worden verlaagd tot 20 mg/m<sup>2</sup>. De toediening van cabazitaxel aan patiënten met een lichte vorm van leverfunctiestoornis moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren en met een strikte controle van de veiligheid.

Bij patiënten met een matig ernstige vorm van leverfunctiestoornis (totale bilirubine >1,5 tot ≤ 3,0 x ULN) bedroeg de maximale verdraagbare dosis (maximum tolerated dose, MTD) 15mg/m<sup>2</sup>. Als de behandeling wordt overwogen bij patiënten met een matig ernstige vorm van leverfunctiestoornis, mag de dosis cabazitaxel niet meer dan 15 mg/m<sup>2</sup> bedragen. Er zijn echter beperkte gegevens beschikbaar over de doeltreffendheid van deze dosis.

Cabazitaxel mag niet worden toegediend aan patiënten met een ernstige vorm van leverfunctiestoornis (totale bilirubine ≥3 x ULN) (zie rubrieken 4.3, 4.4 en 5.2).

#### *Patiënten met nierfunctiestoornissen*

Cabazitaxel wordt in geringe mate uitgescheiden door de nieren. Er is geen dosisaanpassing nodig bij patiënten met nierfunctiestoornissen die geen hemodialyse nodig hebben. Patiënten met terminaal nierlijden (creatinineklaring CLCR < 15 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>), dienen, door hun toestand en de beperkte hoeveelheid beschikbare gegevens, met voorzichtigheid behandeld te worden en zorgvuldig opgevolgd tijdens de behandeling (zie rubrieken 4.4 en 5.2).

#### *Ouderen*

Er wordt geen specifieke dosisaanpassing aanbevolen voor het gebruik van cabazitaxel bij ouderen (zie ook de rubrieken 4.4, 4.8 en 5.2).

#### *Gelijktijdig gebruik met andere geneesmiddelen*

Gelijktijdig gebruik met geneesmiddelen die sterke inductoren of sterke remmers van CYP3A zijn, dient vermeden te worden. Indien gelijktijdige toediening van een sterke CYP3A-remmer echter nodig is, moet voor cabazitaxel een dosisvermindering van 25% overwogen worden (zie rubrieken 4.4 en 4.5).

#### *Pediatische patiënten*

Er is geen relevante toepassing van Cabazitaxel Eugia bij pediatische patiënten.

De veiligheid en de werkzaamheid van Cabazitaxel Eugia bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar zijn niet vastgesteld (zie rubriek 5.1).

#### Wijze van toediening

Cabazitaxel Eugia is voor intraveneus gebruik.

Voor instructies over bereiding en toediening van het geneesmiddel, zie rubriek 6.6.

Gebruik geen PVC infusiecontainers of polyurethaan infusiesets.

Cabazitaxel Eugia mag niet gemengd worden met andere geneesmiddelen dan die welke vermeld zijn in rubriek 6.6.

### **4.3 Contra-indicaties**

- Overgevoeligheid voor cabazitaxel, andere taxanen, polysorbaat 80 of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstof(fen).
- Aantal neutrofielen minder dan 1500 /mm<sup>3</sup>.
- Ernstige vorm van leverfunctiestoornis (totale bilirubine >3 x ULN).
- Gelijktijdige toediening van het gele koorts vaccin (zie rubriek 4.5).

### **4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik**

#### Overgevoeligheidsreacties

Alle patiënten dienen premedicatie te krijgen voordat de infusie met cabazitaxel wordt gestart (zie rubriek 4.2).

Patiënten dienen strikt geobserveerd te worden om eventuele overgevoeligheidsreacties op te sporen, in het bijzonder tijdens de eerste twee infusies. Overgevoeligheidsreacties kunnen binnen enkele minuten na het starten van de infusie met cabazitaxel optreden; daarom dienen de faciliteiten en de benodigdheden voor de behandeling van hypotensie en bronchospasmen beschikbaar te zijn. Ernstige reacties kunnen optreden en kunnen bestaan uit veralgemeende rash/erytheem, hypotensie en bronchospasmen. Ernstige overgevoeligheidsreacties vereisen onmiddellijke stopzetting van de behandeling met cabazitaxel en het instellen van een geschikte behandeling. Bij patiënten met overgevoeligheidsreacties dient de behandeling met cabazitaxel gestaakt te worden (zie rubriek 4.3).

#### Beenmergsuppressie

Beenmergsuppressie kan voorkomen, wat zich manifesteert als neutropenie, anemie, trombocytopenie of pancytopenie (zie "Risico op neutropenie" en "Anemie" in rubriek 4.4 hieronder).

### Risico op neutropenie

Patiënten die behandeld worden met cabazitaxel, mogen profylactisch G-CSF krijgen, volgens de richtlijnen van de American Society of Clinical Oncology (ASCO) en/of de huidige institutionele richtlijnen om het risico te verminderen of de complicaties van neutropenie te behandelen (febriële neutropenie, langdurige neutropenie of neutropene infectie). Primaire profylaxis met G-CSF moet overwogen worden bij patiënten met klinische kenmerken van hoog risico (leeftijd >65 jaar, slechte functionele index, vroegere episoden van febriële neutropenie, intensieve voorafgaande radiotherapie, slechte voedingstoestand, of andere ernstige comorbiditeiten) die hen vatbaar maken voor toegenomen complicaties als gevolg van langdurige neutropenie. Er is aangetoond dat het gebruik van G-CSF de incidentie en de ernst van neutropenie beperkt.

Neutropenie is de meest frequente bijwerking van cabazitaxel (zie rubriek 4.8). Het is noodzakelijk om het volledige bloedbeeld wekelijks te controleren tijdens cyclus 1 en daarna vóór elke behandelingscyclus om, indien nodig, de dosis te kunnen aanpassen.

Verlaag de dosis in geval van febriële neutropenie of langdurige neutropenie ondanks een geschikte behandeling (zie rubriek 4.2).

Herstart de behandeling alleen als het aantal neutrofielen hersteld is tot  $\geq 1500$  cellen/mm<sup>3</sup> (zie rubriek 4.3).

### Gastrointestinale aandoeningen

Symptomen zoals abdominale pijn en gevoeligheid, koorts, aanhoudende constipatie, diarree, met of zonder neutropenie, kunnen vroegtijdige tekens zijn van ernstige gastrointestinale toxiciteit en moeten onmiddellijk worden geëvalueerd en behandeld. De behandeling met cabazitaxel moet zo nodig worden uitgesteld of gestopt.

#### *Risico op misselijkheid, braken, diarree en dehydratatie*

Als de patiënten diarree krijgen na toediening van cabazitaxel, mogen ze behandeld worden met geneesmiddelen die gebruikt worden tegen diarree. Er dienen geschikte maatregelen genomen te worden om de patiënten te rehydrateren. Diarree kan vaker optreden bij patiënten die vroeger bestraling hebben gekregen in de abdomino-pelviene regio. Dehydratatie treedt vaker op bij patiënten van 65 jaar of ouder. Er dienen geschikte maatregelen genomen te worden om de patiënten te rehydrateren en om de serumspiegels van de elektrolyten, in het bijzonder kalium, op te volgen en te corrigeren. In geval van diarree  $\geq$  graad 3 kan het nodig zijn om de behandeling uit te stellen of de dosis te verlagen (zie rubriek 4.2). Als patiënten misselijk zijn of braken, mogen ze behandeld worden met de algemeen gebruikte anti-emetica.

#### *Risico op ernstige gastrointestinale reacties*

Gastrointestinale (GI) bloedingen en perforatie, ileus, colitis, inbegrepen met fatale afloop, werden gerapporteerd bij patiënten behandeld met cabazitaxel (zie rubriek 4.8). Voorzichtigheid is aangewezen bij de behandeling van patiënten met een hoog risico op gastrointestinale complicaties: patiënten met neutropenie, ouderen, patiënten die gelijktijdig NSAID's, antibloedplaatjetherapie of anticoagulantia gebruiken en patiënten met een voorgeschiedenis van bekkenradiotherapie of gastrointestinale ziekte zoals ulceraties en GI-bloedingen.

### Perifere neuropathie

Gevalen van perifere neuropathie, perifere sensorische neuropathie (bijv. paresthesie, dysesthesie) en perifere motorische neuropathie zijn gerapporteerd bij patiënten die cabazitaxel kregen. Patiënten die behandeld worden met cabazitaxel dienen hun arts te informeren voordat de behandeling wordt voortgezet als zij symptomen van neuropathie vertonen, zoals pijn, brandend gevoel, tintelingen, verlamd gevoel of een gevoel van zwakte ervaren. Artsen dienen vóór elke behandeling de aanwezigheid of verergering van neuropathie te beoordelen. De behandeling dient uitgesteld te worden totdat verbetering van de symptomen optreedt. De dosis cabazitaxel dient verlaagd te worden van 25 mg/m<sup>2</sup> naar 20 mg/m<sup>2</sup> voor persistente perifere neuropathie  $\geq$  graad 2 (zie rubriek 4.2).

### Anemie

Anemie werd waargenomen bij patiënten die cabazitaxel kregen (zie rubriek 4.8). Hemoglobine en

hematocriet moeten gecontroleerd worden vóór behandeling met cabazitaxel en indien patiënten klachten of symptomen vertonen van anemie of bloedverlies. Voorzichtigheid is aanbevolen bij patiënten met een hemoglobinegehalte <10 g/dl en er dienen geschikte maatregelen genomen te worden zoals klinisch aangewezen.

#### Risico op nierinsufficiëntie

Nierstoornissen werden gerapporteerd in associatie met sepsis, ernstige dehydratatie als gevolg van diarree, braken en obstructieve uropathie. Nierinsufficiëntie, waaronder gevallen met fatale afloop, zijn waargenomen. Als dit gebeurt, dienen geschikte maatregelen genomen te worden om de oorzaak te identificeren en de patiënten intensief te behandelen.

Gedurende de gehele behandeling met cabazitaxel dient de vochthuishouding in de gaten te worden gehouden. Patiënten dienen het advies te krijgen om elke significante verandering in het dagelijks urinevolume onmiddellijk te melden. Het serum creatinine dient in het begin gemeten te worden, bij elke bloedtelling en telkens als de persoon een verandering in zijn urinedebiet rapporteert. De behandeling met cabazitaxel dient gestaakt te worden in geval van elke achteruitgang van de nierfunctie naar nierinsufficiëntie  $\geq$  graad 3 volgens CTCAE versie 4.0.

#### Ademhalingsstelselaandoeningen

Interstitiële pneumonie/ pneumonitis en interstitiële longziekte zijn gemeld, mogelijk met fatale afloop (zie rubriek 4.8).

Indien zich nieuwe longsymptomen voordoen of indien bestaande longsymptomen verergeren, dienen patiënten nauwkeurig te worden opgevolgd, direct onderzocht te worden en op de aangewezen manier te worden behandeld. Het is aanbevolen om de behandeling met cabazitaxel te onderbreken totdat een diagnose beschikbaar is. Vroegtijdig gebruik van ondersteunende verzorgingsmaatregelen kan helpen om de aandoening te verbeteren. Het voordeel van het afmaken van de behandeling met cabazitaxel dient nauwkeurig te worden geëvalueerd.

#### Risico op hartaritmieën

Hartaritmieën zijn gemeld; tachycardie en atriumfibrilleren zijn vaak gemeld (zie rubriek 4.8).

#### Ouderen

Ouderen ( $\geq$ 65 jaar) kunnen sneller bepaalde bijwerkingen vertonen waaronder neutropenie en febrile neutropenie (zie rubriek 4.8).

#### Patiënten met leverfunctiestoornissen

De behandeling met cabazitaxel is gecontra-indiceerd bij patiënten met een ernstige vorm van leverfunctiestoornis (totale bilirubine  $> 3 \times$  ULN) (zie rubrieken 4.3 en 5.2).

De dosis moet worden verlaagd bij patiënten met een lichte vorm (totale bilirubine  $>1$  tot  $\leq 1,5 \times$  ULN of ASAT  $>1,5 \times$  ULN) van leverfunctiestoornis (zie rubrieken 4.2 en 5.2).

#### Interacties

Gelijktijdige toediening met sterke CYP3A-remmers dient vermeden te worden, aangezien deze de plasmaconcentraties van cabazitaxel kunnen verhogen (zie rubrieken 4.2 en 4.5). Indien gelijktijdige toediening met een sterke CYP3A-remmer niet vermeden kan worden, moet nauwlettende controle op toxiciteit en een dosisvermindering van cabazitaxel worden overwogen (zie rubrieken 4.2 en 4.5).

Gelijktijdige toediening met sterke CYP3A-inductoren dient vermeden te worden, aangezien deze de plasmaconcentraties van cabazitaxel kunnen verlagen (zie rubrieken 4.2 en 4.5).

#### Hulpstoffen

Dit geneesmiddel bevat 1188 mg alcohol (ethanol) per injectieflacon. De hoeveelheid van 6 ml in dit geneesmiddel is equivalent aan 30 ml bier of 14,2 ml wijn. De kleine hoeveelheid alcohol in dit geneesmiddel heeft geen merkbare effecten. Er moeten echter speciale voorzorgsmaatregelen worden genomen bij risicogroepen, zoals patiënten met een leveraandoening, epilepsie en patiënten met een voorgeschiedenis van alcoholisme.

### Polysorbaat 80 (E433)

Dit geneesmiddel bevat 1560 mg polysorbaat 80 in elke injectieflacon, wat overeenkomt met 0,26 g/ml. Polysorbaten kunnen allergische reacties veroorzaken. Polysorbaten kunnen cardiovasculaire effecten hebben (hypotensie/cardiale depressie). Om het risico op cardiovasculaire effecten te minimaliseren, moet worden overwogen om de infusiesnelheid te verlagen.

Het potentieel van polysorbaat voor QT-verlenging en torsades de pointes moet in overweging worden genomen bij gelijktijdig gebruik met geneesmiddelen die het QT/QTc-interval verlengen of bij patiënten met een congenitaal syndroom.

### Anticonceptieve maatregelen

Mannen moeten tijdens de behandeling en tot 4 maanden na het einde van de behandeling met cabazitaxel anticonceptieve maatregelen nemen (zie rubriek 4.6).

## **4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie**

*In vitro* studies hebben aangetoond dat cabazitaxel voornamelijk wordt gemetaboliseerd door CYP3A (80% tot 90%) (zie rubriek 5.2).

### CYP3A-remmers

Herhaalde toediening van ketoconazol (400 mg eenmaal daags), een sterke CYP3A-remmer, veroorzaakte een afname van de cabazitaxelklaring met 20%, wat overeenkwam met een toename in de AUC van 25%. Daarom dient gelijktijdige toediening van sterke CYP3A-remmers (bijv. ketoconazol, itraconazol, clarithromycine, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telithromycine, voriconazol) vermeden te worden aangezien er een verhoging van de plasmaconcentraties van cabazitaxel kan optreden (zie rubrieken 4.2 en 4.4).

Gelijktijdige toediening van aprepitant, een matige CYP3A-remmer, had geen effect op de cabazitaxelklaring.

### CYP3A-inductoren

Herhaalde toediening van rifampine (600 mg eenmaal daags), een sterke CYP3A-inductor, veroorzaakte een toename van de cabazitaxelklaring met 21%, wat overeenkwam met een afname in de AUC van 17%. Daarom dient gelijktijdige toediening van sterke CYP3A-inductoren (bijv. fenytoïne, carbamazepine, rifampine, rifabutine, rifapentine, fenobarbital) vermeden te worden aangezien er een afname van de plasmaconcentraties van cabazitaxel kan optreden (zie rubrieken 4.2 en 4.4). Bovendien dienen patiënten geen Sint-janskruid te gebruiken.

### OATP1B1

*In vitro* studies hebben aangetoond dat cabazitaxel tevens de transportproteïnen van de Organic Anion Transport Polypeptides OATP1B1 inhibeert. Het risico op interacties met OATP1B1-substraten (vb. statines, valsartan, repaglinide) bestaat, met name tijdens de duur van de infusie (1 uur) en tot maximaal 20 minuten na het einde van de infusie. Een interval van 12 uur is aanbevolen vóór de infusie en van minstens 3 uur na het einde van de infusie voordat OATP1B1-substraten worden toegediend.

### Vaccinaties

Toediening van levende of levend verzwakte vaccins aan patiënten die immunodepressief zijn door chemotherapeutica kan leiden tot ernstige of fatale infecties. Vaccinatie met een levend verzwakt vaccin dient vermeden te worden bij patiënten die cabazitaxel krijgen. Gedode of geïnactiveerde vaccins mogen toegediend worden; de respons op dergelijke vaccins kan echter verminderd zijn.

## **4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding**

### Anticonceptieve maatregelen

Wegens het genotoxisch risico van cabazitaxel (zie rubriek 5.3) moeten mannen tijdens de behandeling en tot vier maanden na het einde van de behandeling met cabazitaxel een effectieve anticonceptiemethode gebruiken.

#### Zwangerschap

Er bestaan geen gegevens over het gebruik van cabazitaxel bij zwangere vrouwen. Uit dieronderzoek is reproductietoxiciteit gebleken in dosissen die toxisch zijn voor de moeder (zie rubriek 5.3) en er is aangetoond dat cabazitaxel de placenta passeert (zie rubriek 5.3). Zoals bij andere cytotoxische geneesmiddelen, kan cabazitaxel schade aan de foetus toebrengen wanneer het wordt toegediend aan zwangere vrouwen.

Cabazitaxel is niet geïndiceerd voor gebruik bij vrouwen.

#### Borstvoeding

Uit beschikbare farmacodynamische gegevens bij dieren blijkt dat cabazitaxel en zijn metabolieten in de melk worden uitgescheiden (zie rubriek 5.3).

#### Vruchtbaarheid

Dierstudies hebben aangetoond dat cabazitaxel invloed heeft op het reproductiesysteem bij mannetjesratten en reuen, maar er werd geen functionele invloed op de vruchtbaarheid waargenomen (zie rubriek 5.3). Echter, rekening houdend met de farmacologische activiteit van taxanen, hun genotoxisch vermogen door een aneugenisch mechanisme en het effect van verschillende stoffen van deze klasse op de vruchtbaarheid in dierstudies, kan een effect op de vruchtbaarheid bij de man niet uitgesloten worden.

Mannen die behandeld worden met cabazitaxel, worden geadviseerd om advies in te winnen over het conserveren van sperma vóór de behandeling.

### **4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen**

Cabazitaxel heeft matige invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen, beïnvloeden aangezien het vermoeidheid en duizeligheid kan veroorzaken. Patiënten dienen het advies te krijgen om geen voertuig te besturen of machines te bedienen als ze last hebben van deze bijwerkingen tijdens de behandeling.

### **4.8 Bijwerkingen**

#### Samenvatting van het veiligheidsprofiel

De veiligheid van cabazitaxel in combinatie met prednison of prednisolon is geëvalueerd in 3 gerandomiseerde, gecontroleerde open-labelonderzoeken (TROPIC, PROSELICA en CARD), met in totaal 1092 patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker die behandeld werden met 25 mg/m<sup>2</sup> cabazitaxel eenmaal om de 3 weken. De patiënten kregen een mediaan aantal van 6 tot 7 cycli met cabazitaxel.

De incidenties van de gepoolde analyse van deze 3 onderzoeken worden hieronder en in de tabellijst weergegeven.

De meest voorkomende bijwerkingen van alle graden waren anemie (99,0%), leukopenie (93,0%), neutropenie (87,9%), trombocytopenie (41,1%), diarree (42,1%), vermoeidheid (25,0%) en asthenie (15,4%). De meest voorkomende bijwerkingen van graad  $\geq 3$  die optraden bij ten minste 5% van de patiënten waren neutropenie (73,1%), leukopenie (59,5%), anemie (12,0%), febrile neutropenie (8,0%) en diarree (4,7%).

In de 3 onderzoeken trad stopzetting van de behandeling vanwege bijwerkingen met vergelijkbare frequenties op (18,3% in TROPIC, 19,5% in PROSELICA en 19,8% in CARD) bij patiënten die cabazitaxel kregen. De meest frequente bijwerkingen ( $> 1,0\%$ ) die leidden tot stopzetting van cabazitaxel waren hematurie, vermoeidheid en neutropenie.

### Tabel van de bijwerkingen

De bijwerkingen zijn vermeld in tabel 2 volgens de MedDRA systeem/orgaanklassen en frequentie categorieën. Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst. De intensiteit van de bijwerkingen is geklasseerd volgens de CTCAE versie 4.0 (graad  $\geq 3 = G \geq 3$ ). De frequenties zijn gebaseerd op alle graden en worden gedefinieerd als: zeer vaak ( $\geq 1/10$ ), vaak ( $\geq 1/100$  tot  $< 1/10$ ), soms ( $\geq 1/1000$  tot  $< 1/100$ ), zelden ( $\geq 1/10.000$  tot  $< 1/1000$ ), zeer zelden ( $< 1/10.000$ ), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Tabel 2: Gerapporteerde bijwerkingen en hematologische afwijkingen met cabazitaxel in combinatie met prednison of prednisolon in de gepoolde analyse (n=1092)

MedDRA systeem/ orgaanklasse	Bijwerking	Alle graden n (%)			Graad >3 n (%)
		Zeer vaak	Vaak	Soms	
Infecties en parasitaire aandoeninge n	Neutropene infectie /sepsis*		48 (4.4)		42 (3.8)
	Septische shock			10 (0.9)	10 (0.9)
	Sepsis		13 (1.2)		13 (1.2)
	Cellulitis			8 (0.7)	3 (0.3)
	Urineweginfectie		103 (9.4)		19 (1.7)
	Influenza		22 (2.0)		0
	Cystitis		22 (2.0)		2 (0.2)
	Bovenste luchtweginfectie		23 (2.1)		0
	Herpes zoster		14 (1.3)		0
	Candidiasis		11 (1.0)		1 (<0.1)
Bloed- en lymfestelsela aandoeningen	Neutropenie <sup>a*</sup>	950 (87.9)			790 (73.1)
	Anemie <sup>a</sup>	1073 (99.0)			130 (12.0)
	Leukopenie <sup>a</sup>	1008 (93.0)			645 (59.5)
	Thrombocytopenie <sup>a</sup>	478 (44.1)			44 (4.1)
	Febriele neutropenie		87 (8.0)		87 (8.0)
Immuunsysteem aandoeningen	Hypersensitiviteit			7 (0.6)	0
Voedings- en stofwisselingsst oornissen	Verminderde eetlust	192 (17.6)			11 (1.0)
	Dehydratie		27 (2.5)		11 (1.0)
	Hyperglykemie		11 (1.0)		7 (0.6)
	Hypokaliëmie			8 (0.7)	2 (0.2)
Psychische stoornissen	Slapeloosheid (insomnia)		45 (4.1)		0
	Angst		13 (1.2)		0
	Verwardheid		12 (1.1)		2 (0.2)
Zenuwstelselaan doeningen	Dysgeusie		64 (5.9)		0
	Smaakstoornis		56 (5.1)		0
	Perifere neuropathie		40 (3.7)		2 (0.2)
	Perifere sensorische neuropathie		89 (8.2)		6 (0.5)
	Polyneuropathie			9 (0.8)	2 (0.2)
	Duizeligheid		63 (5.8)		0
	Hoofdpijn		56 (5.1)		1 (<0.1)
	Paresthesie		46 (4.2)		0
	Lethargy		15 (1.4)		1 (<0.1)

MedDRA systeem/ orgaanklasse	Bijwerking	Alle graden n (%)			Graad >3 n (%)
		Zeer vaak	Vaak	Soms	
	Hypo-esthesie		18 (1.6)		1 (<0.1)
	Sciatica			9 (0.8)	1 (<0.1)
Oogaandoening en	Conjunctivitis		11 (1.0)		0
	Toegenomen traanafscheiding		22 (2.0)		0
Evenwichtsorga an- en ooraandoeninge n	Tinnitus			7 (0.6)	0
	Vertigo		15 (1.4)		1 (<0.1)
Hartaandoening en*	Atriumfibrilleren		14 (1.3)		5 (0.5)
	Tachycardie		11 (1.0)		1 (<0.1)
Bloedvataandoe ningen	Hypotensie		38 (3.5)		5 (0.5)
	Diepe veneuze trombose		12 (1.1)		9 (0.8)
	Hypertensie		29 (2.7)		12 (1.1)
	Orthostatische hypotensie			6 (0.5)	1 (<0.1)
	Opvliegers		23 (2.1)		1 (<0.1)
	Blozen			9 (0.8)	0
Ademhalingsstel sel-, borstkas- en mediastinumaan doeningen	Dyspneu		97 (8.9)		9 (0.8)
	Hoesten		79 (7.2)		0
	Orofaryngeale pijn		26 (2.4)		1 (<0.1)
	Pneumonie		26 (2.4)		16 (1.5)
	Longembolie		30 (2.7)		23 (2.1)
Maagdarmsstels laandoeningen	Diarree	460 (42.1)			51 (4.7)
	Nausea	347 (31.8)			14 (1.3)
	Misselijkheid	207 (19.0)			14 (1.3)
	Braken	202 (18.5)			8 (0.7)
	Buikpijn		105 (9.6)		15 (1.4)
	Dyspepsie		53 (4.9)		0
	Buikpijn (bovenin)		46 (4.2)		1 (<0.1)
	Hemorroiden		22 (2.0)		0
	Gastro-oesofageale refluxziekte		26 (2.4)		1 (<0.1)
	Rectale hemorrhagie		14 (1.3)		4 (0.4)
	Droge mond		19 (1.7)		2 (0.2)
	Opgezette buik		14 (1.3)		1 (<0.1)
	Stomatitis		46 (4.2)		2 (0.2)
	Ileus*			7 (0.6)	5 (0.5)
	Gastritis			10 (0.9)	
	Colitis*			10 (0.9)	5 (0.5)
	Gastrointestinale perforatie			3 (0.3)	1 (<0.1)
	Gastrointestinale bloeding			2 (0.2)	1 (<0.1)
Huid- en onderhuidaandoe ningen	Alopecia		80 (7.3)		0
	Droge huid		23 (2.1)		0
	Erytheem			8 (0.7)	0
	Nagelafwijking		18 (1.6)		0

MedDRA systeem/ orgaanklasse	Bijwerking	Alle graden n (%)			Graad >3 n (%)
		Zeer vaak	Vaak	Soms	
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen	Rugpijn	166 (15.2)			24 (2.2)
	Artralgie		88 (8.1)		9 (0.8)
	Pijn in de extremiteiten		76 (7.0)		9 (0.8)
	Spierspasmen		51 (4.7)		0
	Myalgie		40 (3.7)		2 (0.2)
	Musculoskeletale borstpijn		34 (3.1)		3 (0.3)
	Spierzwakte		31 (2.8)		1 (0.2)
	Pijn in de flanken		17 (1.6)		5 (0.5)
Nier- en urine-wegaandoeningen	Acute nierinsufficiëntie		21 (1.9)		14 (1.3)
	Nierinsufficiëntie			8 (0.7)	6 (0.5)
	Dysurie		52 (4.8)		0
	Nierkoliek		14 (1.3)		2 (0.2)
	Hematurie	205 (18.8)			33 (3.0)
	Pollakisurie		26 (2.4)		2 (0.2)
	Hydronefrose		25 (2.3)		13 (1.2)
	Urine retentie		36 (3.3)		4 (0.4)
	Urine incontinentie		22 (2.0)		0
Ureterobstructie			8 (0.7)	6 (0.5)	
Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen	Bekkenpijn		20 (1.8)		5 (0.5)
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen	Vermoeidheid	333 (30.5)			42 (3.8)
	Asthenie	227 (20.8)			32 (2.9)
	Pyrexie		90 (8.2)		5 (0.5)
	Perifeer oedeem		96 (8.8)		2 (0.2)
	Ontsteking van de slijmvliezen		23 (2.1)		1 (<0.1)
	Pijn		36 (3.3)		7 (0.6)
	Pijn op de borst		11 (1.0)		2 (0.2)
	Oedeem			8 (0.7)	1 (<0.1)
	Rillingen		12 (1.1)		0
	Malaise		21 (1.9)		0
Onderzoeken	Weight decreased		81 (7.4)		0
	Verhoogd aspartaataminotransferase		13 (1.2)		1 (<0.1)
	Verhoogde transaminasen			7 (0.6)	1 (<0.1)

<sup>a</sup> gebaseerd op laboratoriumwaarden

\* zie gedetailleerde rubriek hieronder

### Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen

*Neutropenie en geassocieerde klinische voorvallen*

Er is aangetoond dat het gebruik van G-CSF de incidentie en de ernst van neutropenie beperkt (zie rubrieken 4.2 en 4.4).

De incidentie van neutropenie graad  $\geq 3$  op basis van laboratoriumgegevens varieerde van 44,7% tot 76,7%, afhankelijk van het gebruik van G-CSF, met de laagste incidentie gemeld bij gebruik van G-CSF-profylaxe. Evenzo varieerde de incidentie van febriële neutropenie graad  $\geq 3$  van 3,2% tot 8,6%. Neutropene complicaties (waaronder febriële neutropenie, neutropene infectie/sepsis en neutropene colitis), in sommige gevallen met een fatale afloop, werden gemeld bij 4,0% van de patiënten bij wie primaire G-CSF-profylaxe werd gebruikt, en bij 12,8% van de andere patiënten.

#### *Hartaandoeningen en –aritmieën*

In de gepoolde analyse werden hartvoorvallen gemeld bij 5,5% van de patiënten, van wie 1,1% hartritmestormissen graad  $\geq 3$  had. De incidentie van tachycardie bij cabazitaxel was 1,0%, waarvan minder dan 0,1% graad  $\geq 3$  was. De incidentie van atriumfibrilleren was 1,3%. Voorvallen van hartfalen werden gemeld bij 2 patiënten (0,2%), van wie één met fatale afloop. Fataal ventrikelfibrilleren werd gerapporteerd bij 1 patiënt (0,3%) en hartstilstand bij 3 patiënten (0,5%). Geen van de gevallen werd door de onderzoeker gerelateerd bevonden.

#### *Haematurie*

In de gepoolde analyse had hematurie van alle graden een incidentie van 18,8% bij 25 mg/m<sup>2</sup> (zie rubriek 5.1). In bijna de helft van de gevallen werden verwarrende oorzaken gedocumenteerd, zoals ziekteprogressie, instrumentatie, infectie of antistollings-/NSAID-/acetylsalicylzuurtherapie.

#### *Andere afwijkingen in laboratoriumwaarden*

In de gepoolde analyse bedroeg de incidentie van anemie  $\geq$  graad 3, verhoogd ASAT, ALAT en bilirubine, op basis van afwijkingen in laboratoriumwaarden, respectievelijk 12,0%, 1,3%, 1,0% en 0,5%.

#### *Gastrointestinale aandoeningen*

Colitis (waaronder enterocolitis en neutropene enterocolitis) en gastritis werden waargenomen. Gastrointestinale bloedingen, gastrointestinale perforatie en ileus (intestinale obstructie) werden eveneens gerapporteerd (zie rubriek 4.4).

#### *Ademhalingsstelselaandoeningen*

Gevalen van interstitiële pneumonie/pneumonitis en interstitiële longziekte, soms met fatale afloop, zijn gemeld met frequentie niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) (zie rubriek 4.4).

#### *Nier- en urinewegaandoeningen*

Soms is cystitis gemeld als gevolg van bestralingsrecallfenomeen, inclusief hemorragische cystitis.

#### Pediatrische patiënten

Zie rubriek 4.2.

#### Andere patiëntengroepen

##### *Ouderen*

Van de 1092 met cabazitaxel 25 mg/m<sup>2</sup> behandelde patiënten in de prostaatkankeronderzoeken waren 755 patiënten 65 jaar of ouder, onder wie 238 patiënten ouder dan 75 jaar. De volgende niethematologische bijwerkingen werden gemeld in percentages  $\geq 5\%$  hoger bij patiënten van 65 jaar en ouder, in vergelijking met jongere patiënten: vermoeidheid (respectievelijk 33,5% en 23,7%), asthenie (23,7 en 14,2%), obstipatie (20,4% en 14,2%) en dyspneu (10,3% en 5,6%). Neutropenie (90,9% vs. 81,2%) en trombocytopenie (48,8% vs. 36,1%) waren ook 5% hoger bij patiënten van 65 jaar en ouder in vergelijking met jongere patiënten. Graad  $\geq 3$  neutropenie en febriële neutropenie hadden de hoogste verschilpercentages tussen beide leeftijdsgroepen (respectievelijk 14% en 4% hoger bij patiënten  $\geq 65$  jaar in vergelijking met patiënten  $< 65$  jaar) (zie rubriek 4.2 en 4.4).

### Melding van vermoedelijke bijwerkingen

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico's van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

[www.fagg.be](http://www.fagg.be)

Afdeling Vigilantie:

Website: [www.eenbijwerkingmelden.be](http://www.eenbijwerkingmelden.be)

E-mail: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be)

## **4.9 Overdosering**

Er bestaat geen bekend antidotum tegen cabazitaxel. De verwachte complicaties van overdosering zouden bestaan uit de exacerbatie van bijwerkingen zoals beenmergsuppressie en gastrointestinale stoornissen.

In geval van overdosering moet de patiënt in een gespecialiseerde dienst verzorgd worden en strikt opgevolgd worden. Patiënten moeten zo snel mogelijk na de ontdekking van overdosering therapeutisch G-CSF krijgen. Andere geschikte ondersteunende maatregelen moeten genomen worden.

## **5 FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN**

### **5.1 Farmacodynamische eigenschappen**

Farmacotherapeutische categorie: Antineoplastische middelen, taxanen, ATC code: L01CD04.

#### Werkingsmechanisme

Cabazitaxel is een antineoplastische stof die het microtubuli-netwerk in de cellen verstoort. Cabazitaxel bindt zich aan tubuline en bevordert de aanmaak van microtubuli uit tubuline en remt tegelijkertijd hun afbraak. Dit leidt tot een stabilisatie van de microtubuli, wat leidt tot de remming van de cellulaire functies tijdens de mitose en de interfase.

#### Farmacodynamische effecten

Cabazitaxel toonde een breed spectrum van antitumorale activiteit tegen gevorderde humane tumoren die getransplanteerd werden in muizen. Cabazitaxel is actief in docetaxel-gevoelige tumoren. Bovendien toonde cabazitaxel activiteit in tumormodellen die ongevoelig waren voor chemotherapie met inbegrip van docetaxel.

#### Klinische werkzaamheid en veiligheid

De werkzaamheid en de veiligheid van cabazitaxel in combinatie met prednison of prednisolon zijn geëvalueerd in een gerandomiseerde, open label, internationale, multicenter fase III studie (EFC6193 studie), bij patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker die voorheen behandeld werden met een docetaxel-behandelingschema.

De totale overleving (OS: overall survival) was het primaire eindpunt van de studie.

Secundaire eindpunten waren de progressievrije overleving [PFS: progression free survival (gedefinieerd als de tijd vanaf de randomisatie tot progressie van de tumor, progressie van het prostaatspecifiek antigeen (PSA), progressie van pijn, of overlijden door welke oorzaak dan ook, afhankelijk van wat het eerst optrad], de tumorresponsnelheid gebaseerd op de RECIST criteria

(response evaluation criteria in solid tumours), progressie van PSA (gedefinieerd als een stijging van  $\geq 25\%$  of  $>50\%$  bij PSA non-responders of responders, respectievelijk), PSA respons (dalingen van serum PSA spiegels van minstens 50%), progressie van de pijn [geëvalueerd met behulp van de PPI (present pain intensity) schaal van de McGill-Melzack vragenlijst en een analgetische score (AS)] en de pijnrespons (gedefinieerd als een reductie van meer dan 2 punten ten opzichte van de mediane PPI score op uitgangsniveau zonder gelijktijdige toename van AS, of een reductie van  $\geq 50\%$  van het gebruik van analgetica ten opzichte van de gemiddelde AS op uitgangsniveau zonder gelijktijdige toename van de pijn).

In totaal werden 755 patiënten gerandomiseerd die of 25 mg/m<sup>2</sup> cabazitaxel intraveneus kregen toegediend om de 3 weken gedurende maximaal 10 cycli in combinatie met 10 mg prednison of prednisolon oraal per dag (n=378), of die 12 mg/m<sup>2</sup> mitoxantron intraveneus kregen toegediend om de 3 weken gedurende maximaal 10 cycli in combinatie met 10 mg prednison of prednisolon oraal per dag (n=377).

Deze studie sloot patiënten in die ouder dan 18 jaar waren met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker, hetzij meetbaar volgens de RECIST criteria of niet meetbaar met stijgende PSA spiegels of het optreden van nieuwe letsels, en de ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) functionele index van 0 tot 2. De patiënten moesten de volgende waarden hebben: aantal neutrofielen  $>1500$  cellen/mm<sup>3</sup>, bloedplaatjes  $>100.000$ /mm<sup>3</sup>, hemoglobine  $>10$  g/dl, creatinine  $<1,5$  x ULN, totale bilirubine  $<1$  x ULN, ASAT en ALAT  $<1,5$  x ULN.

Patiënten met een voorgeschiedenis van congestief hartfalen, of myocardinfarct tijdens de laatste 6 maanden, of patiënten met ongecontroleerde hartaritmieën, angina pectoris, en/of hypertensie werden niet ingesloten in de studie.

De demografische kenmerken, met inbegrip van leeftijd, ras en ECOG functionele index (0 tot 2), waren evenwichtig verdeeld tussen de behandelingsarmen. In de cabazitaxel groep was de gemiddelde leeftijd 68 jaar (range 46-92 jaar) en de verdeling tussen de rassen was 83,9% Kaukasisch, 6,9% Aziatisch/oosters, 5,3% negroïde en 4% overige.

Het mediane aantal cycli bedroeg 6 in de cabazitaxel groep en 4 in de mitoxantron groep. Het aantal patiënten die de studiebehandeling voltooiden (10 cycli), bedroeg respectievelijk 29,4% en 13,5% in de cabazitaxel groep en in de vergelijkende groep.

De totale overleving was significant langer met cabazitaxel vergeleken met mitoxantron (15,1 maanden versus 12,7 maanden, respectievelijk), met een risicoreductie van 30% op overlijden in vergelijking met mitoxantron (zie tabel 3 en figuur 1).

Een subgroep van 59 patiënten ontving vóór de behandeling een cumulatieve dosis van  $<225$  mg/m<sup>2</sup> docetaxel (29 patiënten in de cabazitaxel arm, 30 patiënten in de mitoxantron arm). Er was geen significant verschil in de totale overleving in deze groep patiënten (HR (95% CI) 0,96 (0,49-1,86)).


Tabel 3 Werkzaamheid van cabazitaxel in de EFC6193 studie bij de behandeling van patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker

	<b>cabazitaxel + prednison n=378</b>	<b>mitoxantron + prednison n=377</b>
<b>Totale overleving</b>		
Aantal patiënten die overleden (%)	234 (61.9%)	279 (74%)
Mediane overleving (maanden) (95% CI)	15.1 (14.1-16.3)	12.7 (11.6-13.7)
Hazard Ratio (HR) <sup>1</sup> (95% CI)	0.70 (0.59-0.83)	

p-waarde

<0.0001

<sup>1</sup>HR geschat op basis van een Cox model; een hazard ratio van minder dan 1 is in het voordeel van cabazitaxel



Er was een verbetering in PFS in cabazitaxel -arm in vergelijking met de mitoxantron-arm, 2,8 (2,4-3,0) maanden versus 1,4 (1,4-1,7) maanden, respectievelijk, HR (95% CI) 0,74 (0,64-0,86),  $p < 0,0001$ .

Er was een significant hogere tumorrespons van 14,4% (95% CI: 9,6-19,3) bij de patiënten in de cabazitaxel -arm in vergelijking met 4,4% (95% CI: 1,6-7,2) bij de patiënten in de mitoxantron-arm,  $p = 0,0005$ .

De PSA secundaire eindpunten waren positief in de cabazitaxel -arm. Er was een mediane PSA progressie van 6,4 maanden (95% CI: 5,1-7,3) bij de patiënten in de cabazitaxel -arm, in vergelijking met 3,1 maanden (95% CI: 2,2-4,4) in de mitoxantron-arm, HR 0,75 maanden (95% CI 0,63-0,90),  $p = 0,0010$ . De PSA respons was 39,2% bij de patiënten in de cabazitaxel -arm (95% CI: 33,9-44,5) versus 17,8% bij de patiënten in de mitoxantron-arm (95% CI: 13,7-22,0),  $p = 0,0002$ .

Er was geen statistisch verschil tussen beide behandelingsarmen in pijnprogressie en pijnrespons.

In een non-inferioriteit, multicenter, multinationale, gerandomiseerde open label fase III studie (EFC11785 studie) werden 1200 patiënten gerandomiseerd die voorheen behandeld werden met een docetaxel-behandelingschema. Deze patiënten kregen cabazitaxel 25 mg/m<sup>2</sup> (n=602) of 20 mg/m<sup>2</sup> (n=598). De totale overleving (OS: overall survival) was het primaire eindpunt van de studie.

Het primaire eindpunt van de studie werd behaald in termen van non-inferioriteit van cabazitaxel 20 mg/m<sup>2</sup> in vergelijking met 25 mg/m<sup>2</sup> (zie tabel 4). Een statistisch significant hoger percentage ( $p < 0,001$ ) patiënten toonde een PSA response in de 25 mg/m<sup>2</sup> groep (42,9%) in vergelijking tot de 20 mg/m<sup>2</sup> groep (29,5%). Bij patiënten met de 20 mg/m<sup>2</sup> dosering werd een statistisch significant hoger risico op PSA progressie waargenomen (HR 1,195; 95% CI: 1,025 tot 1,393), in vergelijking met de 25 mg/m<sup>2</sup> dosering. Er was geen statistisch verschil in de andere secundaire eindpunten (PFS, tumoren pijnrespons, tumor- en pijnprogressie en vier subcategorieën van FACT-P).

Tabel 4: Totale overleving in EFC11785 studie in cabazitaxel 25 mg/m<sup>2</sup> arm versus cabazitaxel 20

mg/m<sup>2</sup> arm (intent to treat analyse) - primair eindpunt

	<b>CBZ20+PRED n=598</b>	<b>CBZ25+PRED n=602</b>
<b>Totale overleving</b>		
Aantal patiënten die overleden, n (%)	497 (83.1 %)	501 (83.2%)
Mediane overleving (maanden) (95% CI)	13.4 (12.19 to 14.88)	14.5 (13.47 to 15.28)
Hazard Ratio <sup>a</sup>		
versus CBZ25+PRED	1.024	-
1-zijdig 98.89% UCI	1.184	-
1- zijdig 95% LCI	0.922	-

CBZ20= Cabazitaxel 20 mg/m<sup>2</sup>, CBZ25= Cabazitaxel 25 mg/m<sup>2</sup>,

PRED= Prednison/prednisolon

CI= betrouwbaarheidsinterval, LCI= ondergrens van het betrouwbaarheidsinterval, UCI= bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval.

<sup>a</sup> Hazard ratio geschat op basis van een Cox Proportional Hazards regression model. Een hazard ratio < 1 duidt op een lager risico van cabazitaxel 20 mg/m<sup>2</sup> ten opzichte van 25 mg/m<sup>2</sup>.

Het waargenomen veiligheidsprofiel van cabazitaxel 25 mg/m<sup>2</sup> in studie EFC11785 is kwalitatief en kwantitatief gelijk aan het profiel waargenomen in de EFC6193 studie. De EFC11785 studie toonde een beter veiligheidsprofiel voor de cabazitaxel 20 mg/m<sup>2</sup> dosis.

Tabel 5: Samenvatting van veiligheidsgegevens voor cabazitaxel 25 mg/m<sup>2</sup> arm versus cabazitaxel 20 mg/m<sup>2</sup> arm in de EFC11785 studie

	<b>CBZ20+PRED n=580</b>	<b>CBZ25+PRED n=595</b>
Mediane aantal cycli/ mediane duur van behandeling	6 / 18 weken	7 / 21 weken
Aantal patiënten met dosisverlaging n (%)	Van 20 tot 15 mg/m <sup>2</sup> : 58 (10.0%) Van 15 tot 12 mg/m <sup>2</sup> : 9 (1.6%)	Van 25 tot 20 mg/m <sup>2</sup> : 128 (21.5%) Van 20 tot 15 mg/m <sup>2</sup> : 19 (3.2%) Van 15 tot 12 mg/m <sup>2</sup> : 1 (0.2%)
<b>Alle graden bijwerkingen <sup>a</sup> (%)</b>		
Diarree	30.7	39.8
Misselijkheid	24.5	32.1
Vermoeidheid	24.7	27.1
Hematurie	14.1	20.8
Asthenie	15.3	19.7
Verminderde eetlust	13.1	18.5
Braken	14.5	18.2
Constipatie	17.6	18.0
Rugpijn	11.0	13.9
Klinische neutropenie	3.1	10.9
Urineweginfectie	6.9	10.8
Perifere sensorische neuropathie	6.6	10.6
Dysgeusie	7.1	10.6
<b>Graad ≥ 3 bijwerkingen <sup>b</sup> (%)</b>		
Klinische neutropenie	2.4	9.6
Febriele neutropenie	2.1	9.2
<b>Hematologische afwijkingen <sup>c</sup> (%)</b>		

Graad $\geq$ 3 neutropenie	41.8	73.3
Graad $\geq$ 3 anaemie	9.9	13.7
Graad $\geq$ 3 trombocytopenie	2.6	4.2

CBZ20=Cabazitaxel 20 mg/m<sup>2</sup>, CBZ25=Cabazitaxel 25 mg/m<sup>2</sup>, PRED=Prednison/prednisolone

a Alle graden bijwerkingen met een incidentie hoger dan 10%

b Graad  $\geq$  3 bijwerkingen met een incidentie hoger dan 5%

c Gebaseerd op laboratoriumwaarden

In een prospectief, multinationalaal, gerandomiseerd, open-label-, fase IV-onderzoek (LPS14201/CARD-onderzoek) met werkzame controle werden 255 patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (mCRPC), die eerder in welke volgorde dan ook zijn behandeld met een docetaxelbevattend regime en een AR-gericht middel (abirateron of enzalutamide, met ziekteprogressie binnen 12 maanden na aanvang van de behandeling) gerandomiseerd naar cabazitaxel 25 mg/m<sup>2</sup> elke 3 weken plus prednison/prednisolon 10 mg per dag (n=129), of op AR gerichte middelen (abirateron 1000 mg eenmaal daags plus prednison/prednisolon 5 mg tweemaal daags of enzalutamide 160 mg eenmaal daags) (n=126). Radiografische progressievrije overleving (rPFS), gedefinieerd door Prostaatkankerwerkgroep 2 (PCWG2), was het primaire eindpunt. Secundaire eindpunten omvatten totale overleving, progressievrije overleving, PSA-respons en tumorrespons.

Demografische gegevens en ziektekenmerken waren tussen de behandelingsgroepen in evenwicht. Bij baseline was de totale mediane leeftijd 70 jaar, had 95% van de patiënten een ECOG-PS van 0 tot 1 en was de mediane gleasonsore 8. Eenzestig procent (61%) van de patiënten onderging een eerdere behandeling met een op AR gericht middel na eerdere docetaxel.


Het onderzoek voldeed aan het primaire eindpunt: rPFS was significant langer met cabazitaxel dan met een AR-gericht middel (respectievelijk 8,0 en 3,7 maanden), met een vermindering van 46% in het risico op radiografische progressie in vergelijking met een AR-gericht middel (zie tabel 6 en afbeelding 2).

Tabel 6- Werkzaamheid van cabazitaxel in het CARD-onderzoek, bij de behandeling van patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (intent-to-treat-analyse) – Radiografische progressievrije overleving (rPFS)

	Cabazitaxel + prednison / prednisolon + G-CSF  n=129	AR-gericht middel: Abirateron + prednison/prednisolon of enzalutamide n=126
Aantal voorvallen op de afkapdatum (%)	95 (73.6%)	101 (80.2%)
Mediane rPFS (maanden) (95% CI)	8.0 (5.7 to 9.2)	3.7 (2.8 to 5.1)
Risicoverhouding (HR) (95% CI)	0.54 (0.40 to 0.73)	
p-waarde	< 0.0001	

<sup>1</sup>gestratificeerde log-ranktoets, significantiedrempel= 0.05

Figure 2 - Primary endpoint: Kaplan-Meier plot of radiographic PFS (ITT Population)



Geplande subgroepanalyses voor rPFS op basis van stratificatiefactoren bij randomisatie leverden een risicoverhouding op van 0,61 (95%-BI: 0,39 tot 0,96) bij patiënten die een eerder AR-gericht middel kregen voorafgaand aan docetaxel, en een risicoverhouding van 0,48 (95%-BI: 0,32 tot 0,70) bij patiënten die eerder een AR-gericht middel kregen na docetaxel.

Cabazitaxel was statistisch superieur aan de AR-gerichte comparatoren in elk van de alfa-beschermd belangrijkste secundaire eindpunten, waaronder totale overleving (13,6 maanden voor de cabazitaxel-groep versus 11,0 maanden voor de groep met AR-gerichte middelen, HR 0,64, 95% BI: 0,46 tot 0,89;  $p=0,008$ ), progressievrije overleving (4,4 maanden voor cabazitaxel -groep versus 2,7 maanden voor groep met AR-gerichte middelen, HR 0,52; 95%-BI: 0,40 tot 0,68), bevestigde PSA-respons (36,3% voor de cabazitaxel -groep versus 14,3% voor de groep met AR-gerichte middelen,  $p=0,0003$ ) en beste tumorrespons (36,5% voor de cabazitaxel -groep versus 11,5% voor de groep met AR-gerichte middelen,  $p=0,004$ ).

Het in het CARD-onderzoek waargenomen veiligheidsprofiel van cabazitaxel 25 mg/m<sup>2</sup> was over het algemeen consistent met de waarnemingen in het TROPIC- en PROSELICA-onderzoek (zie rubriek 4.8). De incidentie van graad  $\geq 3$  bijwerkingen was 53,2% in de cabazitaxel-groep versus 46,0% in de groep met AR-gerichte middelen. De incidentie van graad  $\geq 3$  ernstige bijwerkingen was 31,7% in de cabazitaxel -groep versus 37,1% in de groep met AR-gerichte middelen. De incidentie van patiënten die permanent stopten met de onderzoeksbehandeling vanwege bijwerkingen was 19,8% in de cabazitaxel -groep versus 8,1% in de groep met AR-gerichte middelen. De incidentie van patiënten met een bijwerking die tot de dood leidde was 5,6% in de cabazitaxel -groep versus 10,5% in de groep met AR-gerichte middelen.

#### Pediatrische patiënten

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft besloten af te zien van de verplichting voor de fabrikant om de resultaten in te dienen van onderzoek met cabazitaxel in alle subgroepen van pediatrische patiënten voor de indicatie prostaatkanker (zie rubriek 4.2 voor informatie over pediatrich gebruik).

Cabazitaxel werd geëvalueerd in een open-label, multicenter fase 1/2-studie, uitgevoerd bij in totaal 39 pediatrische patiënten (tussen de 4 en 18 jaar voor het fase 1-gedeelte van de studie en tussen de 3 en 16 jaar voor het fase 2-gedeelte van de studie). Het fase 2-gedeelte heeft geen werkzaamheid aangetoond van behandeling met cabazitaxel 30 mg/m<sup>2</sup> als enkelvoudig middel in de pediatrische populatie met terugkerend of refractair diffuus intrinsiek ponsglioom (DIPG) en hooggradige gliomen (HGG).

## 5.2 Farmacokinetische eigenschappen

Een populatie farmacokinetische analyse werd uitgevoerd bij 170 patiënten waaronder patiënten met gevorderde solide tumoren (n=69), gemetastaseerde borstkanker (n=34) en gemetastaseerde prostaatkanker (n=67). Deze patiënten kregen cabazitaxel in dosissen van 10 tot 30 mg/m<sup>2</sup> eenmaal per week of eenmaal om de 3 weken.

### Absorptie

Na intraveneuze toediening gedurende 1 uur in een dosis van 25 mg/m<sup>2</sup> cabazitaxel bij patiënten met gemetastaseerde prostaatkanker (n=67), was de C<sub>max</sub> 226 ng/ml (Coefficient of Variation (CV): 107%) en deze werd bereikt aan het einde van de 1-uur-durende infusie (T<sub>max</sub>). De gemiddelde AUC was 991 ng.u/ml (CV: 34%).

Er werd geen grote afwijking van de dosisproportionaliteit waargenomen in een dosis van 10 tot 30 mg/m<sup>2</sup> bij patiënten met gevorderde solide tumoren (n=126).

### Distributie

Het distributievolume (V<sub>ss</sub>) bedroeg 4870 l (2640 l/m<sup>2</sup> voor een patiënt met een mediane lichaamsoppervlakte (BSA: body surface area) van 1,84 m<sup>2</sup>) in steady state.

*In vitro* bedroeg de binding van cabazitaxel aan humane serumeiwitten 89-92% en was niet verzadigbaar tot 50.000 ng/ml, wat de maximale concentratie dekt die werd waargenomen in klinische studies. Cabazitaxel is voornamelijk gebonden aan humaan serumalbumine (82,0%) en lipoproteïnen (87,9% voor HDL, 69,8% voor LDL en 55,8% voor VLDL). De *in vitro* verhoudingen bloed/plasma in humaan bloed varieerden van 0,90 tot 0,99 wat erop wijst dat cabazitaxel gelijk verdeeld was tussen bloed en plasma.

### Biotransformatie

Cabazitaxel wordt uitgebreid gemetaboliseerd in de lever (>95%), voornamelijk door het iso-enzym CYP3A (80% tot 90%). Cabazitaxel is de belangrijkste circulerende stof in humaan plasma. Zeven metabolieten werden gedetecteerd in plasma (waaronder 3 actieve metabolieten afkomstig van O-demethyleringen), waarbij de belangrijkste metaboliet verantwoordelijk was voor 5% van de blootstelling aan de oorspronkelijke stof. Er worden ongeveer 20 metabolieten van cabazitaxel uitgescheiden in de urine en de feces bij de mens.

Op basis van *in vitro* studies bestaat het potentiële risico van remming door cabazitaxel in klinisch relevante concentraties van geneesmiddelen die voornamelijk een substraat van CYP3A zijn.

Een klinische studie heeft echter aangetoond dat cabazitaxel (25 mg/m<sup>2</sup> toegediend als een eenmalige 1 uur durende infusie) de plasmaspiegels van midazolam, een CYP3A-testsubstraat, niet wijzigde. Daarom is het onwaarschijnlijk dat bij therapeutische dosissen de gelijktijdige toediening van CYP3Asubstraten met cabazitaxel een klinische impact zal hebben.

Er bestaat geen potentieel risico van remming van geneesmiddelen die substraten van andere CYP enzymen zijn (1A2, 2B6, 2C9, 2C8, 2C19, 2E1, en 2D6), evenals geen potentieel risico van inductie door cabazitaxel van geneesmiddelen die substraten van CYP1A, CYP2C9 en CYP3A zijn. Cabazitaxel remde *in vitro* niet de majeure biotransformatieweg van warfarine tot 7-hydroxywarfarine, die gemedieerd wordt door CYP2C9. Daarom wordt *in vivo* geen farmacokinetische interactie van cabazitaxel op warfarine verwacht.

*In vitro* remde cabazitaxel niet de Multidrug-Resistant Proteins (MRP): MRP1 en MRP2 of Organic Cation Transporter (OCT1). Cabazitaxel remde het transport van P-glycoproteïne (PgP) (digoxine, vinblastine), Breast-Cancer-Resistant-Proteins (BCRP) (methotrexaat) en Organic Anion Transporting Polypeptide OATP1B3 (CCK8) bij concentraties die minstens 15 maal hoger waren dan in de kliniek wordt waargenomen, terwijl cabazitaxel het transport van OATP1B1 (oestradiol-17β-glucuronide) remde bij concentraties die slechts 5 maal hoger waren dan in de kliniek wordt waargenomen. Daarom is het risico op in-vivo-interacties met MRP-, OCT1-, PgP-, BCRP- en OATP1B3-substraten onwaarschijnlijk bij de dosis van 25 mg/m<sup>2</sup>. Het risico op interacties met OATP1B1-transporter

bestaat, met name tijdens de duur van de infusie (1 uur) en tot maximaal 20 minuten na het einde van de infusie (zie rubriek 4.5).

#### Eliminatie

Na een 1-uur-durende IV infusie van 25 mg/m<sup>2</sup> [<sup>14</sup>C]-cabazitaxel bij patiënten werd ongeveer 80% van de toegediende dosis binnen 2 weken geëlimineerd. Cabazitaxel wordt voornamelijk uitgescheiden in de feces in de vorm van verschillende metabolieten (76% van de dosis), terwijl de renale excretie van cabazitaxel en de metabolieten verantwoordelijk is voor minder dan 4% van de dosis (2,3% in de vorm van ongewijzigd geneesmiddel in de urine).

Cabazitaxel had een hoge plasmaklaring van 48,5 l/u (26,4 l/u/m<sup>2</sup> voor een patiënt met een mediane BSA van 1,84 m<sup>2</sup>) en een lange terminale halfwaardetijd van 95 uur.

#### Speciale patiëntengroepen

##### *Ouderen*

In de populatie farmacokinetische analyse bij 70 patiënten van 65 jaar en ouder (57 patiënten van 65 tot 75 jaar en 13 patiënten ouder dan 75 jaar), werd geen effect van de leeftijd op de farmacokinetiek van cabazitaxel waargenomen.

##### *Pediatrische patiënten*

De veiligheid en de werkzaamheid van cabazitaxel bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar zijn niet vastgesteld.

##### *Leverfunctiestoornissen*

Cabazitaxel wordt voornamelijk via het levermetabolisme geëlimineerd.

Uit een specifiek onderzoek bij 43 kankerpatiënten met leverfunctiestoornissen bleek dat een lichte (totale bilirubine >1 tot ≤ 1,5 x ULN of ASAT >1,5 x ULN) of matig ernstige (totale bilirubine >1,5 tot ≤ 3,0 x ULN) vorm van leverfunctiestoornis geen invloed had op de farmacokinetiek van cabazitaxel. De maximale verdraagbare dosis (maximum tolerated dose, MTD) van cabazitaxel bedroeg respectievelijk 20 en 15 mg/m<sup>2</sup>.

Bij 3 patiënten met een ernstige vorm van leverfunctiestoornis (totale bilirubine >3 ULN) werd een daling van 39% van de klaring vastgesteld in vergelijking met patiënten met een lichte vorm van leverfunctiestoornis. Dit wijst erop dat een ernstige vorm van leverfunctiestoornis enigszins invloed heeft op de farmacokinetiek van cabazitaxel. De MTD van cabazitaxel bij patiënten met een ernstige vorm van leverfunctiestoornis werd niet bepaald.

Op basis van gegevens over de veiligheid en verdraagbaarheid moet de dosis cabazitaxel verlaagd worden bij patiënten met een lichte vorm van leverfunctiestoornis (zie rubrieken 4.2 en 4.4).

Cabazitaxel is gecontra-indiceerd bij patiënten met een ernstige vorm van leverfunctiestoornis (zie rubriek 4.3).

##### *Nierfunctiestoornissen*

Cabazitaxel wordt in geringe mate uitgescheiden via de nieren (2,3% van de dosis). Een populatie farmacokinetische analyse die uitgevoerd werd bij 170 patiënten waaronder 14 patiënten met een matige nierfunctiestoornis (creatinineklaring in het interval van 30 tot 50 ml/min) en 59 patiënten met een lichte nierfunctiestoornis (creatinineklaring in het interval van 50 tot 80 ml/min), toonde aan dat lichte tot matige nierfunctiestoornissen geen significante effecten hadden op de farmacokinetiek van cabazitaxel. Dit werd bevestigd in een specifieke, vergelijkende farmacokinetische studie bij patiënten met solide tumoren met een normale nierfunctie (8 patiënten), matig ernstige (8 patiënten) en ernstige (9 patiënten) nierfunctiestoornissen, die verschillende cabazitaxelcycli kregen in eenmalige IV infusies tot 25 mg/m<sup>2</sup>.

### **5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek**

Bijwerkingen die niet waargenomen werden in klinische studies maar wel bij honden zijn waargenomen na toediening van een eenmalige dosis, 5-daagse en wekelijkse toediening met

blootstellingsniveaus die lager waren dan de klinische blootstellingsniveaus en met mogelijke klinische relevantie waren: arteriolaire/peri-arteriolaire necrose in de lever, hyperplasie van de galkanaaltjes en/of hepatocellulaire necrose (zie rubriek 4.2).

Bijwerkingen die niet waargenomen werden in klinische studies maar wel bij ratten zijn waargenomen tijdens toxiciteitsstudies met herhaalde doseringen bij blootstellingsniveaus die hoger waren dan de klinische blootstellingsniveaus en met mogelijke klinische relevantie waren: oogaandoeningen gekenmerkt door subcapsulaire zwelling/degeneratie van de lensvezels. Deze effecten waren partieel reversibel na 8 weken.

Er werden geen carcinogeniciteitsstudies uitgevoerd met cabazitaxel. Cabazitaxel induceerde geen mutaties in de bacteriële reverse mutatie (Ames) test. Het was niet clastogeen in een *in vitro* test in humane lymfocyten (geen inductie van structurele chromosoomafwijkingen maar het verhoogde het aantal polyploïde cellen) en het induceerde een toename van micronuclei in de *in vivo* test bij ratten. Deze genotoxiciteitsresultaten (door een aneugenisch mechanisme) zijn inherent aan de farmacologische activiteit van de stof (remming van de depolymerisatie van tubuline).

Cabazitaxel had geen invloed op het paarvermogen of de vruchtbaarheid van behandelde mannelijke ratten. In toxiciteitsstudies met herhaalde doseringen werd echter degeneratie van de vesicula seminalis en atrofie van de tubuli seminiferi in de testis waargenomen bij ratten, en testiculaire degeneratie (minimale epitheliale enkelvoudige celnecrose in de epididymis) werd waargenomen bij honden. De blootstellingen bij dieren waren vergelijkbaar of lager dan die waargenomen werden bij mensen die klinisch relevante dosissen cabazitaxel kregen.

Cabazitaxel induceerde embryofetale toxiciteit bij vrouwelijke ratten die eenmaal per dag intraveneus werden behandeld vanaf zwangerschapsdagen 6 tot 17, waarbij tevens maternale toxiciteit optrad en omvatte foetaal overlijden en een verminderd gemiddeld foetaal gewicht geassocieerd met een vertraagde ossificatie van het skelet. De blootstellingen bij dieren waren lager dan die waargenomen werden bij mensen die klinisch relevante dosissen cabazitaxel kregen.

Cabazitaxel passeerde de placentabarrière bij ratten.

Bij ratten worden cabazitaxel en zijn metabolieten uitgescheiden in de moedermelk in een hoeveelheid tot maximaal 1,5% van de toegediende dosis gedurende 24 uur.

#### Environmental risk assessment (ERA – Milieu- en effectbeoordeling)

De resultaten van environmental risk assessment studies toonden aan dat het gebruik van cabazitaxel geen significant risico zal bieden voor het watermilieu (zie rubriek 6.6 voor het verwijderen van ongebruikte geneesmiddelen).

## **6 FARMACEUTISCHE GEGEVENS**

### **6.1 Lijst van hulpstoffen**

Watervrij citroenzuur,  
Watervrije ethanol,  
Polysorbaat 80,  
Macrogol 300.

### **6.2 Gevallen van onverenigbaarheid**

Dit geneesmiddel mag niet gemengd worden met andere geneesmiddelen dan die welke vermeld zijn in rubriek 6.6.

PVC infusiecontainers of polyurethaan infusiesets dienen niet gebruikt te worden voor de bereiding en

toediening van de infusieoplossing.

### **6.3 Houdbaarheid**

Ongeopende injectieflacon:

2 jaar

Na eerste opening:

Multi-dose injectieflacons: De fysische en chemische stabiliteit van de oplossing na eerste opening is aangetoond voor 28 dagen bij een temperatuur onder 25 °C. Cabazitaxel Eugia is geschikt voor gebruik met meerdere doses.

Na verdunning in de infusiezak/fles:

De chemische en fysische stabiliteit van de infusieoplossing zijn aangetoond gedurende 72 uur bij een temperatuur van minder dan 25 °C en gedurende 14 dagen bij gekoelde omstandigheden.

Vanuit microbiologisch standpunt dient de infusieoplossing onmiddellijk gebruikt te worden. Indien dit niet onmiddellijk wordt gebruikt, vallen de bewaartijden en -condities voor gebruik onder de verantwoordelijkheid van de bereider en zouden normaliter niet langer mogen zijn dan 24 uur bij een temperatuur onder 25 °C, tenzij de verdunning heeft plaatsgevonden onder gecontroleerde en gevalideerde aseptische condities.

### **6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren**

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Voor de bewaarcondities van het geneesmiddel na eerste opening en verdunning, zie rubriek 6.3.

### **6.5 Aard en inhoud van de verpakking**

Eén verpakking bevat één injectieflacon met concentraat voor oplossing voor infusie:

Type I buisvormig helder glas met grijze chlorobutylrubberen stop en verzegeld met aluminium zegel met polypropyleen schijf.

Verpakkingsgroottes: 1,5 of 10 injectieflacons die elk 60 mg/6 ml cabazitaxel bevatten.

Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

### **6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies**

Cabazitaxel Eugia dient alleen bereid en toegediend te worden door personeel dat gekwalificeerd is voor de toepassing van cytotoxische middelen. Personeel dat zwanger is, dient het geneesmiddel niet te hanteren. Zoals met andere antineoplastische stoffen dient voorzichtigheid te worden betracht wanneer Cabazitaxel Eugia wordt gehanteerd en oplossingen worden bereid. Het gebruik van afschermdende hulpmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen (bijv. handschoenen) en procedures voor de bereiding worden aangeraden. Indien Cabazitaxel Eugia, bij welke stap dan ook in het bereidingsproces, in contact met de huid mocht komen, was deze dan onmiddellijk en grondig met zeep en water. Indien Cabazitaxel Eugia in contact met de slijmvliezen mocht komen, was deze dan onmiddellijk en grondig met water.

Lees deze **HELE** rubriek aandachtig vóór het mengen en verdunnen. Cabazitaxel Eugia vereist **ÉÉN** verdunning vóór toediening. Volg de bereidingsaanwijzingen die hieronder staan.

Het volgende verdunningsproces moet op aseptische wijze worden uitgevoerd om de infuusoplossing te bereiden.

Er kan meer dan één flacon concentraat nodig zijn om de voorgeschreven dosis toe te dienen.

## **Verdunning voor infusie**

Stap 1: Gebruik een gegradueerde spuit met een naald en trek de nodige hoeveelheid van het mengsel concentraat-oplosmiddel (10 mg/ml cabazitaxel) aseptisch op. Als voorbeeld zou een dosis van 45 mg Cabazitaxel Eugia 4.5 ml concentraat vereisen.

Cabazitaxel Eugia 10 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie bevat een overvulling. Deze overvulling zorgt ervoor dat er een extraheerbaar volume is van 6 ml dat 10 mg/ml cabazitaxel bevat.

Stap 2: Injecteer in een steriele PVC-vrije container met 5% glucoseoplossing of met 9 mg/ml (0,9%) natriumchlorideoplossing voor infusie. De concentratie van de oplossing voor infusie moet zich tussen 0,10 mg/ml en 0,26 mg/ml bevinden.

Stap 3: Verwijder de spuit en meng de inhoud van de infusiezak of -fles handmatig door middel van een schommelende beweging

Stap 4: Zoals bij alle parenterale producten moet de resulterende oplossing voor infusie visueel gecontroleerd worden vóór gebruik. Aangezien de infusieoplossing oververzadigd is, kan dit in de loop der tijd kristalliseren. In dit geval dient de oplossing niet gebruikt te worden en te worden afgevoerd. De infusieoplossing moet onmiddellijk worden gebruikt. Onder bepaalde omstandigheden, zoals vermeld in rubriek 6.3, kan de bewaartijd tijdens gebruik echter langer zijn.

Gebruik geen PVC infusiecontainers of polyurethaan infusiesets voor de bereiding en toediening van de infusieoplossing van Cabazitaxel Eugia.

Cabazitaxel Eugia mag niet worden gemengd met andere geneesmiddelen dan de genoemde. Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

## **7 HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

Eugia Pharma (Malta) Limited, Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront, Floriana FRN 1914 Malta

## **8 NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

BE665206

## **9 DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING VAN DE VERGUNNING**

Datum van eerste verlening van de vergunning: 17/10/2025

## **10 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST**

Datum van goedkeuring: 02/2026