

SOLIRIS® PATIENTENKARTE

Sicherheitsinformationen für Patienten

Wichtige Informationen für mit Soliris® behandelte Patienten

Die Behandlung mit SOLIRIS kann die Fähigkeit des Immunsystems Infektionen abzuwehren verringern, **dies gilt insbesondere für Meningokokkeninfektionen, die sofort medizinisch behandelt werden müssen.**

Wenn Sie eines der folgenden Symptome haben, **rufen Sie unmittelbar Ihren Arzt an oder konsultieren Sie einen Notarzt, vorzugsweise in der Notaufnahme eines Krankenhauses:**

- Kopfschmerzen mit Übelkeit oder Erbrechen,
- Kopfschmerzen mit einem steifen Nacken oder Rücken,
- Fieber,
- Hautausschlag,
- Verwirrtheit,
- Starke Muskelschmerzen in Verbindung mit grippeartigen Symptomen,
- Lichtempfindlichkeit.

Suchen Sie sofort medizinische Hilfe, wenn Sie eines dieser Anzeichen oder Symptome haben, und legen Sie diese Karte vor.

Auch wenn Sie die Anwendung von SOLIRIS® abbrechen, müssen Sie diese Karte nach Ihrer letzten Dosis SOLIRIS® noch 3 Monate lang mit sich führen. Sie können noch einige Wochen nach Ihrer letzten Dosis SOLIRIS® ein Risiko auf eine Meningokokkeninfektion haben.

INFORMATIONEN FÜR DEN BEHANDELNDEN ARZT

- **Diese Patientin/dieser Patient hat eine Behandlung mit SOLIRIS® (Eculizumab) erhalten. Aus diesem Grund ist sie/er empfindlicher für Infektionen durch Meningokokken (*Neisseria meningitidis*) oder andere häufige Erreger.**
- Alle Patienten müssen mindestens 2 Wochen vor Beginn der Behandlung mit SOLIRIS geimpft werden. Patienten, die ihre Behandlung mit SOLIRIS weniger als 2 Wochen nach der Meningokokkenimpfung beginnen, müssen bis 2 Wochen nach der Impfung eine angemessene Antibiotikaphylaxe erhalten.
- Die Patienten müssen ihre Impfung bzw. die Auffrischung ihrer Impfung entsprechend den Empfehlungen des nationalen Impfkalenders erhalten.
- Meningokokkeninfektionen können rasch lebensbedrohlich und sogar tödlich verlaufen, wenn sie nicht schnell genug diagnostiziert und behandelt werden.
- **Beurteilen Sie den Zustand der Patientin/des Patienten umgehend, wenn Sie eine Infektion vermuten und verabreichen Sie ggf. eine angemessene Antibiotikabehandlung.**
- Verständigen Sie schnellstens den behandelnden Arzt (siehe unten).

Weitere Informationen über SOLIRIS® finden Sie in der *Zusammenfassung der Produktmerkmale* oder senden Sie eine E-Mail an MedInfo.EMEA@alexion.com. Auch wenn Sie noch Fragen zur Sicherheit des Produkts haben, können Sie eine E-Mail an Medinfo.EMEA@Alexion.com senden.

Name der Patientin/des Patienten:

Krankenhaus, wo der Patient behandelt wird:

Name des Arztes:

Telefonnummer:

Informationen zu der Meningokokkenimpfung:

Impfstoffma rke	Serogru ppe der Impfung	Num mer der Dosis	Datum	Primäre Impfserie / Auffrischung sdosis	Antibiotikaprophylaxe, wenn Soliris weniger als 2 Wochen nach Impfung eingeleitet wurde
					<input type="checkbox"/> nicht zutreffend <input type="checkbox"/> Ja, Behandlungsbeginn: _____
					<input type="checkbox"/> nicht zutreffend <input type="checkbox"/> Ja, Behandlungsbeginn: _____
					<input type="checkbox"/> nicht zutreffend <input type="checkbox"/> Ja, Behandlungsbeginn: _____

PM code

Alexion Pharma Belgien