

BIJSLUITER

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker

Salbutamol Noridem 1,25 mg verneveloplossing

Salbutamol Noridem 2,5 mg verneveloplossing

Salbutamol Noridem 5,0 mg ml verneveloplossing

salbutamol

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

De naam van uw geneesmiddel is als volgt:

- Salbutamol Noridem 1,25 mg & 2,5 mg & 5 mg verneveloplossing.
In de rest van deze bijsluiter wordt uw geneesmiddel Salbutamol Noridem genoemd.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Salbutamol Noridem en waarvoor wordt Salbutamol Noridem gebruikt?
2. Wanneer mag u Salbutamol Noridem niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Salbutamol Noridem ?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Salbutamol Noridem ?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Salbutamol Noridem en waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?

In Salbutamol Noridem zit een geneesmiddel dat salbutamol heet. Dit behoort tot een groep geneesmiddelen die “snelwerkende luchtwegverwijders” worden genoemd.

- Luchtwegverwijders helpen om de luchtwegen in uw longen open te houden. Dit maakt het gemakkelijker voor u om in en uit te ademen.
- Ze helpen om een beklemmend gevoel op de borst te verlichten, en om piepende ademhaling en hoest te verminderen.

Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml: Deze lage dosis is aangepast voor gebruik bij kinderen en zuigelingen, uitsluitend voor de behandeling van ernstige astma-aanvallen, waarbij inhalatie van hoge doses salbutamol nodig is.

Salbutamol Noridem wordt gebruikt voor de behandeling van ademhalingsproblemen bij mensen met astma en andere luchtwegaandoeningen. Het geneesmiddel wordt meestal gegeven aan mensen die erg lijden onder deze ziektes. Salbutamol Noridem wordt ook gebruikt voor de behandeling van ernstige astma-aanvallen.

Salbutamol Noridem is een vloeistof die in een ampul zit. De vloeistof wordt in een apparaat gedaan dat 'vernevelaar' heet. Dit apparaat produceert een fijne nevel die u via een gezichtsmasker inademt.

Afhankelijk van de ernst van de astma kan uw arts alleen Salbutamol Noridem voorschrijven of dit voorschrijven als aanvulling op een continue achtergrondbehandeling met een of meer andere geneesmiddelen, zoals inhalatiecorticosteroiden.

2. Wanneer mag u Salbutamol Noridem niet gebruiken?

Wanneer mag u Salbutamol Noridem niet gebruiken?

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Salbutamol Noridem?

Neem contact op met uw arts of verpleegkundige voordat u dit geneesmiddel gebruikt als uw astma actief is (u heeft vaak klachten of opflakkingen zoals kortademigheid die het spreken, eten of slapen moeilijk bemoeilijkt, hoest, piepende ademhaling, beklemmend gevoel op de borst of uw lichamelijk vermogen is beperkt). U moet dit direct aan uw arts vertellen. De arts zal u dan een geneesmiddel geven voor uw astma, zoals een inhalatiecorticosteroïd, of als u dat al gebruikt, een hogere dosis voorschrijven.

- u heeft hoge bloeddruk
- u heeft diabetes
- uw schildklier werkt te hard
- u heeft een voorgeschiedenis met hartproblemen zoals een onregelmatige of snelle hartslag, ernstig hartfalen of pijn op de borst (angina).
- u gebruikt een andere verneveloplossing zoals ipratropiumbromide; zorg dat de nevel niet in uw ogen komt. Dit kan worden voorkomen door een mondstuk te gebruiken in plaats van een gezichtsmasker, of door een veiligheidsbril te gebruiken.
- u gebruikt xanthinederivaten (zoals theofylline) of steroïden voor de behandeling van astma
- u gebruikt plaspillen (diuretica). Deze worden soms gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk of een hartaandoening.
- u heeft andere geneesmiddelen gebruikt tegen een verstopte neus (zoals efedrine of pseudo-efedrine) of andere geneesmiddelen voor de behandeling van astma.

Een aandoening die lactaatacidose heet is gemeld in verband met hoge therapeutische doses salbutamol, met name bij patiënten die werden behandeld voor een acute bronchospasme (zie rubriek 3 en 4). Toename van de hoeveelheid melkzuur in het bloed (lactaatacidose) kan leiden tot kortademigheid en hyperventilatie, al kan er wel verbetering zijn wat betreft uw piepende ademhaling. Vertel het uw arts zo snel mogelijk als u het gevoel heeft dat uw geneesmiddel niet zo goed werkt als normaal (bijvoorbeeld als u hogere doses nodig heeft om uw ademhalingsproblemen te verlichten of als uw inhalator niet minstens 3 uur verlichting biedt) en als u de vernevelaar vaker moet gebruiken dan uw arts heeft aanbevolen.

Als u Salbutamol Noridem meer dan tweemaal per week gebruikt om uw astmaklachten te behandelen (gebruik ter voorkoming van inspanningsastma niet meegerekend), is het een teken dat uw astma niet goed onder controle is. Dit kan het risico op zware astma-aanvallen (verergering van astma) verhogen en deze kunnen ernstige gevolgen hebben en levensbedreigend of zelfs dodelijk zijn. Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts, zodat opnieuw gekeken kan worden naar de behandeling van uw astma.

Als u elke dag een geneesmiddel gebruikt tegen een ontsteking van uw longen, bijvoorbeeld een "inhalatiecorticosteroïd", is het belangrijk om dit regelmatig te blijven gebruiken, ook als u zich beter voelt.

Door het gebruik van salbutamol kunt u soms minder kalium in uw bloed hebben, vooral als u in dezelfde periode ook andere geneesmiddelen gebruikt. Als de kans bestaat dat dit bij u gebeurt, kan uw arts tests aanraden om uw bloed beter in de gaten te houden.

Wordt uw ademhalingsprobleem of piepende ademhaling erger direct nadat u dit geneesmiddel heeft gebruikt? Stop dan onmiddellijk met het gebruik van dit geneesmiddel en vertel het zo snel mogelijk aan uw arts.

Gebruik u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Salbutamol Noridem nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor kruidengeneesmiddelen.

Vertel het uw arts, verpleegkundige of apotheker met name als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

- geneesmiddelen tegen een onregelmatige of snelle hartslag.
- andere geneesmiddelen voor uw astma.
- geneesmiddelen die de hoeveelheid suiker in het bloed verminderen (antidiabetica).

Denk erom dat u dit geneesmiddel meeneemt als u naar het ziekenhuis gaat.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

U kunt Salbutamol Noridem op elk moment van de dag gebruiken, met of zonder voedsel.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Salbutamol Noridem kan tijdens de zwangerschap worden gebruikt als uw arts dit nodig vindt.

Atleten

Het gebruik van salbutamol kan tot een positieve uitslag leiden in een dopingcontrole.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is onwaarschijnlijk dat Salbutamol Noridem invloed heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

U mag niet autorijden of machines bedienen tijdens het gebruik van de vernevelaar, omdat deze de nevel produceert die u moet inademen.

Salbutamol Noridem bevat natrium

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per ampul, d.w.z. dat het in feite 'natriumvrij' is.

3. Hoe gebruikt u Salbutamol Noridem ?

Salbutamol Noridem moet zo nodig, in plaats van regelmatig, worden gebruikt.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gebruik van dit geneesmiddel

- **de oplossing mag niet geïnjecteerd of doorgeslikt worden.** Salbutamol Noridem mag alleen voor inhalatie door middel van een vernevelaar worden gebruikt.
- **zorg dat de vloeistof, of de mist die uit de vernevelaar komt, niet in uw ogen komt.** U kunt uw ogen beschermen door een bril of een veiligheidsbril te dragen.
- uw arts, verpleegkundige of apotheker weet hoe u uw geneesmiddel moet gebruiken.
- elk plastic buisje (ampul) bevat wat vloeistof.
- de vloeistof wordt in een vernevelaar gedaan. Dit apparaat produceert een fijne nevel die u via een gezichtsmasker of mondstuk kunt inademen.
- Gebruik uw vernevelaar in een goed geventileerde ruimte, aangezien een deel van de nevel in de lucht terechtkomt en door anderen kan worden ingeademd.

Volwassenen, jongeren vanaf 12 jaar en kinderen van 4 t/m 11 jaar

- De gebruikelijke startdosis is 2,5 mg maximaal vier keer per dag. Indien nodig verhoogd tot 5 mg maximaal vier keer per dag.

– **Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml:** Deze toedieningsvorm met lage dosis is niet geschikt voor de behandeling van volwassenen, maar is geschikt voor kinderen en zuigelingen.

Zuigelingen en kinderen: 50 tot 150 microgram salbutamol / kg (d.w.z. 0,1 tot 0,3 ml/kg Salbutamol Noridem 1,25 mg in vernevelde vorm) zonder over het algemeen 5 mg salbutamol in vernevelde vorm te overschrijden voor peuters van 18 maanden tot maximaal 2 jaar (d.w.z. vier enkelvoudige doses Salbutamol Noridem 1,25 mg of één enkelvoudige dosis Salbutamol Noridem 5 mg in vernevelde vorm) en 2,5 mg salbutamol voor zuigelingen en peuters jonger dan 18 maanden (d.w.z. twee enkelvoudige doses Salbutamol Noridem 1,25 mg of één enkelvoudige dosis Salbutamol Noridem 2,5 mg in vernevelde vorm).

Het gebruik van uw ampullen

1. Uw ampullen zitten in een ondoorzichtige beschermzak. Open de beschermzak pas als u de ampullen moet gebruiken.
2. Open de beschermzak. Houd de strip met ampullen in één hand en houd de laatste ampul in de rij vast met uw andere hand.
3. Draai de ampul naar beneden en van u af.
4. Doe de resterende ampullen terug in de beschermzak. Schrijf de weggooidatum op de daarvoor bestemde plek op de zak, zodat u erom denkt. De weggooidatum is 3 maanden na de datum waarop u de beschermzak heeft geopend. Doe de geopende zak terug in de doos.
5. Pak de ampul die u zojuist heeft gepakt aan de bovenkant vast. Open de ampul.
6. Doe de ampul met de open kant in de kom van de vernevelaar en knijp er zachtjes in. Zorg dat de hele inhoud in de vernevelaar terecht komt.
7. Zet de vernevelaar in elkaar en gebruik deze volgens de aanwijzingen.

Verdunnen van de ampullen

- **verdin de inhoud van een ampul niet, tenzij uw arts heeft gezegd dat u dat moet doen.**
- als uw arts u heeft gezegd dat u de oplossing moet verdunnen, doe de inhoud van de ampul dan in de kom van de vernevelaar.
- voeg de hoeveelheid steriele zoutoplossing toe die uw arts u heeft gezegd te gebruiken.
- doe de deksel op de kom van de vernevelaar en schud de kom zachtjes om de inhoud te mengen.

Als verdunning nodig is, moet alleen steriele normale zoutoplossing worden gebruikt.

Verneveling dient gewoonlijk niet langer dan 10 tot 20 minuten te duren.

De methode die de patiënt gebruikt, moet regelmatig worden gecontroleerd.

Na gebruik

Na verneveling moet de ongebruikte oplossing die is achtergebleven in de tank van het hulpmiddel worden weggegooid.

De reiniging en het onderhoud van het hulpmiddel zullen worden uitgevoerd volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

De verpakkingen voor enkelvoudig gebruik bevatten geen conserveermiddelen; na opening moeten ze onmiddellijk worden gebruikt.

Voor elke verneveling moet een nieuwe ampul worden gebruikt. De inhoud van gedeeltelijk geopende of beschadigde verpakkingen voor enkelvoudig gebruik mag niet worden toegediend.

Heeft u te veel van Salbutamol Noridem gebruikt?

Als u te veel van dit geneesmiddel heeft gebruikt, neem dan zo snel mogelijk contact op met een arts.

U kunt de volgende klachten krijgen:

- uw hart klopt sneller dan normaal
- u voelt zich beverig
- u wordt overactief

Deze klachten verdwijnen meestal in een paar uur.

Wanneer u teveel van Salbutamol Noridem heeft gekregen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten Salbutamol Noridem te gebruiken?

- Als u een dosis vergeet, neem deze dan zodra u eraan denkt.
- Maar als het al tijd is voor de volgende dosis, sla de gemiste dosis dan over.
- Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Salbutamol Noridem?

Stop niet met het gebruik van dit geneesmiddel zonder eerst met uw arts te overleggen.

Denkt u dat dit geneesmiddel niet goed genoeg werkt bij u?

Als uw geneesmiddel niet zo goed lijkt te werken als normaal, neem dan zo mogelijk contact op met uw arts. Het probleem met uw longen kan erger worden. Misschien heeft u een ander geneesmiddel nodig. Neem geen extra Salbutamol Noridem tenzij uw arts u zegt dat u dat moet doen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

4. Mogelijke bijwerkingen

Wordt uw ademhalingsprobleem (piepende ademhaling) erger direct nadat u dit geneesmiddel heeft gebruikt? Stop dan onmiddellijk met het gebruik van dit geneesmiddel en vertel het zo snel mogelijk aan uw arts.

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken. De volgende bijwerkingen kunnen ontstaan met die geneesmiddel:

Allergische reacties (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

Als u een allergische reactie heeft, stop dan met het gebruik van Salbutamol Noridem en roep direct de hulp van een arts in. Klachten die u kunt krijgen bij een allergische reactie zijn: opzwellen van gezicht, lippen, mond, tong of keel, wat problemen met slikken of ademen kan geven; huiduitslag met jeuk; zich zwak voelen en een licht gevoel in het hoofd hebben; in elkaar zakken (collaps).

Als u een hartziekte heeft, vertel het dan ONMIDDELLIJK aan uw arts of ga ONMIDDELLIJK naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis als u pijn op de borst of andere klachten krijgt waaruit blijkt dat uw hartziekte erger wordt.

Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts als:

- u voelt dat uw hart sneller of krachtiger klopt dan normaal (hartkloppingen). Dit kan meestal geen kwaad, en stopt meestal als u het geneesmiddel een tijdje heeft gebruikt.
- u voelt dat uw hartslag onregelmatig is of een extra slag maakt.

Deze bijwerkingen komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers. Krijgt u een van deze klachten? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw arts. **Stop niet met het gebruik van dit geneesmiddel, behalve wanneer aan u is verteld dat u moet stoppen.**

Lactaatacidose (frequentie niet bekend)

- verhoogd melkzuurgehalte in het bloed (blijkt uit snelle ademhaling, kortademigheid, hoewel er een verbetering van de piepende ademhaling kan zijn, het koud hebben, maagpijn, misselijkheid en overgeven). Stop in dat geval met het gebruik van Salbutamol Noridem en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Vertel het uw arts als u een van de volgende bijwerkingen krijgt, die dit geneesmiddel ook kan geven:

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

- trillen van de extremiteiten (voeten en handen)
- versnelde hartslag
- hoofdpijn

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

- mond- en keelirritatie
- spierkrampen

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers)

- te weinig kalium in uw bloed
- er stroomt meer bloed naar uw armen en benen (perifere vaatverwijding)

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

- nervositeit
- agitatie (u bent zenuwachtig, opgewonden of onrustig)
- hartritmestoornissen
- net als bij andere geneesmiddelen die via inhalatie worden toegediend, kan er na inhalatie van het geneesmiddel hoest of toename van ademhalingsproblemen optreden. Stop in dit geval met de behandeling en neem contact op met uw arts, die mogelijk een andere behandeling zal overwegen.

Xtra bijwerkingen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Bij kinderen zijn bovendien zeer zelden voorkomende bijwerkingen op het gebied van psychische / gedragsstoornissen met betrekking tot nervositeit en agitatie, evenals pruritus gemeld.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het nationale meldsysteem.

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

www.fagg.be

Afdeling Vigilantie:

Website: www.eenbijwerkingmelden.be

e-mail: adr@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Salbutamol Noridem ?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Bewaar de ampullen in de doos en zak, ter bescherming tegen licht.

Als u de beschermzak opent:

- noteer dan de datum van opening.
- tel 3 maanden bij deze datum op. Die datum is de 'weggooien na'-datum.
- schrijf de 'weggooien na'-datum op de daarvoor bestemde plaats op de zak
- gebruik geen ongebruikte ampullen die nog in die zak zijn achtergebleven na de 'weggooien na'-datum, maar breng ze terug naar uw apotheker voor vernietiging.

Als de zak niet is geopend, gebruik het geneesmiddel dan niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos, de etiketten en de zak na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Als er tegen u is gezegd dat u moet stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel, breng het ongebruikte deel van de Salbutamol Noridem dan naar uw apotheek om het te laten vernietigen.

Gooi gedeeltelijk gebruikte, geopende of beschadigde ampullen weg.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u geneesmiddelen op de juiste manier afvoert, worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit geneesmiddel?

- De werkzame stof in dit geneesmiddel is salbutamolsulfaat. Elke 2,5 ml ampul bevat 1,25 mg salbutamol (onder de vorm van salbutamolsulfaat).
- De werkzame stof in dit geneesmiddel is salbutamolsulfaat. Elke 2,5 ml ampul bevat 2,5 mg salbutamol (onder de vorm van salbutamolsulfaat).
- De werkzame stof in dit geneesmiddel is salbutamolsulfaat. Elke 2,5 ml ampul bevat 5 mg salbutamol (onder de vorm van salbutamolsulfaat).
- De andere stoffen in dit geneesmiddel zijn natriumchloride, water voor injecties en zwavelzuur (voor pH-aanpassing).

Hoe ziet Salbutamol Noridem eruit en wat zit er in een verpakking?

Salbutamol Noridem 1,25 mg verneveloplossing is verpakt in strips van 5 of 6 ampullen, afhankelijk van de verpakkingsgrootte, omhuld door een ondoorzichtige aluminium beschermzak. Elke doos bevat 30 of 60 ampullen.

Salbutamol Noridem 2,5 mg verneveloplossing is verpakt in strips van 5 of 6 ampullen, afhankelijk van de verpakkingsgrootte, omhuld door een ondoorzichtige aluminium beschermzak. Elke doos bevat 30 of 60 ampullen.

Salbutamol Noridem 5 mg verneveloplossing is verpakt in strips van 5 of 6 ampullen, afhankelijk van de verpakkingsgrootte, omhuld door een ondoorzichtige aluminium beschermzak. Elke doos bevat 30 of 60 ampullen.

Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Noridem Enterprises Limited
Evagorou & Makariou
Mitsi Building 3, Office 115
1065 Nicosia,
Cyprus

Fabrikant

DEMO S.A. PHARMACEUTICAL INDUSTRY

21st Km National Road Athens–Lamia,
145 68 Kryoneri, Attikis,
Griekenland
T: +30 210 8161802, F: +30 210816158

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:

Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml verneveloplossing BE665849

Salbutamol Noridem 2,5 mg/2,5 ml verneveloplossing BE665850

Salbutamol Noridem 5,0 mg/2,5 ml verneveloplossing BE665851

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de Europese Economische Ruimte onder de volgende namen:

Griekenland	Brodilaten 1,25 mg / 2,5 mL Διάλυμα για εισπνοή με εκνεφωτή Brodilaten 2,5 mg / 2,5 mL Διάλυμα για εισπνοή με εκνεφωτή Brodilaten 5,0 mg / 2,5 mL Διάλυμα για εισπνοή με εκνεφωτή
Duitsland	Salbutamol Noridem 1,25 mg Lösung für einen Vernebler Salbutamol Noridem 2,5 mg Lösung für einen Vernebler Salbutamol Noridem 5 mg Lösung für einen Vernebler
Ierland	Brodilaten 1.25 mg / 2.5 mL Nebuliser solution Brodilaten 2.5 mg / 2.5 mL Nebuliser solution Brodilaten 5.0 mg / 2.5 mL Nebuliser solution
Frankrijk	SALBUTAMOL NORIDEM 1,25 mg/2,5 mL, solution pour inhalation par nébuliseur SALBUTAMOL NORIDEM 2,5 mg/2,5 mL, solution pour inhalation par nébuliseur SALBUTAMOL NORIDEM 5,0 mg/2,5 mL, solution pour inhalation par nébuliseur
Oostenrijk	Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml Lösung für einen Vernebler Salbutamol Noridem 2,5 mg/2,5 ml Lösung für einen Vernebler Salbutamol Noridem 5 mg/2,5 ml Lösung für einen Vernebler
België	Salbutamol Noridem 1,25 mg solution pour inhalation par nébuliseur / verneveloplossing / Lösung für einen Vernebler Salbutamol Noridem 2,5 mg solution pour inhalation par nébuliseur / verneveloplossing / Lösung für einen Vernebler Salbutamol Noridem 5,0 mg solution pour inhalation par nébuliseur / verneveloplossing / Lösung für einen Vernebler
Cyprus	Brodilaten 1,25 mg/2,5 mL διάλυμα για εισπνοή με εκνεφωτή Brodilaten 2,5 mg/2,5 mL διάλυμα για εισπνοή με εκνεφωτή Brodilaten 5,0 mg/2,5 mL διάλυμα για εισπνοή με εκνεφωτή
Tsjechië	Salbutamol Noridem Salbutamol Noridem Salbutamol Noridem
Denemarken	Salbutamol Noridem Salbutamol Noridem Salbutamol Noridem
Spanje	Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml solución para inhalación por nebulizador Salbutamol Noridem 2,5 mg/2,5 ml solución para inhalación por nebulizador Salbutamol Noridem 5,0 mg/2,5 ml solución para inhalación por nebulizador
Finland	Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml sumutinliuos Salbutamol Noridem 2,5 mg/2,5 ml sumutinliuos Salbutamol Noridem 5 mg/2,5 ml sumutinliuos

Hongarije	Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml oldat porlasztásra Salbutamol Noridem 2,5 mg/2,5 ml oldat porlasztásra Salbutamol Noridem 5,0 mg/2,5 ml oldat porlasztásra
Italië	Salbutamol Noridem Salbutamol Noridem Salbutamol Noridem
Noorwegen	Salbutamol Noridem Salbutamol Noridem Salbutamol Noridem
Nederland	Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml verneveloplossing Salbutamol Noridem 2,5 mg/2,5 ml verneveloplossing Salbutamol Noridem 5,0 mg/2,5 ml verneveloplossing
Polen	Salbutamol Noridem Salbutamol Noridem Salbutamol Noridem
Portugal	Salbutamol Noridem Salbutamol Noridem Salbutamol Noridem
Roemenië	Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml soluție pentru nebulizator Salbutamol Noridem 2,5 mg/2,5 ml soluție pentru nebulizator Salbutamol Noridem 5,0 mg/2,5 ml soluție pentru nebulizator
Zweden	Salbutamol Noridem Salbutamol Noridem Salbutamol Noridem
Slowakije	Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml Salbutamol Noridem 2,5 mg/2,5 ml Salbutamol Noridem 5 mg/2,5 ml

Afleveringswijze: geneesmiddel op medisch voorschrift.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 03/2026.