

Notice : Information du patient

Byesilor 6 mg/ml, solution injectable en stylo prérempli liraglutide

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Byesilor et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Byesilor ?
3. Comment utiliser Byesilor ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Byesilor ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Byesilor et dans quels cas est-il utilisé ?

Qu'est-ce que Byesilor ?

Byesilor est un médicament indiqué dans la perte de poids contenant la substance active liraglutide. Il est semblable à une hormone naturelle appelée glucagon-like peptide-1 (GLP-1) qui est libérée par l'intestin après un repas. Byesilor fonctionne en agissant sur les récepteurs du cerveau qui contrôlent votre appétit, ce qui vous permet de vous sentir plus rassasié et d'avoir moins faim. Cela vous aide à moins manger et à diminuer votre poids.

Dans quel cas Byesilor est-il utilisé ?

Byesilor est utilisé pour la perte de poids en association à un régime alimentaire et de l'activité physique chez les adultes de 18 ans et plus ayant

- un IMC supérieur ou égal à 30 kg/m² (obésité) ou
- un IMC supérieur ou égal à 27 kg/m² et inférieur à 30 kg/m² (surpoids), et souffrant de problèmes de santé liés au poids (tels que le diabète, une pression artérielle élevée, des taux anormaux de graisses dans le sang ou des problèmes respiratoires pendant le sommeil appelés « apnée obstructive du sommeil »).

L'IMC (Indice de Masse Corporelle) mesure le rapport entre votre poids et votre taille.

Vous devez continuer à utiliser Byesilor uniquement si vous avez perdu au moins 5 % de votre poids initial après 12 semaines à la dose de 3,0 mg/jour (voir rubrique 3). Consultez votre médecin avant de continuer votre traitement.

Byesilor peut être utilisé en complément d'une alimentation saine et d'une augmentation de l'activité physique dans le contrôle du poids chez des adolescents à partir de 12 ans ayant :

- une obésité (diagnostiquée par votre médecin)
- un poids corporel supérieur à 60 kg.

Vous devez continuer à utiliser Byesilor uniquement si vous avez perdu au moins 4 % de votre IMC après 12 semaines à la dose de 3,0 mg/jour ou à la dose maximale tolérée (voir rubrique 3). Consultez votre médecin avant de continuer votre traitement.

Régime alimentaire et activité physique

Votre médecin vous prescrira un programme de régime alimentaire et de l'activité physique. Vous devez le suivre pendant votre traitement par Byesilor.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Byesilor ?

N'utilisez jamais Byesilor

- si vous êtes allergique au liraglutide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant d'utiliser Byesilor.

L'utilisation de Byesilor n'est pas recommandée si vous avez une insuffisance cardiaque sévère.

Il y a peu d'expérience avec ce médicament chez les patients de 75 ans et plus. Ce médicament n'est pas recommandé si vous avez 75 ans ou plus.

Il y a peu d'expérience avec ce médicament chez les patients ayant des problèmes de reins. Si vous avez une maladie des reins ou si vous êtes sous dialyse, consultez votre médecin.

Il y a peu d'expérience avec ce médicament chez les patients ayant des problèmes de foie. Si vous avez des problèmes de foie, consultez votre médecin.

Ce médicament n'est pas recommandé si vous avez une maladie sévère de l'estomac ou de l'intestin qui provoque un ralentissement de la vidange gastrique (appelée gastroparésie) ou si vous avez une maladie inflammatoire de l'intestin.

Si vous savez que vous allez subir une intervention chirurgicale nécessitant une anesthésie (endormissement), veuillez informer votre médecin que vous prenez Byesilor.

Diabétiques

Si vous êtes diabétique, n'utilisez pas Byesilor en remplacement de l'insuline.

Inflammation du pancréas

Adressez-vous à votre médecin si vous avez ou avez eu une maladie du pancréas.

Inflammation de la vésicule biliaire et calculs biliaires

Si vous perdez beaucoup de poids, vous risquez de développer des calculs biliaires et donc une inflammation de la vésicule biliaire. Arrêtez de prendre Byesilor et contactez immédiatement un médecin si vous ressentez une douleur importante dans la partie supérieure de votre ventre, généralement plus importante du côté droit sous les côtes. La douleur peut être ressentie jusque dans votre dos ou votre épaule droite. Voir rubrique 4.

Maladie de la thyroïde

Si vous avez une maladie de la thyroïde, notamment des nodules thyroïdiens et une augmentation de la taille de la glande thyroïdienne, consultez votre médecin.

Fréquence cardiaque

Adressez-vous à votre médecin si vous avez des palpitations (vous ressentez les battements de votre cœur) ou si vous avez l'impression que votre cœur s'emballerait alors que vous êtes au repos pendant le traitement par Byesilor.

Perte de liquide et déshydratation

Au début du traitement par Byesilor, vous pouvez perdre du liquide ou vous déshydrater. Cela peut être dû à des nausées, des vomissements et des diarrhées. Il est important d'éviter la déshydratation en buvant beaucoup. Si vous avez des questions ou inquiétudes, adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Voir rubrique 4.

Enfants et adolescents

La sécurité et l'efficacité de Byesilor chez les enfants de moins de 12 ans n'ont pas été étudiées.

Autres médicaments et Byesilor

Informez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

En particulier, informez votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère si :

- vous prenez des médicaments pour le traitement du diabète appelés « sulfamides hypoglycémisants » (tels que le glimépiride ou le glibenclamide) ou si vous prenez une insuline car votre taux de sucre dans le sang peut devenir faible (hypoglycémie) lorsque vous utilisez ces médicaments avec Byesilor. Votre médecin pourrait ajuster la dose de votre médicament pour le traitement du diabète afin de vous éviter un faible taux de sucre dans le sang. Consultez la rubrique 4 qui décrit les signes annonciateurs d'un faible taux de sucre dans le sang. Si vous ajustez votre dose d'insuline, votre médecin pourra vous recommander de surveiller votre glycémie plus fréquemment.
- vous prenez de la warfarine ou d'autres médicaments par voie orale réduisant la coagulation de votre sang (anticoagulants). Des analyses de sang plus fréquentes pourraient être nécessaires afin de déterminer la capacité de votre sang à coaguler.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, n'utilisez pas Byesilor car on ne sait pas si Byesilor peut nuire au bébé.

N'allaitez pas pendant que vous utilisez Byesilor car on ne sait pas si Byesilor passe dans le lait maternel.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il est peu probable que Byesilor affecte votre capacité à conduire et à utiliser des machines. Certains patients peuvent ressentir des vertiges lors de la prise de Byesilor principalement au cours des 3 premiers mois de traitement (voir la section « **Quels sont les effets indésirables éventuels ?** »). Si vous ressentez des vertiges, faites très attention en conduisant ou en utilisant des machines. Si vous avez besoin de plus amples informations, parlez-en à votre médecin.

Information importante concernant certains composants de Byesilor

Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par dose, c'est-à-dire qu'il est essentiellement « sans sodium ».

3. Comment utiliser Byesilor ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère en cas de doute.

Votre médecin vous prescrira un programme de régime alimentaire et de l'activité physique. Vous devez le suivre pendant votre traitement par Byesilor.

Quantité à injecter

Adultes

Votre traitement commencera à une faible dose qui sera progressivement augmentée au cours des cinq premières semaines de traitement.

- Lorsque vous commencez à utiliser Byesilor, la dose initiale est de 0,6 mg une fois par jour pendant au moins une semaine.
- Votre médecin vous apprendra comment augmenter progressivement votre dose de 0,6 mg chaque semaine jusqu'à ce que vous atteigniez la dose recommandée de 3,0 mg une fois par jour.

Votre médecin vous indiquera la dose de Byesilor à utiliser chaque semaine. Habituellement, vous devrez suivre le tableau suivant.

Semaine	Dose injectée
Semaine 1	0,6 mg une fois par jour
Semaine 2	1,2 mg une fois par jour
Semaine 3	1,8 mg une fois par jour
Semaine 4	2,4 mg une fois par jour
Semaine 5 et suivantes	3,0 mg une fois par jour

Une fois que vous avez atteint la dose recommandée de 3,0 mg à la cinquième semaine de traitement, continuez à utiliser cette dose jusqu'à la fin de votre période de traitement. N'augmentez pas davantage votre dose.

Votre médecin évaluera régulièrement votre traitement.

Adolescents (≥ 12 ans)

Pour les adolescents âgés de 12 ans à moins de 18 ans, un schéma d'escalade de dose similaire à celui utilisé pour les adultes doit être appliqué (voir ci-dessus le tableau pour les adultes). La dose doit être augmentée jusqu'à 3,0 mg (dose d'entretien) ou jusqu'à la dose maximale tolérée. Une dose quotidienne supérieure à 3,0 mg n'est pas recommandée.

Comment et quand utiliser Byesilor

- Avant d'utiliser le stylo pour la première fois, votre médecin ou votre infirmier/ère vous montrera comment l'utiliser.
- Vous pouvez utiliser Byesilor à tout moment de la journée, avec ou sans aliment et boisson.
- Utilisez Byesilor approximativement à la même heure chaque jour : choisissez l'heure de la journée qui vous convient le mieux.

Où injecter

Byesilor doit être administré par injection sous la peau (injection sous-cutanée).

- Les meilleurs endroits pour réaliser vos injections sont le ventre (abdomen), le dessus de la cuisse ou le haut du bras.
- Changez l'endroit où vous injectez chaque jour pour réduire le risque de développer des grosseurs.
- Ne l'injectez pas dans une veine ou dans un muscle.

Vous trouverez des instructions d'utilisation détaillées au dos de cette notice.

Diabétiques

Informez votre médecin si vous êtes diabétique. Votre médecin pourrait ajuster la dose de votre médicament pour le traitement du diabète afin de vous éviter un faible taux de sucre dans le sang.

- Ne mélangez pas Byesilor avec d'autres médicaments que vous injectez (par ex. des insulines).
- N'utilisez pas Byesilor en association à d'autres médicaments contenant des agonistes des récepteurs du GLP-1 (tels que l'exénatide ou le lixisénatide).

Si vous avez utilisé plus de Byesilor que vous n'auriez dû

Si vous avez utilisé plus de Byesilor que vous n'auriez dû, adressez-vous à un médecin ou allez immédiatement à l'hôpital. Prenez l'emballage du médicament avec vous. Vous pourriez avoir besoin d'un traitement médical. Les effets indésirables suivants peuvent survenir :

- nausées
- vomissements
- un faible taux de sucre dans le sang (hypoglycémie). Veuillez-vous référer à « les effets indésirables fréquents » pour connaître les signes annonciateurs d'un faible taux de sucre dans le sang.

Si vous avez utilisé ou pris trop de Byesilor, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoison (070/245.245).

Si vous oubliez d'utiliser Byesilor

- Si vous oubliez une dose et que vous vous en rendez compte dans les 12 heures qui suivent votre horaire habituel d'utilisation de la dose, injectez-la dès que vous vous en rendez compte.
- Toutefois, si plus de 12 heures se sont écoulées depuis le moment où vous auriez dû utiliser Byesilor, ne prenez pas la dose que vous avez oubliée et injectez votre dose suivante le lendemain à l'heure habituelle.
- N'utilisez pas de dose double ou n'augmentez pas la dose du jour suivant pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez d'utiliser Byesilor

N'arrêtez pas d'utiliser Byesilor sans avoir consulté votre médecin.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Effets indésirables graves

Certaines réactions allergiques sévères (anaphylaxie) ont été rapportées dans de rares cas chez des patients utilisant Byesilor. Vous devez consulter immédiatement votre médecin si vous avez des symptômes tels que des problèmes pour respirer, un gonflement du visage et de la gorge et un rythme cardiaque rapide.

Des cas d'inflammation du pancréas (pancréatite) ont été rapportés peu fréquemment chez des patients utilisant Byesilor. La pancréatite est une maladie grave, pouvant potentiellement menacer le pronostic vital.

Arrêtez de prendre Byesilor et consultez immédiatement un médecin si vous remarquez l'un des effets indésirables graves suivants :

- Douleur intense et persistante dans l'abdomen (au niveau de l'estomac) qui peut s'étendre à votre dos, associée à des nausées et des vomissements, car cela peut être le signe d'une inflammation du pancréas (pancréatite).

Autres effets indésirables

Très fréquent : pouvant affecter plus de 1 personne sur 10

- Nausées, vomissements, diarrhées, constipation, maux de tête : ils disparaissent généralement au bout de quelques jours ou semaines.

Fréquent : pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10

- Problèmes d'estomac et intestinaux, tels qu'une indigestion (dyspepsie), inflammation de la paroi de l'estomac (gastrite), maux d'estomac, douleur dans le haut de l'estomac, brûlures d'estomac, sensation de ballonnement, flatulences, renvois et sécheresse de la bouche
- Sensation de faiblesse ou de fatigue
- Changement du goût
- Vertiges
- Difficultés à dormir (insomnie). Elles surviennent généralement au cours des 3 premiers mois de traitement
- Calculs biliaires
- Eruption cutanée
- Réactions au site d'injection (telles que bleu, douleur, irritation, démangeaison et éruption cutanée)
- Faible taux de sucre dans le sang (hypoglycémie). Les signes qui annoncent un faible taux de sucre dans le sang peuvent apparaître soudainement et peuvent être les suivants : sueurs froides, pâleur et froideur de la peau, maux de tête, rythme cardiaque rapide, nausées, sensation de faim excessive, troubles visuels, somnolence, faiblesse, nervosité, anxiété, confusion, difficultés de concentration et tremblement. Votre médecin vous expliquera comment traiter un faible taux de sucre dans le sang et ce que vous devez faire si vous remarquez ces signes annonciateurs
- Augmentation des enzymes pancréatiques (telles que la lipase et l'amylase).

Peu fréquent : pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100

- Perte de liquide (déshydratation). Cet effet est plus susceptible de survenir en début de traitement et peut être dû à des vomissements, des nausées et des diarrhées
- Vidange gastrique retardée
- Inflammation de la vésicule biliaire
- Réactions allergiques dont éruption cutanée
- Sensation générale de malaise
- Pouls plus rapide.

Rare : pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000

- Fonction rénale réduite
- Insuffisance rénale aiguë. Les signes peuvent inclure une réduction du volume urinaire, un goût métallique dans la bouche et l'apparition fréquente de bleus.

Fréquence indéterminée : la fréquence ne peut être estimée à partir des données disponibles

- Occlusion intestinale. Forme grave de constipation accompagnée de symptômes supplémentaires tels que maux de ventre, ballonnements, vomissements, etc.
- Des grosseurs sous la peau peuvent être causées par l'accumulation d'une protéine appelée amyloïde (amyloïdose cutanée ; la fréquence à laquelle cela se produit est indéterminée).

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via **I**

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

www.afmps.be

Division Vigilance:

Site internet: www.notifierunefetindesirable.be

e-mail: adr@fagg-afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Byesilor ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas Byesilor après la date de péremption indiquée sur l'étiquette du stylo et sur l'emballage après « EXP ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Avant la première utilisation :

cConserver au réfrigérateur (entre 2 °C et 8 °C). Ne pas congeler. cConserver à distance du compartiment de congélation.

Une fois que vous commencez à utiliser le stylo :

Vous pouvez conserver le stylo pendant 1 mois à une température ne dépassant pas 30 °C ou au réfrigérateur (entre 2 °C et 8 °C). Ne pas congeler. Conserver à distance du compartiment de congélation.

Conservez le capuchon sur le stylo, à l'abri de la lumière.

N'utilisez pas ce médicament si la solution n'est pas limpide et incolore.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Byesilor

- La substance active est le liraglutide. 1 ml de solution injectable contient 6 mg de liraglutide. Un stylo prérempli contient 18 mg de liraglutide.
- Les autres composants sont le phosphate disodique dihydraté, le propylène glycol (E1520), le phénol, l'hydroxyde de sodium (pour l'ajustement du pH), l'acide chlorhydrique concentré (pour l'ajustement du pH) et l'eau pour préparations injectables.

Qu'est-ce que Byesilor et contenu de l'emballage extérieur

Byesilor est une solution claire et incolore pour injection, fournie dans une cartouche en verre incolore de type I avec un piston en caoutchouc bromobutyle, assemblée dans un injecteur en forme de stylo, avec un corps bleu clair, un bouton violet et un bouton de réglage de la dose blanc avec un capuchon à vis gris.

Chaque stylo contient 3 ml de solution, délivrant 30 doses de 0,6 mg ou 15 doses de 1,2 mg ou 10 doses de 1,8 mg. ou 7 doses de 2,4 mg ou 6 doses de 3,0 mg.

Boîtes de 1, 2, 3, 5 ou 10 (2x5) stylos préremplis en conditionnement multipacks.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Les aiguilles ne sont pas incluses.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
Polarisavenue 87
2132JH, Hoofddorp
Pays-Bas

Fabricant

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
Polarisavenue 87
2132JH, Hoofddorp
PAYS-BAS

Terapia SA
124 Fabricii Street,
400632, Cluj-Napoca,
ROUMANIE

Numéros d'autorisation

BE665852

Ce médicament est autorisé dans les États membres de l'Espace économique européen et au Royaume-Uni (Irlande du Nord) sous les noms suivants :

Belgique:	Byesilor 6 mg/ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen Byesilor 6 mg/ml solution injectable en stylo prérempli Byesilor 6 mg/ml Injektionslösung im Fertigpen
Allemagne:	Byesilor 6 mg/ml Injektionslösung im Fertigpen
Espagne:	Byesilor 6 mg/ml solución inyectable en pluma precargada
EFG Italy:	Byesilor
Pays-Bas:	Byesilor 6 mg/ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen
Pologne :	Byesilor

Cette notice a été révisée pour la dernière fois en Janvier 2025

Date d'approbation : 03/2026

Instructions sur l'utilisation de Byesilor 6 mg/ml, solution injectable en stylo prérempli

Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser votre stylo prérempli Byesilor.

N'utilisez pas le stylo sans une formation appropriée auprès de votre médecin ou de votre infirmière. Commencez par vérifier votre stylo pour **s'assurer qu'il contient du Byesilor 6 mg/ml**, regardez ensuite les illustrations ci-dessous pour connaître les différentes parties de votre stylo et de votre aiguille.

Si vous êtes aveugle ou avez une mauvaise vue et que vous ne parvenez pas à lire le compteur de dose sur le stylo, n'utilisez pas ce stylo sans aide. Faites-vous aider par une personne ayant une bonne vue et formée à l'utilisation du stylo prérempli Byesilor.


Votre stylo est un stylo à doseur prérempli. Il contient 18 mg de liraglutide et délivre des doses de 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg et 3,0 mg. Votre stylo est conçu pour être utilisé avec des aiguilles jetables NovoFine ou NovoTwist d'une longueur maximale de 8 mm et d'une épaisseur allant jusqu'à 32 G.

Les aiguilles ne sont pas incluses dans le pack.

Informations importantes

Portez une attention particulière à ces notes car elles sont importantes pour une utilisation sûre du stylo.

Stylo et aiguille préremplis Byesilor (exemple)




1 Préparez votre stylo avec une nouvelle aiguille


- **Vérifiez le nom et l'étiquette colorée** de votre stylo, pour vous assurer qu'il contient du Byesilor. Ceci est particulièrement important si vous prenez plusieurs types de médicaments injectables. Utiliser un mauvais médicament pourrait nuire à votre santé.
- Retirez le capuchon du stylo.








- **Vérifiez que la solution dans votre stylo est claire et incolore.** Regardez par la fenêtre du stylo. Si la solution semble trouble, n'utilisez pas le stylo.



- **Prends une nouvelle aiguille** et déchirez la languette de papier.



<ul style="list-style-type: none"> • Poussez l'aiguille directement sur le stylo. Tournez jusqu'à ce qu'il soit bien serré. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Retirez le capuchon extérieur de l'aiguille et conservez-le pour plus tard. Vous en aurez besoin après l'injection pour retirer l'aiguille du stylo en toute sécurité. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Retirez le capuchon intérieur de l'aiguille et jetez-le. Si vous essayez de le remettre, vous risquez de vous piquer accidentellement avec l'aiguille. <p>Une goutte de solution peut apparaître au bout de l'aiguille. C'est normal, mais vous devez quand même vérifier le débit si vous utilisez un nouveau stylo pour la première fois.</p> <p>Ne fixez pas une nouvelle aiguille dans votre stylo jusqu'à ce que vous soyez prêt à recevoir votre injection.</p> <p>⚠ Utilisez toujours une nouvelle aiguille pour chaque injection.</p> <p>Cela peut empêcher les aiguilles bloquées, la contamination, l'infection et dosage imprécis.</p> <p>⚠ N'utilisez jamais une aiguille tordue ou endommagée.</p>	
<p>2 Vérifiez le débit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avant votre première injection avec chaque nouveau stylo, vérifiez le débit. Si votre stylo est déjà utilisé, passez à l'étape 3 « Sélectionnez votre dose ». • Tournez le sélecteur de dose jusqu'à ce que le compteur de doses affiche le symbole de contrôle de débit (). 	

- Tenez le stylo avec l'aiguille pointée vers le haut.
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de dose jusqu'à ce que le compteur de dose revienne à 0. Le 0 doit s'aligner avec l'indicateur de dose.

Une goutte de solution devrait apparaître au bout de l'aiguille.

Une petite goutte peut rester au bout de l'aiguille, mais elle ne sera pas injectée.


Si aucune goutte n'apparaît, répétez l'étape 2 « Vérifier le débit » jusqu'à 6 fois. S'il n'y a toujours pas de goutte, changez l'aiguille et répétez l'étape 2 « Vérifier le débit » une fois de plus.

Si une goutte n'apparaît toujours pas, jetez le stylo et utilisez-en un nouveau.

- **Assurez-vous toujours qu'une goutte apparaisse** au bout de l'aiguille avant d'utiliser un nouveau stylo pour la première fois. Cela garantit que la solution circule.

Si aucune goutte n'apparaît, vous **pas** injectez n'importe quel médicament, même si le compteur de dose peut bouger. **Cela peut indiquer une aiguille bloquée ou endommagée.**

Si vous ne vérifiez pas le débit avant votre première injection avec chaque nouveau stylo, vous risquez de ne pas obtenir la dose prescrite et l'effet escompté de Byesilor.



3 Sélectionnez votre dose

- **Tournez le sélecteur de dose jusqu'à ce que le compteur de dose indique votre dose (0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg ou 3,0 mg).**

Si vous sélectionnez la mauvaise dose, vous pouvez tourner le sélecteur de dose vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à la dose correcte. Le stylo peut composer jusqu'à un maximum de 3,0 mg.

Le sélecteur de dose modifie la dose. Seuls le compteur de dose et l'indicateur de dose indiqueront le nombre de mg que vous sélectionnez par dose.

Vous pouvez sélectionner jusqu'à 3,0 mg par dose. Lorsque votre stylo contient moins de

3,0 mg, le compteur de dose s'arrête avant que 3,0 ne s'affiche.


Le sélecteur de dose clique différemment lorsqu'il est tourné vers l'avant, vers l'arrière ou au-delà du nombre de mg restant. Ne comptez pas les clics du stylet.

- **Utilisez toujours le compteur de dose et l'indicateur de dose pour voir combien de mg vous avez sélectionné avant d'injecter ce médicament.**





Ne comptez pas les clics du stylet.

N'utilisez pas la balance à stylo. Il indique uniquement la quantité approximative de solution restante dans votre stylo.


Seules les doses de 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg ou 3,0 mg doivent



Note: Lorsque vous tournez le bouton du sélecteur de dose vers l'avant, il s'étend automatiquement comme indiqué, ce qui est normal.

<p>être sélectionnées à l'aide du sélecteur de dose. La dose sélectionnée doit s'aligner précisément</p> <p>avec le pointeur de dose pour vous assurer que vous obtenez une dose correcte. N'alignez pas le pointeur avec « mg ».</p>	
<p>Combien de solution reste-t-il ?</p> <ul style="list-style-type: none"> Le échelle de stylo vous montre environ combien de solution reste-t-il dans votre stylo. Pour voir précisément combien de solution reste, utiliser le compteur de doses : Tourner le sélecteur de dose jusqu'à ce que le le compteur de doses s'arrête. <p>S'il affiche 3.0, au moins 3,0 mg sont laissés dans votre stylo. Si le compteur de dose s'arrête avant 3,0 mg, il ne reste plus assez de solution pour une dose complète de 3,0 mg.</p> <p>Si vous avez besoin de plus de médicaments que ce qui reste dans votre stylo Seulement si votre médecin ou votre infirmière vous a formé ou conseillé, vous pouvez partager votre dose entre votre stylo actuel et un nouveau stylo. Utilisez une calculatrice pour planifier les doses selon les instructions de votre médecin ou infirmière.</p> <p>Faites très attention à calculer correctement. Si vous ne savez pas comment diviser votre dose à l'aide de deux stylos, sélectionnez et injectez la dose dont vous avez besoin avec un nouveau stylo.</p>	 
<p>4 Injectez votre dose</p> <ul style="list-style-type: none"> Insérez l'aiguille dans votre peau comme votre médecin ou votre infirmière vous l'a montré. Assurez-vous que vous pouvez voir le compteur de doses. Ne le couvrez pas avec vos doigts. Cela pourrait interrompre l'injection. 	
<ul style="list-style-type: none"> Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de dose jusqu'à ce que le compteur de dose indique 0. Le 0 doit être aligné avec le pointeur de dose. Vous pourrez alors entendre ou ressentir un clic. 	

- **Gardez l'aiguille dans votre peau après** le compteur de dose est revenu à 0 et **comptez lentement jusqu'à 6.**
- Si l'aiguille est retirée plus tôt, vous verrez peut-être un jet de solution provenant de la pointe de l'aiguille. Si tel est le cas, la dose complète ne sera pas délivrée.



- **Retirez l'aiguille de votre peau.**

Si du sang apparaît au site d'injection, appuyez légèrement. Ne frottez pas la zone.

Vous pouvez voir une goutte de solution au bout de l'aiguille après l'injection. Ceci est normal et n'affecte pas votre dose.

Surveillez toujours le compteur de doses pour savoir combien de mg vous injectez.

Maintenez le bouton de dose enfoncé jusqu'à ce que le compteur de dose indique 0.


Comment identifier une aiguille bloquée ou endommagée ?




- Si 0 n'apparaît pas sur le compteur de doses après avoir appuyé continuellement sur le bouton de dose, vous avez peut-être utilisé une aiguille bloquée ou endommagée.
- Dans ce cas – vous avez **pas** reçu **n'importe lequel** médicament – même si le compteur de doses s'est éloigné de la dose initiale que vous avez définie.

Comment gérer une aiguille bloquée ?

Changez l'aiguille comme décrit à l'étape 5 « Après votre injection » et répétez toutes les étapes en commençant par l'étape 1 « Préparez votre stylo avec une nouvelle aiguille ». Assurez-vous de sélectionner la dose complète dont vous avez besoin.

Ne touchez jamais le compteur de dose lorsque vous injectez. Cela peut interrompre l'injection.



<p>5 Après votre injection</p> <ul style="list-style-type: none"> • Insérez la pointe de l'aiguille dans le capuchon extérieur de l'aiguille. sur une surface plane sans toucher l'aiguille ou le capuchon extérieur de l'aiguille. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Une fois l'aiguille recouverte, poussez soigneusement le capuchon extérieur de l'aiguille à fond. • Dévisser l'aiguille et jetez-le soigneusement selon les instructions de votre médecin, infirmière, pharmacien ou des autorités locales. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Mettez le capuchon du stylo votre stylo après chaque utilisation pour protéger la solution de la lumière. <p>Jetez toujours l'aiguille après chaque injection pour garantir des injections pratiques et éviter les aiguilles bloquées. Si l'aiguille est bloquée, vous pas injecter n'importe quel médicament.</p> <p>Quand le stylo est vide, jetez-le sans une aiguille selon les instructions de votre médecin, infirmière, pharmacien ou des autorités locales.</p> <ul style="list-style-type: none"> ⚠ N'essayez jamais de remettre le capuchon intérieur de l'aiguille sur l'aiguille. Vous pouvez vous piquer avec l'aiguille. ⚠ Retirez toujours l'aiguille de votre stylo après chaque injection. <p>Cela peut empêcher les aiguilles bloquées, la contamination, l'infection, les fuites de solution et un dosage inexact.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ⚠ Autres informations importantes • Gardez toujours votre stylo et vos aiguilles hors de vue et de portée des autres, surtout les enfants. • Ne partagez jamais votre stylo ou vos aiguilles avec d'autres personnes. • Les soignants doivent soyez très prudent lorsque vous manipulez des aiguilles usagées - pour prévenir les blessures par aiguilles et les infections croisées. 	
<p>Prendre soin de votre stylo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne laissez pas le stylo dans une voiture ou dans un autre endroit où il peut faire trop chaud ou trop froid. • N'injectez pas Byesilor qui a été congelé. Si vous faites cela, vous risquez de ne pas obtenir l'effet escompté de ce médicament. • N'exposez pas votre stylo à la poussière, à la saleté ou à des liquides. • Ne lavez pas, ne trempez pas et ne lubrifiez pas votre stylo. Si nécessaire, nettoyez-le avec un détergent doux sur un chiffon humide. • Ne laissez pas tomber votre stylo et ne le cognez pas contre des surfaces dures. Si vous la laissez tomber ou suspectez un problème, fixez une nouvelle aiguille et vérifiez le débit avant d'injecter. • N'essayez pas de recharger votre stylo. Une fois vide, il doit être éliminé. • N'essayez pas de réparer votre stylo ou de le démonter. 	